

¹Ordinacija za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu
Nikole Andrića 3 ♦ 10020 Zagreb - Novi Zagreb

²Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Referentni centar MZSS RH za spondiloartropatije

Klinička bolnica "Sestre milosrdnice" ♦ Vinogradска 29 ♦ 10000 Zagreb
³Lovćenska 100 ♦ 10000 Zagreb

KVANTITATIVNA ANALIZA DERMATOGLIFA DIGITOPALMARNOG KOMPLEKSA U 50 BOLESNIKA S PSORIJATIČNIM SPONDILITISOM

QUANTITATIVE ANALYSIS OF DIGITOPALMAR DERMATOGLYPHICS IN 50 MALE PATIENTS WITH PSORIATIC SPONDYLITIS

Miljenko Cvjetičanin¹ ♦ Zrinka Jajić² ♦ Ivo Jajić³

U radu se kvantitativnom analizom digitopalmarnih dermatoglifa istražio broj grebenova u 50 muškaraca s psorijatičnim spondilitisom. Analizirano je 25 varijabli, broj grebenova na svih deset prstiju šaka, zatim, sveukupno na pet i deset prstiju, te između triradijusa a-b, b-c, c-d, na oba dlana, te njihov ukupan broj na jednom i oba dlana, te atd kutovi na oba dlana njihov ukupni broj u stupnjevima. Dobiveni podaci uspoređeni su s kontrolnom skupinom od 200 pari otisaka odraslih i fenotipski zdravih muškaraca Zagrebačke regije. Statički značajne razlike prema kontroli nađene su u 12 varijabli u smislu smanjenja broja kožnih grebenovana drugom, trećem, četvrtom i petom prstu desne ruke, te

sveukupnom zbroju prstiju desnadesne ruke, zatim na drugom, trećem i petom prstu lijeve ruke, sveukupnom zbroju prstiju lijeve ruke, te atd kutu lijeve ruke, te obostranom zbroju atd kutova i obostranom zbroju svih deset prstiju ruku. Iz toga se dade zaključiti kako je poligenički sustav u razvoju dermatoglifa identičan s nekim lokusima za razvoj psorijatičnog spondilitisa u muškaraca. Dodajmo k tome i drugi važan aspekt - ovom genetičkom metodom ustanovljena je i diferencijalno dijagnostički razlika prema ankirozantnom spondilitisu u 40 muškaraca u sedam varijabli.

Ključne riječi: dermatoglifi, kvantitativna analiza, psorijatični spondilitis, muški spol