

**Ambulanta za liječenje boli ♦ Odjel za anesteziologiju i intenzivno liječenje
Klinička bolnica Osijek ♦ Josipa Hutlera 4 ♦ 31000 Osijek**

**TRANSTEC® (TDS BUPRENORFIN)
TRANSTEC® (TDS BUPRENORPHINE)**

Mira Fingler

Svjetske smjernice u liječenju boli nameću jake opioide kao važan izbor u tretiranju kako maligne, tako i nemaligne kronične boli. Buprenorfin je snažan analgetik (25-50 puta potentniji od morfina) poznat već duži niz godina, ali je tek od nedavno prisutan u obliku flastera matriksnog tipa u kojem pokazuje značajno poboljšana svojstva: odličan farmakokinetički profil: pogodnost upotrebe u dugotrajnoj terapiji boli (kontrolirana i konstantna koncentracija u plazmi kroz dugi period); fleksibilno i jednostavno doziranje (mogućnost titracije rezanjem flastera, doziranje svakih 96 sati).

TDS buprenorfin je indiciran za liječenje srednje jake do jake kronične boli, a dobro djeluje i na nociceptivnu i neuropatsku komponentu.

Osim navedenog, TDS buprenorfin se zbog svog superiornog sigurnosnog profila preferira u liječenju starije populacije s komorbiditetom: pokazuje minimalnu

mogućnost za razvoj respiratorne depresije; ne zahtjeva prilagodbu doze kod bubrežne insuficijencije; može se sigurno kombinirati s lijekovima za bolesti učestale u starijoj dobi; nema utjecaja na imunološki sustav.

Transtec® je učinkovit i siguran analgetik koji se jednostavno primjenjuje, a prisutan je u tri jačine: 35 µg/h, 52,5 µg/h i 70 µg/h.

U našoj ambulanti kroz šestomjesečno praćenje primijenili smo Transtec u dozi od 35 mg/h do 70 mg/h kod ukupno 41-og bolesnika. Svi bolesnici su prethodno liječeni NSAID, slabim opijatima, adjuvantnim analgeticima i nefarmakološkim procedurama. Učinkovitost i sigurnost, osobito jednostavnost primjene (transdermalni matriks), dobra dugotrajna stabilnost primjenjene doze čini Transtec® dobrom farmakološkom opcijom i u liječenju kronične nemaligne boli.

Ključne riječi: Transtec®, bol