

ANALIZA HOSPITALIZACIJA ZBOG SLE U HRVATSKOJ THE ANALYSIS OF HOSPITALIZED SLE PATIENTS IN CROATIA

Miroslav Mayer ♦ Dubravka Bosnić
Branimir Anić ♦ Mirna Sentić
Jasenka Markeljević ♦ Branimir Tomić ♦ Nada Čikeš

U sklopu istraživanja epidemiologije SLE u Hrvatskoj pristupili smo obradi podataka iz postojećih izvora. Jedna od metoda kojima smo pokušali opisati pojedina demografska obilježja i distribuciju oboljelih po županijama je analiza bolničkog morbiditeta od SLE. Za potrebe istraživanja su izdvojeni zapisi o hospitalizacijama bolesnika s ispisnom dijagnozom MKB M32. Podaci iz baze podataka hospitalizacija pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo su ručno provjereni, pročišćeni i obrađeni. Prikupljeni su iz 82 jedinice u 64 bolnice za 2001. i 2002. godinu. Upotrijebljeni su podaci popisa stanovništva iz 2001. godine. Izračunali smo standardizirane stope hospitalizacija na nacionalnoj razini te za pojedine županije. Godine 2001. 22 bolničke jedinice su ispisale 394 hospitalizacije 271 bolesnika, 38 muškaraca i 233 žene. 2002. je 25 bolničkih jedinica izvjestilo 457

hospitalizacija 279 bolesnika. 2001. je medijan dobi za muškarce bio 41 a za žene 43 godine, a u 2002. 37 za muškarce odnosno 43 godine za žene. Stopa hospitalizacije za sve bolesnike na državnoj razini je bila 6,11 (muškarci 1,78/žene 10,12) u 2001. odnosno 6,29/100000 (muškarci 1,83/ žene 10,43) u 2002. godini. U dvije uzastopne godine smo primjetili značajno više stope hospitalizacije bolesnika iz Osječko-baranjske županije i Zadarske županije. Porast broja hospitalizacija zbog SLE je zabilježen u Primorsko-goranskoj županiji.

U literaturi je opisana uporaba specifičnih stopa bolničkog morbiditeta kao mjerila teritorijalne distribucije SLE. Koliko je nama poznato, ovo je prvi pokušaj takve analize u Hrvatskoj.

Ključne riječi: sistemski eritemski lupus, hospitalizacije u Hrvatskoj