

¹Klinički odjel za reumatologiju, imunologiju i alergologiju ♦ Klinika za unutarnje bolesti

²Odjel za medicinsku biokemijsku bolnica Osijek ♦ J. Huttlera 4 ♦ 31000 Osijek

³Klinika za neurologiju

Klinička bolnica Osijek ♦ J. Huttlera 4 ♦ 31000 Osijek

⁴Odjel patologije ♦ Opća bolnica "dr. Tomislav Bardek" ♦ Dr. Željka Selingera 1 ♦ 48000 Koprivnica

SPONDILOARTROPATIJE - NAŠA ISKUSTVA U PRIMJENI ESSG I AMOR KRITERIJA SPONDYLOARTROPATHIES - ESSG AND AMOR CRITERIA


Marija Glasnović¹ ♦ Jadranka Wagner² ♦ Aleksandar Včev¹ ♦ Silva Butković-Soldo³

Katica Šram ♦ Elizabeta Glasnović-Horvatić⁴ ♦ Višnja Prus¹

Spondilartropatije (SpA) su skupina bolesti koje obuhvaćaju ankilozantni spondilitis (AS), Reiterov sindrom (RS), reaktivni artritis (ReA) psorijatični artritis (PsA), enteropatski artritis (udružen s inflamatornom bolešću crijeva-IBD). SpA su upalne reumatske bolesti nepoznate etiologije sa zajedničkim kliničkim, radiološkim i imunogenetskim osobinama. Klinički su obilježene pojavom perifernog artritisa, zahvaćanjem sakroilijakalnih zglobova (SI) i kralježnice (što je njihovo bitno obilježje), zahvaćanjem tetivnih hvališta te promjenama na koži, očima, srčanim zaliiscima i aorti. Zajedničko obilježje svih bolesti iz ove skupine jest negativan nalaz RF (od-sutnost IgM faktora) u krvi i česta pojava bolesti među bliskim srodnicima. U skupinu ovih bolesti se mogu uvr-

titi i nediferencirane spondilartropatije (uSpA) jer se kod nekih bolesnika ne može postaviti precizna dijagnoza zbog međusobnog preklapanja simptoma i znakova više SpA. Oni ne ispunjavaju kriterije za neku specifičnu SpA ili se bolest javlja u inkompletnoj formi. Za dijagnostiku SpA se koriste Amor kriteriji a nakon višegodišnjeg kliničkog provjeravanja Europska studijska grupa za spondiloartropatije (ESSG) 1991. godine je predložila kriterije za klasifikaciju SpA koji su prihvaćeni 1995. Cilj rada bio je usporediti senzitivnost i osjetljivost kriterija za SpA. U radu je obrađeno 57 bolesnika od kojih je 24 bilo žena i 33 muškaraca prosječne dobi 45 godina. Koristi su AMOR i ESSG kriteriji za SpA. Za dijagnozu uSpA korišteni su modificirani uključujući i isključujući

	ESSG	AMOR	uSpA
Spol	26	21	10
	M=16 (61,5%)	M=15 (71,4%)	M=2 (20,0%)
	Ž=10 (38,5%)	Ž=6 (28,6%)	Ž=8 (80,0%)
Dob	19-63 (45,9±11,73)	19-63 (45,86±11,69)	21 - 52 (41,5±11,67)
Dužina trajanja bolesti	0-19 (4,23±4,73)	0-19 (4,095±4,69)	0-14 (4,5±4,33)
Osjetljivost	72,2%		



Amor kriteriji. Prema ESSG kriterijima klasificirano je 26 bolesnika, dok je prema AMOR kriterijima klasificirano 21 bolesnik. Nediferenciranih SpA bolesnika bilo je 10 koji su ispunjavali isključujuće modificirane AMOR kriterije. Dobiveni rezultati za starosnu dob i dužinu trajanja bolesti odgovaraju literaturnim podaci-

ma. Iz priloženih podataka (prikaz) se može zaključiti da su ESSG kriterij osjetljiviji od AMOR kriterija za 72,2% i mogu se preporučiti u svakodnevnoj reumatološkoj praksi.

Ključne riječi: spondiloartropatije, ESSG kriterij, AMOR kriterij