

Gordana Kokanović

Poliklinika za reumatske bolesti,
fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr. Drago Čop“
Zagreb • Hrvatska

Osteoporozna i lumbosakralna bol

Osteoporosis and low back pain

Cilj istraživanja bio je procijeniti da li je osteoporozna uzrok bola u ginekološki operiranih bolesnica upućenih u fizijatrijsku ambulantu s dijagnozom LS sindroma (M54.5). Istraživanje je obuhvatilo 30 žena, koje su se javile u fizijatrijsku ambulantu radi boli u području donje trećine lumbalne regije i gornje trećine sakralne regije. Svi 30 ispitanica bilo je podvrgnuto u jednom periodu života ginekološkoj operaciji Kliničkim pregledom utvrđena je starost, komorbiditet, životne navike i navike u ishrani, tjelesna aktivnost. Učinjenom radiološkom/neurofiziološkom i neuroradiološkom obradom isključeni

su drugi uzroci боли. Procjena koštane gustoće učinjena je denzitometrijom (DXA).

U radu je prikazana prosječna životna dob i dužina trajanja boli, te starosna dob u kojoj je učinjen ginekološka operacija. Učinjenom DXA-om utvrđena je osteoporozna ili osteopenija. Urednog nalaza DXA-e nije bilo.

U dijagnosticiranju i liječenju bolnih križa, osobito kod ginekološki operiranih žena prije svega treba razmišljati o osteoporozni.

Ključne riječi: osteoporozna, bolna križa, ginekološka operacija