

Marin Petrić**Dušanka Martinović Kaliterna****Dijana Perković****Mislav Radić****Daniela Marasović Krstulović****Klinički odjel za reumatologiju i imunologiju****Klinika za unutarnje bolesti****Klinički bolnički centar Split****Split • Hrvatska**

Povezanost anksioznosti i depresije s oblicima upalnih reumatskih bolesti

The connection between anxiety and depression with forms of inflammatory rheumatic diseases

Usporedili smo stupanj depresije i anksioznosti u oboljelih od reumatoidnog artritisa (RA), sistemskog lupusa (SLE) i sistemske skleroze (SSc). Istražili smo povezanost duljine trajanja ovih bolesti i upalnih parametara s pojmom anksioznosti i depresije. Uključili smo 106 ispitanika s RA, 62 ispitanika sa SLE i 28 ispitanika sa SSc. Podijeljeni su na bez, blago, umjereno i teško depresivne/anksiozne ovisno o rezultatu Beckovog inventara depresije (BDI) i Beckovog inventara anksioznosti (BAI). Stupanj depresije je izraže-

niji u SSc u odnosu na RA, a naročito u odnosu na SLE. Razina anksioznosti je podjednaka u istraživanim bolestima. Predvladavali su ispitanici bez ili s blagim simptoma anksioznosti i depresije. Nismo utvrdili povezanost duljine trajanja bolesti s anksioznosti i depresijom. Među ispitanicima je dokazana pozitivna korelacija simptoma depresije sa serumskom razinom CRP-a.

Ključne riječi: reumatoidni artritis; sistemske eritemski lupus; sustavna sklerozna; anksioznost; depresija