

Rajna Pelivan

Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“
Zagreb ♦ Hrvatska

Šake - najvažnija regija zahvaćena reumatoидnim artritisom

Hands - the most important region affected by rheumatoid arthritis

Reumatoидни артрит је кронична, прогресивна, упална реуматска болест чији узрок није познат. Најчешћа локализација захваћених зглобова у реуматоидном артритису су шаке. Задебљања зглобова, оштећење тетива, деформације и slabost мишића пружају не само оtežano обављање финих покрета, већ и ослабљен стисак шаке и губитак грube snage šake, као основних функција šake. Health Assessment Questionnaire (HAQ) je структурirani upitnik s 20 пitanja u 8 domена, a ocjena могућности обављања pojedine radnje s određuje na 4-stupanjskoj лjestvici (0 - 3).

HAQ je обvezан дио процјене и учинка терапије у клиничким испитивањима. Постоји повезаност трајања реуматоидног артритиса и степена неподношљивости. Информирањост и едукација болесника и његових ближњих, примјена правдодобног и одговарајућег медикаментозног лiječenja, поступака физикалне medicine и rehabilitacija, провођење мјера самопомоći, уključivo прilagodbu načina života, u velikoj mjeri pridonosi kvalitetnijem životu болесника с реуматоидним артритисом.

Ključне ријечи: реуматоидни артритис; шаке; HAQ