

prednosti. Medikamentoznu terapiju preporučujemo samo u kombinaciji sa dinamičkom ortozom, sa kojom su i rezultati liječenja znatno bolji nego ako se primjeni samo dinamička ortoza, kako je ranije iznešeno.

Znajući nepovoljnosti koje prate medikamentoznu terapiju mislimo da i nju treba primjenjivati samo kod izvjesnog broja pacijenata, jer je primjena dinamičke ortoze uglavnom dovoljna kako je to našim radom i dokazano.

LITERATURA

1. Bourcier, A., Jusserand, J., Michelet, J.: *Rheumatologie et kinesithérapie*, Maloine S. A. Editeur, Paris, 1978.
2. Duplay, S.: *De la periarthrite scapulo-humérale et de raideurs de l'épaule qui en sont la conséquence*, Archives générales de la médecine, 2, 513—525, 1972.
3. Berović, Z.: *Fizikalno liječenje humeroscapularnog periarthritisa*, Medicinski glasnik II, 488—490, 1957.
4. Berović, Z.: *Reumatologija*, Med. knjiga Beograd — Zagreb, 1966.
5. Mezulić, Lj.: *Sindrom bolnog ramena*, Simpozijum o reumatskim bolestima; Ljubljana 1968, str. 239—253.
6. Radulović, R.: *Etude D'une orthése d'assistance dynamique de suspension pour le membre supérieur*, These essciences, L'université René Descartes, Paris, 1978.

Referati iz časopisa

Tradicija liječenja pijenjem karlovarske vode kod nefro-uroloških bolesti (Tradition der Karlsbader trinkkur bei Nephrologischurologischen heilanzügen) — Autori daju historijski pregled upotrebe kure pijenja vode iz Karlovič Vara bolesnicima koji pate od bolesti urinarnog trakta napose kod bolesnika s urolitijazom. Dokazano je da je takav oblik liječenja najkorisniji onim bolesnicima s bubrežnim kamencima koji su građeni od mokraćne kiseljine što i danas predstavlja glavnu kontraindikaciju (Križek V. i Sadilek L., Balneol. bohem., 14 (2):39—44, 1985).

I. J.

Akutni uklješteni sindrom i njegovo liječenje manipulacijom pod lokalnom periarikularnom anestezijom (Acute locked facet syndrome and its treatment by manipulation under local periarticular anesthesia) — Sindrom obično nastaje naglo nakon djelovanja trivijalne sile a karakteriziran je bolom koji se projicira unilateralno i u području stražnjeg ramusa te po-