

## Obnovimo znanje (jedan odgovor je točan)

Priredila: prim. Suzana Kumbrija, dr. med., spec. opće medicine

1. **Tipični simptomi za srčano zatajenje**  
(jedan odgovor nije točan)
  - a) nedostatak zraka
  - b) ortopneja
  - c) paroksizmalna dispneja
  - d) redukcija tolerancije napora
  - e) otok kapaka
2. **Manje tipični simptomi srčanog zatajenja**  
(jedan odgovor nije točan)
  - a) dobitak na težini  $>2$  kg /tjedan
  - b) noćni kašalj
  - c) bol u trbuhu
  - d) palpitacije
  - e) „wheezing“ („sipnja“)
3. **Specifični znak za srčano popuštanje**  
(jedan odgovor je točan)
  - a) hepatojugularni refluks
  - b) ventrikularni galop
  - c) zastojni hropci
  - d) pleuralni izljev
  - e) sve navedeno je točno
4. **Normalna ejekcijska frakcija srca**  
(jedan odgovor je točan)
  - a) 45-65%
  - b) 55-60%
  - c) 60-70%
  - d) 40-60%
  - e) 70-80%
5. **Koje dijagnostičke testove bi trebalo napraviti u obradi srčanog zatajenja u PZZ**  
(jedan odgovor nije točan)
  - a) rtg srca i pluća
  - b) KKS, Fe, TIBC, K, Na
  - c) EKG
  - d) TSH
  - e) ergometrija
6. **Biomarker- BNP**  
(moždani natriutetski peptid)  
(jedan odgovor nije točan)
  - a) zlatni standard za dg srčanog zatajenja, posebno one sa očuvanom EF
  - b) zatajenje bubrega i plućna embolija povećavaju razinu BNP-a
  - c) s godinama starosti razina se smanjuje
  - d) porast  $> 100$  pg/ml potvrđuje dijagnozu srčanog zatajenja
  - e) kod FA (fibrilacija atrija) povišena je razina BNP-a

7. **Što od dolje navedenog može utjecati na redukciju razine BNP-a**  
(jedan odgovor je točan)
- a) diabetes mellitus
  - b) debljina
  - c) ženski spol
  - d) dermatomiozitis
  - e) hipertireoza
8. **Za srčano zatajenje vrijedi**  
(jedan odgovor nije točan)
- a) imamo 2 tipa: s reduciranim EF i s očuvanim EF
  - b) pacijenti s normalnom EF LV bez dilatacije LV imaju neki oblik strukturne srčane bolesti i/ili dijastoličku disfunkciju
  - c) pacijenti sa dijastoličkom disfunkcijom ne moraju imati tipične simptome srčanog zatajenja
  - d) diuretici u srčanom zatajenju reduciraju simptome i znakove kongestije
  - e) blokatori aldosterona dodaju se već u inicijalnoj fazi srčanog zatajenja
9. **Inicijalna terapija pacijenata sa srčanim zatajenjem mora uključivati**  
(jedan odgovor je točan)
- a) diuretik, ACE inhibitor, BB (beta blokator)
  - b) ACEI, BB, antiaritmik
  - c) BB, antiaritmik (amiodaron), blokator aldosterona (spironolakton)
  - d) antiaritmik, antikoagulans, ACE
  - e) ACE, blokator aldosterona, diuretik
10. **Što treba kontrolirati svaka 3 mjeseca u laboratorijskim testovima kod pacijenata sa srčanim zatajenjem koji su na terapiji s ACEI i diuretikom** (jedan odgovor je točan)
- a) K, Na, jetreni enzimi
  - b) K, renalna funkcija
  - c) K, Na, GUK
  - d) K, Na, Fe
  - e) K, Na, lipidogram

TOČNI ODGOVORI: 1e, 2c, 3e, 4B, 5e, 6c, 7b,  
8e, 9a, 10b