

GNIJEŽĐENJE GREGULE *Puffinus yelkouan* NA HRVATSKOJ OBALI JADRANA

*Breeding of the Yelkouan Shearwater *Puffinus yelkouan*
in Croatian part of Adriatic sea*

ROBERT CRNKOVIĆ

Balancane 18, 21220 Trogir

Gregula *Puffinus yelkouan* gnježdarica je Sredozemlja i njeno gniyežđenje je potvrđeno za većinu zemalja spomenutog područja (CRAMP i sur. 1977, GRIMMET i JONES 1989). Za hrvatski dio Jadrana do sada su postojale nesigurne indikacije spomenute u npr. Crvenoj knjizi ugroženih ptica Hrvatske (RADOVIC i sur. 2003). Dana 7. lipnja 2005., tijekom obilaska kolonije velikog zdvoja *Calonectris diomedea* na otočiću u uvali Zaklopatica na otoku Lastovo, u jednoj pukotini pronašao sam mladunca gregule, starog 20–30 dana. Daljnjom pretragom lokaliteta u jednoj sam pukotini pronašao dvije mrtve odrasle ptice kojima su ostale djelomično sačuvane glave i jedno krilo. Provjerom mjera tih ostataka (dužina kljuna 35 te 37 mm i dužina krila 222 mm) i usporedbom s podacima u literaturi (CRAMP i SIMMONS 1977) ustanovio sam da su to bila

dva odrasla primjerka gregule. Prema stanju u kojem su bili pronađeni ostaci, procijenio sam da su ptice mrtve najviše petnaestak dana. Kako do sada nije bilo sigurnih podataka o gniježđenju ove vrste na istočnoj obali Jadrana (RADOVIĆ i sur. 2003), ovaj nalaz po prvi puta potvrđuje gniježđenje gregule za Hrvatsku.

LITERATURA

- CRAMP, S., SIMMONS, K.E.L. (ed.) (1977): Handbook of the birds of Europe, the Middle East and North Africa. Vol. I. Oxford University Press. New York.
- GRIMET, R.F.A., JONES, T.A. (ed.) (1989): Important bird areas in Europe. ICBP Technical Publication No. 9. ICBP, Cambridge, UK.
- RADOVIĆ, D., KRALJ, J., TUTIŠ, V., ĆIKOVIĆ, D. (2003): Crvena knjiga ugroženih ptica Hrvatske. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja. Zagreb, Hrvatska.

SUMMARY

During investigation of breeding colony of Cory's Shearwaters *Calonectris diomedea* on the north coast of island Lastovo, on 7th June 2005., one 20–30 days old pullus of Yelkouan Shearwater *Puffinus yelkouan* was found in breeding burrow. Also cadavers of two adult birds were found. Measurements of remains of heads and one wing were taken. It is the first record of Yelkouan Shearwater breeding in Croatia.