

za težinskim %, a NK = 3. odišnje štuke dala je rezultat = 9,3%. Nekolika su vrijednost 88—69,5. Ovaj je riba sa vironomidi i ribe

ijim štukama jer je izvršeno

ature vode NK

ature vode NK

oji su bitni dijeli riblja hrana. uni budu zastupaju riblje vih tvari, hra-

r. svježe tvari

Pepeo	Kategorije
4,21	1039
6,28	845
1,50	549

važnost hrani i shrani ribe. a kod nas nije ovedena, i zato

se nameće potreba da ga zahvati Institut i počasnom čim se za to pruži mogućnost.

Isto tako važan problem, povezan sa spomenutim, jeste i uzgoj prirodne

hrane. U idućim brojevima iznijetiću metodiku uzgoja pojedinih vrsta riblje hrane koliko je do danas znanosti poznato i meni pristupačno.

Ing. Ćićin Lili

LITERATURA

Carl Scholz: Experimentelle Untersuchungen über die Nahrungsverwertung des ein- und zweisommerlichen Hechtes. Zeitschrift f. Fisch. Bd. XXX/1932. Berlin, 1932.

Dr. Hermann Lechner: Über den Zusammenhang von Gewicht und Längemas- sen. Zeitschrift f. Fisch. Bd. XXXVI (1938). Berlin, 1938.

ISHRANA RIBA I OSNOVNA PITANJA RIBARSKOG GOSPODARSTVA*)

Kao što se kod procjene ribljeg ulova jedne vode uzima u obzir i količina hranidbenih objekata te vode, tako se prema njihovu rasporedu može odrediti i raspored gospodarskih riba. To je čest slučaj u većim jezerima i rijekama, jer tamo gdje se nagomilava izvjesna hrana okuplja se i riba. Riba uvijek kreće prema onom mjestu, gdje ima više hrane. Ona se dakle kreće u određenom pravcu, t. j. migrira u svrhu ishrane.

Osim ove migracije ribe migriraju i u svrhu mriještenja, a izvjesne vrste mlađa kreću do mjesta svog stalnog obitavanja. Nas ovdje zanima samo migracija ribe u vezi sa njihovom ishranom. Ona se vrši u dva pravca, horizontalnom i vertikalnom, pa se prema tome razlikuje horizontalna i vertikalna migracija riba.

Horizontalnu migraciju vrše one ribe, koje ostavljaju ikru u rijekama i na svom povratku u more kreću se u svrhu hranjenja prema mjestima jače koncentracije hrane. Mjesta njihova gojenja nalazi se katkad dosta daleko od ušća rijeka, na pr.: kaspiačka postruga (*Acipenser stellatus* Pallas, iz por. je-

setre, živi u Kaspijskom, Azovskom i Crnom moru, te migrira u rijeke. Dolazi pojedinačno u rijeci Marici, Dunavu, Savi, Dravi i Jadranskom moru). ulazi na mrijest u rijeku Kuru, a kad se vraća hrani se uglavnom kraj istočne obale Kaspije. Tako mladunci lososa iz Amura odlaze radi hranjenja k japanskim ostrvima.

Poznate su također migracije riba iz dubina k obali. U jezerima u proljeće, kad se u obalnoj plitkoj zoni voda zagrije, mnoge dubinske ribe prelaze u ovu zonu, gdje su usloviji prehrane mnogo bolji, nego li u hladnim slojevima dubina. Tako se isto događa i u jesen kod nekih riba, kao na pr.: kod ozimica (*Coregonus*), koje u jezerima kreću u svrhu traženja hrane iz dubine k obali.

Dnevne migracije opažene su i kod uljeve (Alburnus).

U zimi kad se u mnogim jezerima gubi (dubinski (profundalni) životinjski svijet, odnosno migrira u manje duboka mjesta (sublitoral), na pr. dubinske forme hironomida odlaze u sublitoral (ličinke jedne grupe dvokrilih kukaca), kreću tada za njima i ribe u pokretu za hransom.

Opažene su i migracije tokom jednog dana, t. zv. dnevne migracije na pr.:

*) Vidi »Sl. Rib. Zgb.« IX-1950. str. 199.

kod ukljeve (*Alburnus*), koja noću zalaže u obalno rašće, gdje malazi hrana u vidu zračnih kukaca (Čerfas, 1934).

Vertikalne hranidbene migracije stoje se u tome da se ribe kreću u vertikalnom pravcu iz dubljih slojeva prema površini i obrnuto, već prema tome gdje se objekti njihove hrane nalaze. Takve migracije vrše se u toku dana iz jednog sloja vode u drugi. Glamoči (Gobiidae) Bajkalskog jezera vrše u toku dana kretanje iz jednog sloja u drugi; a *Synodontis* u jezerima Istočne Afrike kreće se noću iz dubine na površinu radi kukaca dvokrilaca.

Ovi nam primjeri pokazuju kako je važno utvrditi kretanje riba u svrhu ishrane. Prema količini određene hrane u izvjesnom vodenom bazenu može se unaprijed pretpostaviti kretanje riba i njegov intenzitet, pa se onda prema tome određuje mjesto, gdje će se riba uloviti, na koji način i u kojoj količini.

Radi reguliranja ribljih vrsta u pojedinim vodenim bazenima važno je poznati njihovu ishranu, jer se onda može pristupiti potrebnim mjerama. U tu svrhu uspoređuje se njihov spektar ishrane, t. j. procenat težine pojedinih komponenata hrane (Nikoljski, 1944).

Šorigin (1939) predlaže za određivanje sastava hrane kod različitih vrsta riba, koje međusobno konkuriraju, upotrebju koeficijenta hranidbene sličnosti, koji se izraže sumom manjih veličina u spektru ishrane. Na pr.: ako se parstrva hrani takvom hranom u kojoj ima od riba 55% pijora a od insekata 30% dvokrilih imaga i 15% efemerenidnih larva (*Ephemeroptera*) a klen sa 75% pijora, 20% dvokrilih imaga i 5% efemerenidnih larva, to je koeficijent hranidbene sličnosti:

$$\frac{55}{75} \cdot \frac{30}{20} \cdot \frac{15}{5} = 55\% + 20\% + 5\% = 80\%$$

a to je već veliki koeficijent hranidbene sličnosti.

Nikoljski navodi za sjeverni Kaspij najveći koeficijent hranidbene sličnosti od 60% između Krkuše (*Gobius fluviatilis* Pallas) i vrste *Gobius caspius*, a najmanji, odnosno jednak nuli između vrsta *Gobius Kessleri* Günther i *Benthophilus stellatus* (por. Gobiidae).

Koeficijent hranidbene sličnosti ne ostaje stalан по величини, већ се mijenja према сезони, старости риба и чланом мизу других фактора.

Prema tome сва истраживања конкуренције међу рибама која се изразују бројем, врше се засада само у сврху олакшавања у снабдевању њихових међусобних односа са саобраћајем на исхрану.

Prema односу риба и hrane дјели се hrana (према Nikoljskom) на неколико категорија:

1) Osnovna hrana, kojom se riba обично hrani i koja sačinjava osnovни sadržaj crijeva.

2) Drugostepena hrana, koja se sruče stalno u crijevu ribe, ali u manjoj količini.

3) Slučajna hrana koja se rijetko nalazi u crijevima ribe.

Osim ovih vrsta hrane, потребно је издвојити onu hrani na koju riba prelazi onda, kad joj nestane osnovne.

Za određivanje izbora rible sposobnosti prema odnosu te ili one vrste hrane izračunava se indeks sposobnosti izbora. Taj se dobije tako, da se proportionalni broj količine objekata hrane u crijevu ribe podijeli sa proportionalnim učestvovanjem toga objekta u onoj okolini u kojoj se riba hrani. Ako se riba hrani planktonom divizor će biti onaj proportionalni broj koji se izračuna iz ulova planktona, ако se pak hrani životinjama dna, bentosom, onda se divizor izračuna iz ulova bentosa. Radi li se o ribama grabljevnicama izračuna ће тај divizor iz ulova riba.

ficijent hranid-

sjeverni Kaspij
mildene slječno-
čkuše (Gobius
ste Gobius cas-
mo jednak nuli
essleri Günther
s (por. Gobi-

e sličnosti ne
i, već se mijes-
ti riba i čita-
ra.
čivanja konku-
oja se izrazuju
samo u svrhu
njihovih među-
na hrani.
hrane d'jeli se
m) na nekoliko

kojom se riba
činjava osnovni

a, koja se sreće
li u manjoj ko-

čaja se rijetko

je, potrebno je
koju riba pre-
ane osnovne.

i riblje sposob-
e ili one vrste
eks sposobnosti
ako, da se pro-
objekata hranid-
jeli sa procen-
toga objekta u
riba hrani. Ako
n d'vizor će bi-
oj koji se izra-
ra, ako se pak
bentosom, onda
ulova bentosa-
rabljivicama iz-
ulova riba.

Ako je indeks sposobnosti izbora veći od jedinice, znači, da je hranidbeni objekt riba izabrala, ako je manji od jedinice, onda taj hranidbeni objekt riba izbjegava.

Tako se na pr.: smuđ zuban (Lucio-perca lucioperca L.) u Aralskom Moru hrani sabljarkom [Pelecus cultratus (Linne)], koji mu služi kao osnovna hrana i postiže vrlo velik indeks sposobnosti izbora od 24,2. U isto vrijeme hrani se i deverikom (Abramis brama L.), no indeks sposobnosti izbora u ovom je slučaju 0,37, dakle manji od 1, što pokazuje da smuđ zuban taj hranidbeni objekt izbjegava.

I u ovom slučaju postavljanja indeksa sposobnosti izbora treba uzeti u obzir niz faktora: način uzimanja fauna dna, planktona, vrste oruđa lova, veličinu ribe i drugo.

Uz spomenuta pitanja u racionalnom ribarskom gospodarstvu postavlja se težište na trajnom iskorištavanju otvorenih voda i ribnjaka. Zato se uz izlovljavanje pojavljuje odmah i pitanje porobljavanja dotične vode, kako bi se regulirala njena riblja količina.

Pitanje porobljavanja povezano je opet sa količinom i vrstom riblje hrane. O količini riblje hrane zavisi intenzivnost njena trošenja ili drugim riječima: koliko ima hrane, toliko ima i riba. Da se što pravilnije može izvršiti nasadihanje u prirodne vode i ribnjake postavljene su u ribarstvu odgovarajuće norme.

Navedi će jedan primjer proračuna nasada u potoku (prema Eleonskom, 1936. g.)

Proračun nasada mlađa ili godišnjaka vrši se u skladu sa produktivnošću potoka i onom konačnom težinom masadnih riba, koju želimo postići na kraju sezone.

Ako produktivnost nekog salmonidskog potoka iznosi 25 kg na 1 km njegova toka; a naša je želja da pastrve

koje će u jesen biti dvogodišnje postignu težinu od 125 gr po komadu ($\frac{1}{8}$ kg), tada će nasad iznositi najmanje 200 godišnjaka ($25 \times 8 = 200$).

Kod proračuna nasada mlađa uzimaju se u obzir samo oni dijelovi potoka koje pastrvski mlađ može iskoristiti, no nekad se odrupa od toga (do 90%).

Walter smatra, da na malu površinu potoka od 1 m² treba staviti 5 komada pastrvskog mlađa. Međutim u Francuskoj se nasad pastrvskih ovogodišnjaka (starih 4–5 mjeseci) na 1 km potoka izračuna na ovaj način:

$$x = 10 B (L + 5)$$

Sa B se označuje bonitet, odnosno produktivnost potoka. Broj 1 označuje najslabiju produktivnost potoka, a broj 10 najveću, dok brojevi 2, 3, 4,... označuju međustepene ove produktivnosti, L pokazuje prosječnu širim potoka, izraženu u metrima.

U ovom slučaju riba je upućena samo na prirodnu hrani u samom potoku i zato treba paziti, da se ne prekoraci norma nasada, jer veća količina ribe ne bi našla dovoljno hrane.

Međutim, kod intenzifikacije ribarskog gospodarstva, kada se u ribnjaku nasade mnogo ribe, mora se pristupiti i krmljenju riba. Tada treba uzeti u obzir hranidbeni koeficijent toga krmliva.

Proračun nasada šarana u svrhu krmljenja umjetnim krmivom računava se pomoću ove formule: (prema Isajevu i Dorohovu, 1949).

$$A = \frac{H \times P + \frac{K}{k} \times 100}{(T - t) \times R}$$

gdje je

A = početna količina godišnjaka šarana, koji je određen za nasad u određeni vodenim bazen — tovljnjak;

P = prirodna produktivnost ribnjaka u kilogramima na hektar;

K = potpuna količina umjetnog krmiva u kilogramima;
k = njegov hranidbeni koeficijent;
100 = procenti;
T = težina jednog šarana u jesen, izražena u kilogramima;
t = težina šarana godišnjaka, nasađenih u ribičak u proljeće, izražena u kilogramima;
R = prihod riba u jesen uzet u procentima, od one količine ribe koja je nasađena u proljeće.

Uz norme nasada riba i poznavanje količine krmiva kod potkrmljivanja potrebno je poznavati i različite promjene u količini te krme u toku sezone uzgoja riba, kao i niz drugih pitanja.

Iz navedenih proračuma vidi se stre-

mljenje prakse prema što boljem rješenju problema ishrane riba, koja je tako usko povezana sa pitanjem ribične proizvodnje u racionalnom ribarskom gospodarstvu prirodnih voda i ribnjaka.

(Nastaviti će se)

Prof. Ljubica Kostić

Zagrebačko ribarsko društvo poziva svoje članove, da u društvenoj prostoriji — Zagreb, Gajeva ul. 40 — što prije podignu svoje državne udjelačke ribolovne dozvole.

UPRAVA Z. R. D.

Savez sportskih ribolovnih društava NR Hrvatske održao je 6. XI. 1950. god. plenarni sastanak. Prisustvovali su svi članovi upravnog odbora saveza. Raspravljalo se o cijelokupnom radu saveza u 1950. god.

Tim povodom donijet ćemo u narednom broju našega lista izvještaj o radu saveza.

NAŠIM PRETPLATNICIMA!

KAKO SE PРИБЛИЖАВА КРАЈ ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ, МОЛИМО ВАС, ДА НАМ ШТО ПРИЈЕ ДОЗНАЧИТЕ ЗА ОСТАТКЕ ПРЕТПЛАТЕ. ДОПИСЕ О ТОМЕ, УЗ ПОТРЕБНЕ ЧЕКОВЕ, ПОСЛАЛИ СМО СВИМА ОДНОСНИМ ПРЕTPLATNICIMA.

ZA ПРЕТПЛАТУ ЗА 1951. GOD. POSLAT ĆЕМО ЧЕКОВЕ УЗ BR. XI/50. НАШЕГ ЛИСТА.

UPRAVA »SLATKOVODNOG РИБАРЕСТВА ЈУГОСЛАВИЈЕ«

PROIZVODNA РИБАРСКА ЗАДРУГА »DEVESCOVI REMIGIO« ROVINJ

ZADRUGA BROJI DOSADA
VEĆ 155 ZADRUGARA

TEKUĆI RAČUN KOD НАРОДНЕ БАНКЕ — PODRUŽNICA
ROVINJ — BROJ 512-105058 — BROJ TELEFONA: 22