

¹Ordinacija za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu
Nikole Andrića 3 ♦ 10020 Zagreb - Novi Zagreb

²Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za spondiloartropatije
Klinički bolnički centar "Sestre milosrdnice" ♦ Vinogradarska 29 ♦ 10000 Zagreb

**KVANTITATIVNA ANALIZA DERMATOGLIFA
DIGITOPALMARNOG KOMPLEKSA U ČETRDESETORICE BOLESNIKA
S REAKTIVNIM SPONDILOARTRITISOM (REITEROV SINDROM)**

**QUANTITATIVE ANALYSIS OF DIGITOPALMAR DERMATOGLYPHICS
IN FORTY MALE PATIENTS
WITH REACTIVE SPONDYLOARTHRITIS (REITER'S SYNDROME)**

Miljenko Cvjetičanin¹ ♦ Zrinka Jajić²

U radu se kvantitativnom analizom digitopalmarnih dermatoglifa istražio broj grebenova u četrdeset bolesnika s reaktivnim spondiloartritisom (Rajterov sindrom). Analizirano je 25 varijabli, broj grebenova na svih deset prstiju šaka, zatim, sveukupno na pet i deset prstiju, te između triradijusa a-b, b-c, c-d i a-d na jednom i oba dlaña, te oba dlaña zajedno, i atd kutova na svakom dlanu i njihovo obostrani zbroj u stupnjevima. Dobiveni podaci su uspoređeni sa 200 pari otisaka fenotipski zdravih muškaraca Zagrebačke regije kao kontrole. Statistički značajne razlike prema t-testu pronađene su u jedanaest varijabili u smislu povećanog broja grebenova na prvom,

drugom, trećem i petom prstu obje šake, te na svih pet prstiju zasebno i svih deset prstiju zajedno. Prema Mann-Whitney testu, statistički značajne razlike pronađene su u još tri varijable: povećanom broju grebenova na četvrtom prstu desno, te smanjenom atd kutu na desnom dlanu i smanjenom obostranom atd kutu u stupnjevima, dakle, sveukupno 14 varijabli. Zaključno se može reći kako je poligenski sustav u razvoju dermatoglifa na prstima i dlanovima identičan s nekim lokusima za razvoj dermatoglifa u Rajterovom sindromu.

Ključne riječi: dermatoglifi, Reiterov sindrom, muški spol, kvantitativna dermatoglifkska analiza