

Dječja bolnica Srebrnjak ♦ Srebrnjak 100 ♦ 10000 Zagreb

KLASIFIKACIJA JUVENILNIH SPONDILOARTROPATIJA THE CLASSIFICATION OF JUVENILE SPONDYLOARTHROPATHIES

Miroslav Harjaček

Sažetak

U radu je prikazana klasifikacija juvenilnih spondiloartropatija.

Ključne riječi

juvenilne spondiloartropatijske, klasifikacija

Summary

The classification of juvenile spondyloarthritides is presented.

Keywords

juvenile spondyloarthritides, classification

Uvod

Juvenilne spondiloartropatijske spadaju u najčešće reumatske bolesti dječje dobi, a uključuju nediferencirane juvenilne spondiloartropatijske (ErA), juvenilni AS, dok artritis vezan uz upalnu bolest crijeva, reaktivni artritis, Reiterov sindrom, te psorijatični artritis nisu saставni dio ILAR-ove klasifikacije, iako po svojim kliničkim i laboratorijskim obilježjima tu svakako i pripadaju. Osnovne karakteristike ove skupine uključuju kasniji nastup bolesti (>8 godina) pretežito u dječaka (m:ž=6:2), a uz artritis i entezitis (Ahilove teticne, infrapteklarni entezitis, itd.) i negativni nalaza reumatskog i antinuklearnog faktora. Najveći broj bolesnika ima zahvaćene sakroilijakalne zglobove i/ili bol u lumbosakralnoj regiji. Pozitivna obiteljska anamneza spondiloartropatijske je izrazito česta u HLA-B27, ili u Hrvatskoj i HLA-B7 pozitivnih bolesnika. U Hrvatskoj, bolesnici koji su HLA-B*0702 pozitivni imaju 2,61 puta veći relativni rizik (RR) razvoja juvenilnih spondiloartropatijskih bolesti, dok u HLA-B*2705 pozitivnih bolesnika on iznosi 5,69. Pred-

nji uveitis u juvenilnih spondiloartropatijskih bolesti, za razliku od JIA, započinje kao akutna bolest praćena crvenilom i pojačanim suzenjem oka. Juvenilni AS u dječjoj dobi ima dva različita tijeka; brzo progresivan koji se ne razlikuje od bolesti odraslih i blaži oblik ("genuini") koji se razvija izrazito sporo i ima odličnu prognozu. Osim uobičajenih mikroorganizma (npr. *Salmonella*, *Shigella*), u dječjoj dobi reaktivni artritis uzrokuju i bakterije kao npr. *Mycoplasma pneumoniae* i *Borellia burgdorferi*. Prema definiciji, bolesnici s reaktivnim artritisom nakon 6 mjeseci nemaju više znakova bolesti, iako se u zadnje vrijeme sve više govori o kroničnom obliku ReA koji se ni po čemu ne razlikuje od JIA osim što postoji dokazana etiologija bolesti (*forma frusta*). Upala sinovijske u jSpA je karakterizirana naglašenom hiperplazijom površnog sloja, izrazitom hipervaskularnošću i postojanjem upalnog infiltrata limfocita i makrofaga bez obzira na trajanje bolesti i fazu bolesti kad je učinjena sinovijska biopsija.

Klasifikacija

Klasifikacija juvenilnih spondiloartropatijskih bolesti vrlo je problematična i još uvijek nedorečena. Godine 1982. Rosenberg i Petty prepoznali su sindrom seronegativne entezopatijske i artropatijske (SEA), što je nadahnulo ILAR-ovu radnu skupinu za klasifikaciju dječjih artritisa da 1995. godine uključe kategoriju artritisa povezanih s entezitidom (ErA) u klasifikaciju juvenilnih idiopatskih artritisa. Prema tim kriterijima spondiloartropatijske u mnoge djece klasificirane je kao ErA, te je uvrštena u jednu

od sedam podgrupa juvenilnog idiopatskog artritisa. No, problem s takvom klasifikacijom je da kriteriji za ErA-u uključuju psorijatični artritis (PsA) i reaktivni artritis (ReA) iz juvenilnih spondiloartropatijskih bolesti i da upalna bolest crijeva (IBD) ima samo deskriptivno značenje.

Drugi set kriterija razvila je Evropska grupa za proučavanje spondiloartropatijskih bolesti (ESSG). Kriteriji su validirani u djece, no inzistiranje na upalnoj boli kralježnice kao jednom od glavnih simptoma ograničava upotrebu krite-

Slika. Klasifikacijski kriteriji juvenilnih spondiloartropatija
Figure. Classification criteria for juvenile spondyloarthritides

ESSG kriteriji (Dougados, van der Linden et al. 1991.)

Upalna križobolja ili asimetrični sinovitis ili artritis donjih udova i najmanje jedan od sljedećih kriterija:
pozitivna obiteljska anamneza spondiloartropatija, uveitis, psorijaza, upalna bolest crijeva, entezitis, radiološki potvrđen sakroileitis

AMOR kriteriji (Amor, Dougados et al. 1991.)

A. Klinički znakovi ili postojanje sljedećeg

1. noćna bolnost lumbalnog ili dorzalnog dijela kralježnica i/ili jutarnja ukočenost (1 bod)
2. asimetrični oligoartritis (2 boda)
3. dugotrajna bol u stražnjici ili naizmjenična bolnost stražnjice (1 ili 2 boda)
4. kobasičasti prst na rukama ili nogama sausage (2 boda)
5. bol u peti ili drugim lokacijama entezitisa (2 boda)
6. uveitis (2 boda)
7. ne-gonokokni uretritis ili cervicitis unatrag mjesec dana od nastupa artritisa (1 bod)
8. proljev unatrag mjesec dana od nastupa artritisa (1 bod)
9. prisutnost ili postojanje psorijaze u anamnezi i/ili balanitis i/ili kronična enteropatija (2 boda)

B. Radiološki znakovi

10. Sakroileitis (≥ 2 stupanj ako je obostran, ili ≥ 3 stadij ako je jednostran - 3 boda)

C. Genetika

11. prisustvo HLA-B27 i/ili obiteljske anamneze ankirozantnog spondilitisa i/ili Reiterovog sindroma i/ili psorijaze i/ili uveitisa i/ili kronične enteropatije (2 boda)

D. Odgovor na terapiju

12. Poboljšanje boli unutar 48 sati korištenja NSAID ili pogoršanje unutar 48 sati nakon prestanka korištenja NSAID (2 boda)

Dijagnoza spondiloartropatije se postavlja kada bolesnik zadovolji više od 6 bodova od 12 postavljenih kriterija

SEA sindrom (Rosenberg and Petty 1982.)

SERONEGATIVNOST = nedostatak RF i ANF-a

ENTEZOPATIJA = tendinitis Ahilove tetic, plantarne fascije ili tetic kvadricepsa

ARTROPATIJA = upalni artritis aksijalnog skeleta ili oligoartropatija

ErA (Durbanski kriteriji) (Petty, Southwood et al. 1998.)

Artritis ili entezitis plus dva ili više od sljedećih kriterija

- A. bolnost sakroiličnog zglobova i/ili upalna križobolja
- B. prisutnost HLA-B27
- C. prisutnost HLA-B27 pozitivne bolesti u obitelji prvog ili drugog koljena i potvrđena od strane liječnika
- D. prednji uveitis (tipično bolan uz crvenilo i/ili fotofobiјu)
- E. nastup artritisa u dječaka starijeg od 8 godina

I ništa od dolje navedenog

- A. prisustvo psorijaze u obitelji prvog ili drugog koljena potvrđena od strane dermatologa

- B. prisustvo sistemskog oblika artritisa

Atipični spondiloartritis u djece (Hussein, Abdul-Khalil et al. 1989.)

Glavni kriteriji

1. prisustvo spondiloartrita ili oligoartritis u obitelji
2. entezopatija
3. artritis prstiju
4. sakroileitis
5. HLA-B27 pozitivnost
6. rekurentni artritis ili artralgije

Pomoćni kriteriji

1. nastup bolesti nakon 10. godine života
2. muški spol
3. zahvaćenost samo donjih udova
4. akutni iridociklitis ili konjunktivitis
5. artritis kukova
6. početak nakon nedokazanog enteritisa

Atipični spondiloartritis je vjerujatan ako su zadovoljena 3 glavna i 2 pomoćna kriterija

Juvenilni spondiloartritis (Garmisch-Partenkirchen kriteriji) (Hafner 1987.)

Glavni kriteriji

1. asimetrični oligoartritis sa zahvaćenošću kukova, koljena ili nožnih zglobova
2. entezopatija
3. bolnost lumbalne kralježnice ili sakroiličnog područja
4. akutni iridociklitis

Pomoćni kriteriji

1. periferni artritis 5 ili više zglobova
2. muški spol
3. nastup bolesti poslije 6 godine života
4. HLA-B27 pozitivnost
5. (sumnja na) spondiloartritis u obitelji

Spondiloartritis je vjerujatan ako su zadovoljeni jedan glavni i najmanje 2 pomoćna kriterija

rija u dječjoj populaciji. Naime, taj simptom nije čest u djece u prvih pet godina bolesti. Upravo zbog toga navedeni kriteriji u djece imaju nižu osjetljivost, pozitivnu prediktivnu vrijednost i preciznost nego u odraslih.

Kriterije za klasifikaciju spondiloartropatija u odraslih, koji se mogu koristi u djece, razvio je i Amor. Poput ESSG kriterija i ovi kriteriji imaju nižu osjetljivost u djetinjstvu.

Nedavno istraživanje pokazalo je da Garmisch-Partenkirchen kriteriji imaju najvišu osjetljivost u djece, zbog čega su predloženi za otkrivanje spondiloartropatija u dječjoj dobi.

Kratice

SEA=Seronegative enthesopathy and arthropathy; ILAR=International League of Associations for Rheumatology; ESSG=European Spondyloarthropa-

Spondiloartropatije u djece obično počinju kao nediferencirane i karakterizirane su perifernim asimetričnim oligoartritisom koji uglavnom zahvaća donje udove i ili perifernim entezitisom i ili daktilitisom. Tijekom vremena napreduju u diferencirane oblike bolesti. Većina djece s takvim simptomima mogla bi se prema Amoru i ESSG kriterijima klasificirati kao nediferencirana SpA.

Djeca koja imaju SEA sindrom ili djeca koja zadovoljavaju kriterije za ErA imaju povećani rizik za razvoj drugih oblika bolesti povezanih s HLA-B27, uključujući i simptome od strane kralježnice.

thy Study Group; ErA=Enthesitis related arthritis; ReA=Reactive arthritis; IBD=Inflammatory bowel disease.

Literatura

1. Petty RE, Southwood TR. et al. Revision of the proposed classification criteria for juvenile idiopathic arthritis: Durban, 1997. *J Rheumatol* 1998;25(10):1991-1994.
2. Petty RE, Southwood TR. et al. International League of Associations for Rheumatology classification of juvenile idiopathic arthritis: second revision, Edmonton, 2001. *J Rheumatol* 2004;31(2):390-392.
3. Burgos-Vargas R, Rudwaleit M. et al. The place of juvenile onset spondyloarthropathies in the Durban 1997 ILAR classification criteria of juvenile idiopathic arthritis. International League of Associations for Rheumatology. *J Rheumatol* 2002;29(5): 869-874.
4. Burgos-Vargas R, Vazquez-Mellado J. et al. Genuine ankylosing spondylitis in children: a case-control study of patients with early definite disease according to adult onset criteria. *J Rheumatol* 1996;23(12): 2140-2147.
5. Colbert RA. Classification of juvenile spondyloarthritis: Enthesitis-related arthritis and beyond. *Nat Rev Rheumatol* 2010;6(8):477-485.
6. Colbert RA. Early axial spondyloarthritis. *Curr Opin Rheumatol* 2010;22(5):603-607.
7. Dougados M, van der Linden S. et al. The European Spondylarthropathy Study Group preliminary criteria for the classification of spondylarthropathy. *Arthritis Rheum* 1991;34(10):1218-1227.
8. Sieper J, van der Heijde D. et al. New criteria for inflammatory back pain in patients with chronic back pain: a real patient exercise by experts from the Assessment of SpondyloArthritis international Society (ASAS). *Ann Rheum Dis* 2009;68(6):784-788.
9. Hafner R. Juvenile spondarthritis. Retrospective study of 71 patients. *Monatsschr Kinderheilkd* 1987;135(1):41-46.