

**Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju ♦ Klinika za unutarnje bolesti  
Klinički bolnički centar Zagreb ♦ Kišpatićeva 12 ♦ 10000 Zagreb**

## **PRIMJENA BIOLOŠKE TERAPIJE U REUMATOIDNOM ARTRITISU**

**Vesna Barbarić ♦ Jasna Stjepanović ♦ Brankica Bunjački**

Reumatoidni artritis (RA) tipičan je primjer upalne reumatske i sustavne autoimune bolesti. Bolest je nepoznatog uzroka, a od nje obolijeva oko 1% stanov-

ništva u različitim krajevima svijeta. Neliječena bolest uzrokuje radnu nesposobnost za nekoliko godina, a tešku invalidnost u roku od 10 godina u polovice obolje-

lih. Dijagnostičke su mogućnosti značajno poboljšane te se RA može brzo i sigurno dijagnosticirati već u samom početku bolesti.

Posljednjih desetak godina u liječenju RA primjenjuju se biološki lijekovi. Oni su proizvod biotehnologije. Obično je riječ o proizvodima koji su slični/jednaki proteinima ljudskog tijela. Biološki lijekovi djeluju na specifične molekularne ciljeve u tijelu (citokini ili receptori za citokine). U liječenju RA najčešće se primjenjuju biološki lijekovi protiv TNF-alfa. To su infliksimab (Remicade), adalimumab (Humira) i etanercept (Enbrel). Riječ je o molekulama dobivenim bioinženjerom, a koje su usmjerene protiv molekule koja stimulira upalu - citokina TNF-alfa (engl. tumor necrosis factor). Infliksimab i adalimumab su protutijela - infliksimab se primjenjuje intravenski u periodičkim infuzijama, a adalimumab subkutanim injekcijama u dvo-

tjednim razmacima. Etanercept je molekula solubilnog receptora, a primjenjuje se subkutano u tjednim razmacima. Osim navedenih anti-TNF lijekova, u Hrvatskoj se u liječenju RA primjenjuje rituksimab koji se koristio u liječenju limfoma. Odnedavno je registriran tocilizumab - monoklonsko protutijelo usmjereni protiv upalnog citokina IL-6. Oba navedena lijeka primjenjuju se intravenskim infuzijama.

Biološki lijekovi primjenjuju se u bolesnika u kojih liječenje uobičajenom kombinacijom lijekova (NSAR+DMARD+GK) nije rezultiralo zadovoljavajućim odgovorom. Kriteriji po kojima se procjenjuje aktivnost RA, odnosno neuspješnost liječenja, stručno su usklađeni i prihvaćeni tako da se ujednači propisivanje biološke terapije u različitim ustanovama.

**Ključne riječi:** biološka terapija, reumatoidni artritis, TNF-alfa, intravenska aplikacija.