

PRIMJENA INTRAVENSKE TERAPIJE - RITUKSIMAB (MABTHERA®)

Ana Obidić ♦ Branka Rimac ♦ Josipa Vujanić

U liječenju reumatoidnog artritisa putem intravenske terapije primjenjuje se MabThera® u kombinaciji s metotreksatom. Indicirana je za liječenje odraslih bolesnika s aktivnim reumatoidnim artritisom koji su imali neučinkovit odgovor ili nisu podnosili druge protureumatske lijekove koji mijenjaju bolest (DMARD-i), uključujući jednu ili više vrsta terapije. Ciklus liječenja MabTherom® sastoji se od dvije intravenske infuzije od 1000 mg. Preporučena doza MabThere® je 1000 mg primijenjenih putem intravenske infuzije, nakon kojih se dva tjedna kasnije istim načinom primjenjuje drugih 1000 mg. Cikluse liječenja MabTherom® moguće je ponavljati. Ovisno o znakovima i simptomima bolesti liječnik će odlučiti kada bolesnik mora ponovo primiti MabTheru®. Infuziju MabThere® treba primijeniti odmah po pripremi. KBC Zagreb ima centralnu pripremu

citostatika, a već pripremljena MabThera® se doprema do odjela. Tijekom aplikacije lijeka nužno je promatrati bolesnika kako bi se na vrijeme uočile moguće reakcije. Obvezatno je 30 minuta prije svake primjene infuzije MabThere® bolesniku intravenski dati 100 mg metilprednizolona kako bi se smanjila učestalost i jačina akutnih reakcija na infuziju. Također je potrebno prije svake infuzije MabThere® primijeniti antipiretik i antihistaminik. Osobitu pažnju potrebno je posvetiti prepoznavanju kontraindikacija kao što su: preosjetljivost na aktivni sastojak ili na koju pomoćnu tvar, aktivne infekcije, zatajenje srca ili uznapredovala nekontrolirana srčana bolest. Infuzija MabThere® fizički i kemijski je stabilna 24 sata pri temperature od 2-8°C.

Ključne riječi: reumatoidni artritis, intravenska terapija, rituksimab (MabThera®)