

**Odjel za reumatske bolesti i rehabilitaciju ♦ Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Klinički bolnički centar Rijeka ♦ Tome Stržića 3 ♦ 51000 Rijeka**

STILLOVA BOLEST ODRASLE DOBI - PRIKAZ BOLESNIKA ADULT STILL DISEASE - CASE REPORT

Doris Stamenković ♦ Nives Štiglić-Rogoznica ♦ Tea Schnurrer Luke Vrbanić ♦ Endi Radović

Stillova bolest odrasle dobi je rijetki klinički entitet koji se najčešće pojavljuje u dobi 18.-35. godine života. Vodeći simptom je vrućica nepoznatog porijekla. Rano dijagnosticiranje bolesti otežano je činjenicom da se vrućica nepoznatog porijekla često javlja u malignih bolesti i infekcija. Poteškoće su i u nepostojanju seroloških markera, te nejasnoj manifestaciji simptoma.

Prikazujemo 48-godišnjeg bolesnika, koji je do hospitalizacije u našem Odjelu, oko 1,5 godinu imao povišenu tjelesnu temperaturu od 39°C, uz bolove zglobova, koljena i ručnih zglobova. Prethodno je bio hospitaliziran u Klinici za infektologiju, gdje nije nađen uzrok febriliteta, a bio je podvrgnut i gastroenterološkoj obradi,

zbog sumnje na cirozu jetre. Stacionarnom obradom u našem Odjelu dijagnosticirana je Stillova bolest odrasle dobi prema Yamaguchijevim kriterijima (intermitentni febrilitet 39°C bez bakterijske ili druge etiologije, tipičan osip kože trupa, zatajenje jetre, splenomegalija, negativni reumatoидni faktor i ANA, tipične artralgije).

Primjenom nesteroidnog antireumatika u punoj dozi, bolesnik postaje afebrilan, uz poboljšanje kliničkog nalaza. U dvogodišnjem praćenju bolesnik je bez febriliteta i artralgija. Laboratorijski reaktanti upale su smireni.

Ključne riječi: Stillova bolest, odrasla dob, prikaz bolesnika