

¹Ordinacija za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu
Nikole Andrića 3 ♦ 10020 Zagreb - Novi Zagreb

²Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Referentni centar MZSS RH za spondiloartropatije

Klinička bolnica "Sestre milosrdnice" ♦ Vinogradска 29 ♦ 10000 Zagreb
³Lovćenska 100 ♦ 10000 Zagreb

KVANTITATIVNA ANALIZA DIGITOPALMARNIH DERMATOGLIFA U PEDESETORICE BOLESNIKA S PSORIJATIČNIM SPONDILITISOM

QUANTITATIVE ANALYSIS OF DIGITOPALMAR DERMATOGLYPHICS IN FIFTY MALE PSORIATIC SPONDYLITIS PATIENTS

Miljenko Cvjetičanin¹ ♦ Zrinka Jajić² ♦ Ivo Jajić³

U radu se kvantitativnom analizom digitopalmarnih dermatoglifa istražio broj grebenova u pedeset muškaraca s psorijatičnim spondilitisom.

Analizirano je 25 varijabli, broj grebenova na svih deset prstiju šaka, zatim, sveukupno na pet i deset prstiju, te između triradijusa a-b, b-c, c-d i a-d na oba dlanova, te njihov ukupan broj na jednom i oba dlanova, te atd kutovi na oba dlanova i njihov ukupni broj u stupnjevima. Dobiveni podaci su uspoređeni s kontrolnom skupinom od 200 pari otiska odraslih i fenotipski zdravih muškaraca Zagrebačke regije. Statistički značajne razlike prema kontroli nađene su u 13 varijabli u smislu smanj

njenja broja kožnih grebenova na drugom, trećem, četvrtom i petom prstu desne ruke, te sveukupnom zbroju prstiju desne ruke, zatim, na drugom, trećem, četvrtom i petom prstu lijeve ruke, sveukupnom zbroju prstiju lijeve ruke, te obostranom zbroju svih deset prstiju. Smanjeni atd kut bio je na lijevom dlanu te njegovu obostranom zbroju na dlanovima. Iz toga se dade zaključiti kako je poligenski sustav u razvoju dermatoglifa identičan s nekim lokusima za razvoj psorijatičnog spondilitisa u muškaraca.

Ključne riječi: dermatoglifi, kvantitativna analiza, psorijatični spondilitis, muški spol