

# Jedna nejednakost između sredina, njeno poboljšanje i primjena u geometriji

Šefket Arslanagić\*

## Sažetak

U radu se daje dokaz jedne nove nejednakosti u kojoj se javljaju aritmetička, geometrijska i harmonijska sredina kao i jedno njeno poboljšanje i generalizacija. Navedene su primjene te nejednakosti u geometriji trokuta.

**Ključne riječi:** *nejednakost između sredina, generalizacija nejednakosti, primjena u geometriji*

# One inequality with means, its refinement and application in geometry

## Abstract

In this paper, we give the proof of a new inequality involving means, i.e. arithmetic, geometric and harmonic, its refinements and a generalisation. Then we give a series of examples of application of this inequality in geometry of the triangle.

**Keywords:** *inequality with means, generalisation, application in geometry*

---

\*Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za matematiku, Zmaja od Bosne 35, BiH – 71 000 Sarajevo, asefket@pmf.unsa.ba

## 1 Uvod

Definirajmo prvo osnovne sredine i navedimo nejednakosti između tih sredina. Za realne brojeve  $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , definiramo

$$\begin{aligned} A &= \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} && \text{(aritmetička sredina)} \\ G &= \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} && \text{(geometrijska sredina)} \\ H &= \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}} && \text{(harmonijska sredina)} \\ K &= \sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}{n}} && \text{(kvadratna sredina).} \end{aligned}$$

Može se dokazati da vrijede nejednakosti

$$H \leq G \leq A \leq K,$$

gdje znak jednakosti vrijedi ako i samo ako je  $a_1 = a_2 = \dots = a_n$  (pogledati [1]).

Sada ćemo dokazati jednu algebarsku nejednakost u kojoj se pojavljuju aritmetička, geometrijska i harmonijska sredina triju pozitivnih realnih brojeva. Navest ćemo jedno poboljšanje te nejednakosti i njenu generalizaciju. Vrijedi sljedeće.

Za sve pozitivne realne brojeve  $x, y, z$  vrijedi nejednakost

$$x + y + z + \frac{3}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}} \geq 4\sqrt[3]{xyz} \quad (1)$$

odnosno

$$3A + H \geq 4G \quad (2)$$

gdje je, kako smo već definirali,

$$A = \frac{x + y + z}{3}, \quad H = \frac{3}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}}, \quad G = \sqrt[3]{xyz}.$$

*Dokaz.* Najprije ćemo dokazati jednu pomoćnu nejednakost koja glasi

$$A^2 \cdot H \geq G^3, \quad (3)$$

odnosno

$$\begin{aligned} & \frac{(x+y+z)^2}{3} \cdot \frac{3}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}} \geq (\sqrt[3]{xyz})^3 \\ \Leftrightarrow & \frac{(x+y+z)^2}{9} \cdot \frac{3xyz}{xy+yz+zx} \geq xyz \\ \Leftrightarrow & (x+y+z)^2 \geq 3(xy+yz+zx) \\ \Leftrightarrow & x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx \geq 0 \\ \Leftrightarrow & \frac{1}{2} [(x-y)^2 + (y-z)^2 + (z-x)^2] \geq 0 \end{aligned}$$

a ova nejednakost je očigledno točna. Jednakost vrijedi ako i samo ako je  $x = y = z$ .

Dokažimo sada traženu nejednakost (1). Imamo najprije

$$x + y + z + \frac{3}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}} = 3A + H$$

odakle zbog  $A \geq G$  imamo

$$A + A + A + H \geq 4\sqrt[4]{A \cdot A \cdot A \cdot H} = 4\sqrt[4]{A^3H}$$

pa prema (3), zbog  $A \geq G$ , dobivamo

$$4\sqrt[4]{A^3H} = 4\sqrt[4]{A(A^2H)} \geq 4\sqrt[4]{AG^3} \geq 4\sqrt[4]{G^4} = 4G.$$

Vrijedi dakle

$$x + y + z + \frac{3}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}} \geq 4\sqrt[3]{xyz}$$

što je i trebalo dokazati.

Očigledno, jednakost u (1) vrijedi ako i samo ako je  $x = y = z$ . □

Sada ćemo dati nekoliko primjera primjene nejednakosti (1) u geometriji, koristeći neke jednakosti i nejednakosti iz [2] i [3].

**Primjer 1.** Neka u nejednakosti (1)  $x, y, z$  predstavljaju duljine  $a, b, c$  stranica trokuta  $ABC$ . Tada vrijede sljedeće poznate jednakosti:

$$a + b + c = 2s, \quad abc = 4RP, \quad ab + bc + ca = s^2 + r^2 + 4Rr, \quad P = rs,$$

gdje je  $P$  površina,  $s$  poluopseg, a  $R$  i  $r$  radijus opisane, odnosno upisane kružnice trokuta  $ABC$ .

Iz nejednakosti (1) dobivamo sada sljedeću ekvivalentnu nejednakost

$$s + \frac{6Rrs}{s^2 + r^2 + 4Rr} \geq 2\sqrt[3]{4Rrs}. \quad (4)$$

**Primjer 2.** Neka su  $\alpha, \beta, \gamma$  unutarnji kutovi trokuta  $ABC$ . Stavljajući u (1)  $\alpha, \beta, \gamma$  umjesto  $x, y, z$ , ( $\alpha + \beta + \gamma = \pi$ ) dobivamo sljedeću nejednakost

$$\pi + \frac{3\alpha\beta\gamma}{\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha} \geq 4\sqrt[3]{\alpha\beta\gamma}$$

tj.,

$$4\sqrt[3]{\alpha\beta\gamma} - \frac{3\alpha\beta\gamma}{\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha} \leq \pi. \quad (5)$$

**Primjer 3.** Ako su  $r_a, r_b, r_c$  radijusi pripisanih kružnica trokuta  $ABC$  tada vrijede sljedeće poznate jednakosti

$$r_a + r_b + r_c = 4R + r, \quad \frac{1}{r} = \frac{1}{r_a} + \frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_c}.$$

Stavljajući sada u (1)  $r_a, r_b, r_c$  umjesto  $x, y, z$  dobivamo

$$r_a + r_b + r_c + \frac{3}{\frac{1}{r_a} + \frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_c}} \geq 4\sqrt[3]{r_a r_b r_c}$$

odnosno,  $4R + r + 3r \geq 4\sqrt[3]{r_a r_b r_c}$ , tj.

$$R + r \geq \sqrt[3]{r_a r_b r_c}. \quad (6)$$

**Primjer 4.** Uvrštavajući u (1)  $h_a, h_b, h_c$  umjesto  $x, y, z$ , gdje su  $h_a, h_b, h_c$  visine trokuta  $ABC$  dobivamo:

$$h_a + h_b + h_c + \frac{3}{\frac{1}{h_a} + \frac{1}{h_b} + \frac{1}{h_c}} \geq 4\sqrt[3]{h_a h_b h_c}. \quad (7)$$

Iz prethodne nejednakosti, uzimajući u obzir poznate jednakosti koje povezuju spomenute elemente trokuta

$$h_a + h_b + h_c = \frac{1}{2R}(s^2 + r^2 + 4Rr), \quad \frac{1}{h_a} + \frac{1}{h_b} + \frac{1}{h_c} = \frac{1}{r}, \quad h_a h_b h_c = \frac{2s^2 r^2}{R}$$

dobivamo sljedeću nejednakost

$$\frac{1}{2R}(s^2 + r^2 + 4Rr) + 3r \geq 4\sqrt[3]{\frac{2s^2r^2}{R}}$$

tj.,

$$s^2 + r^2 + 10Rr \geq 8\sqrt[3]{2s^2r^2R^2}. \quad (8)$$

**Primjer 5.** Ako u (1) umjesto  $x, y, z$  uvrstimo duljine težišnica  $m_a, m_b, m_c$  trokuta  $ABC$  dobivamo nejednakost

$$m_a + m_b + m_c + \frac{3m_a m_b m_c}{m_a m_b + m_b m_c + m_a m_c} \geq 4\sqrt[3]{m_a m_b m_c}. \quad (9)$$

**Primjer 6.** Ako u (1) umjesto  $x, y, z$  stavimo duljine simetrala unutarnjih kutova  $s_\alpha, s_\beta, s_\gamma$  trokuta  $ABC$  dobivamo:

$$s_\alpha + s_\beta + s_\gamma + \frac{3s_\alpha s_\beta s_\gamma}{s_\gamma s_\beta + s_\beta s_\gamma + s_\alpha s_\gamma} \geq 4\sqrt[3]{s_\alpha s_\beta s_\gamma}. \quad (10)$$

**Napomena 1.1.** Jednakost u (4), (5), (6), (7), (8), (9) i (10) vrijedi ako i samo ako je u pitanju jednakostraničan trokut.

Sada ćemo dati jedno poboljšanje nejednakosti (1).

Za sve pozitivne realne brojeve  $x, y, z$  vrijedi sljedeća nejednakost

$$\frac{8(x + y + z)}{9} + \frac{4}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}} \geq 4\sqrt[3]{xyz}. \quad (11)$$

*Dokaz.* Nakon množenja nejednakosti (11) s  $\frac{3}{4}$ , dobivamo ekvivalentnu nejednakost

$$\frac{2(x + y + z)}{3} + \frac{3}{xy + yz + xz} \geq 3\sqrt[3]{xyz}. \quad (12)$$

Koristeći nejednakost između aritmetičke i geometrijske sredine triju pozitivnih realnih brojeva  $A \geq G$  imamo

$$\begin{aligned} & \frac{x+y+z}{3} + \frac{x+y+z}{3} + \frac{3xyz}{xy+yz+xz} \\ & \geq 3\sqrt[3]{\left(\frac{x+y+z}{3}\right)^2 \cdot \frac{3xyz}{xy+yz+xz}} \\ & = 3\sqrt[3]{\frac{(x+y+z)^2}{3} \cdot \frac{xyz}{xy+yz+xz}} \\ & \geq 3\sqrt[3]{xyz}, \end{aligned}$$

gdje je posljednja nejednakost dobivena korištenjem poznate nejednakost

$$(x+y+z)^2 \geq 3(xy+yz+xz) \Leftrightarrow \frac{1}{2}[(x-y)^2 + (y-z)^2 + (x-z)^2] \geq 0.$$

Jednakost vrijedi ako i samo ako je  $x = y = z$ .  $\square$

Pokažimo da je nejednakost (11) bolja (jača) od nejednakosti (1), tj. da je

$$\begin{aligned} x+y+z + \frac{3}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}} & \geq \frac{8}{9}(x+y+z) + \frac{4}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}} \\ \Leftrightarrow \frac{1}{9}(x+y+z) & \geq \frac{1}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}} \\ \Leftrightarrow \frac{x+y+z}{3} & \geq \frac{3}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}}, \end{aligned}$$

a ovo je nejednakost između aritmetičke i harmonijske sredine triju pozitivnih realnih brojeva  $x, y, z (A \geq H)$ .

Na sličan način se dokazuje i sljedeća generalizacija nejednakosti (12), odnosno (11).

Ako su  $x_k > 0, k = 1, 2, \dots, n, n \in \mathbb{N}$ , tada vrijedi nejednakost

$$\frac{n-1}{n} \sum_{k=1}^n x_k + \frac{n}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k}} \geq n \cdot \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n x_k},$$

gdje jednakost vrijedi ako i samo ako je  $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ .

## Literatura

- [1] Arslanagić, Š., *Matematika za nadarene*, Bosanska riječ, Sarajevo, 2005.

JEDNA NEJEDNAKOST IZMEĐU SREDINA, NJENO POBOLJŠANJE I PRIMJENA U  
GEOMETRIJI

- [2] Bencze, M., Arslanagić, Š., *A Mathematical Problem Book*, Grafičar promet d.o.o., Sarajevo, 2008.
- [3] Bottema, O., *Geometric Inequalities*, Wolters-Noordhoff Publishing, Groningen, 1969.