

**Clinica del Dolor de Barcelona ♦ Institut de Columna Vertebral
Pg. Bonanova 51-53 ♦ 08017 Barcelona ♦ Španjolska**

**ISKUSTVA S BUPRENORFINOM (TRANSTEC®)
U LIJEČENJU MIŠĆNOKOŠTANE BOLI U AMBULANTI ZA BOL U BARCELONI**

**EXPERIENCES WITH BUPRENORFINE (TRANSTEC®) IN TREATMENT
OF MUSCULOSKELETAL PAIN IN DISPENSARY FOR PAIN IN BARCELONA**

Tomislav Kranjčec ♦ Carmen Pichot Pla

Upotreba opioidnih lijekova u terapiji nemaligne kronične boli u srednjim dozama pokazuje značajno smanjenje bolne komponente i samim time poboljšanje kvalitete života osoba koje pate od nemaligne kronične boli.

Pravilnim prepisivanjem, češćom i striktnom kontrolom kao i odabirom načina aplikacije pojedinog opioidnog pripravka možemo smanjiti neželjene nuspojave i time približiti primjenu opioidnog pripravka prihvatljivom kako za pacijenta tako i za liječnika.

Realizirane kliničke studije pokazuju opravdanost primjene opioidnih lijekova u terapiji kronične boli iako još nema jedinstvenog konsenzusa za propisivanje op-

oida u terapiji nemaligne kronične boli.

Jedan od pripravaka za čije se prepisivanje često odlučujemo u Klinici za bol Barcelona tretirajući nemalignu kroničnu bol naročito u pacijenata koji uzimaju više lijekova dnevno, je i Transtec, analgetski flaster buprenofrina.

Jednostavan način aplikacije i doziranja, bolja tolerancija i manje nuspojava naročito u pacijenata starije životne dobi, kao i ublažavanje neuropatske boli značajni su faktori za prepisivanje Transteca u liječenju srednje do vrlo jake nemaligne kronične boli.

Ključne riječi: opioidi, kronična nemaligna bol, nuspojave, doziranje, Transtec