

## Rod *Fumana* (Cistaceae) u flori Hrvatske

Igor Boršić (Državni zavod za zaštitu prirode, Trg Mažuranića 5, 10 000 Zagreb; [igor.borsic@dzzp.hr](mailto:igor.borsic@dzzp.hr))

Na temelju terenskih i herbarskih istraživanja Bogdanović i sur. (2012) proveli su taksonomsku reviziju roda *Fumana* (Cistaceae) u Hrvatskoj. Pri tome su utvrdili kako je zapadnomeditersku vrstu *F. ericoides* potrebno izbrisati iz flore Hrvatske, a sve njezine nalaze vezati uz vrstu *F. ericifolia*. Nadalje, za floru Hrvatske potvrđili su vrste *F. laevis* i *F. scoparia*, koje su na našem području bile previđene i slabo poznate. U Hrvatskoj dakle raste sedam vrsta iz roda *Fumana*. To su: *F. arabica* (L.) Spach, *F. ericifolia* Wallr., *F. laevipes* (L.) Spach, *F. laevis* (Cav.) Pau, *F. procumbens* (Dunal) Gren. et Godr., *F. scoparia* Pomel i *F. thymifolia* (L.) Spach ex Webb.



**Slika 1.** Habitus vrste *Fumana laevis* (lijevo) i vrste *F. scoparia* (desno) (foto: S. Bogdanović).

### Determinacijski ključ za vrste roda *Fumana* u Hrvatskoj:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1 Listovi s palistićima.....  | 2                    |
| 1 Listovi bez palistića.....  | 5                    |
| 2 Palistića 2, kratki, pri bazi lista; listovi duguljasto-suličasti, široki 2-5 mm.....   | <i>F. arabica</i>    |
| 2 Palistića 6-8, tvore gusti čuperak pri bazi lista, dugački gotovo do polovice lista; listovi linearni, jajasti, linearno-lancetasti.....  | 3                    |
| 3 Listovi nasuprotni, jajasti, linearno-lancetasti.....   | 4                    |
| 3 Listovi izmjenični, linearno-nitasti, 0,5 mm u promjeru; biljka gola.....   | <i>F. laevipes</i>   |
| 4 Listovi sa žljezdastim indumentumom; bazalni internodiji obično žljezdasto-ljepljivi.....   | <i>F. thymifolia</i> |
| 4 Listovi bez žljezdastog indumentuma; bazalni internodiji nisu žljezdasto-ljepljivi.....   | <i>F. laevis</i>     |
| 5 Cvjetova 2-3(4) u terminalnom cvatu; cvat jasan, gusto žljezdasto-dlakav.....   | <i>F. scoparia</i>   |
| 5 Cvjetovi pojedinačni, raspoređeni između listova fertilnih ogranaka.....  | 6                    |
| 6 Biljka puzajuća; dlake nežljezdaste; stapke ploda kraće ili dugačke koliko i pripadajuća brakteja, savijene od baze; tobolac ne strši, ne otvara se, otpada zajedno s čaškom i stakom; sjemenke ostaju u tobolcu..... | <i>F. procumbens</i> |
| 6 Biljka puzajuće uzdignuta; dlake žljezdaste; stapke ploda mnogo duže od pripadajuće brakteje, strše, sa savijenim vrhom; tobolac strši, otpada s vrha stapke; sjemenke otpadaju prije tobolca.....                    | <i>F. ericifolia</i> |

- **Bogdanović, S., Boršić, I., Rešetnik, I., Šegedin, T. (2012):** Taxonomic revision of the genus *Fumana* (*Cistaceae*) in Croatia. *Plant Biosystems* 146 (Suppl. 1): 69-85.