

## Tri nove biljne vrste na otoku Braču

Ljiljana Borovečki-Voska (Radoboj 27, 49232 Radoboj; [orchidlily.bor@gmail.com](mailto:orchidlily.bor@gmail.com))

Dubravko Šincek (Ruđera Boškovića 14c, 42000 Varaždin; [dubravko.sincek@gmail.com](mailto:dubravko.sincek@gmail.com))

### kratko priopćenje

U sklopu terenskog istraživanja na otoku Braču krajem svibnja 2012. godine na lokalitetu Stup, oko 2 km jugoistočno od Nerežišća na kamenjarskom travnjaku u sukcesiji (FCD: Id opažnja 9848, središte istraživačke plohe: X 5629960, Y 4798050), otkrivene su tri nove biljne vrste za otok Brač: *Phleum paniculatum* Huds., *Lupinus micranthus* Guss. i *Aceras anthropophorum* (L.) W.T.Aiton.

O vrsti *Phleum paniculatum* Huds. (metličasta mačica, metličasti lisičji rep) zasad imamo vrlo malo podataka pa u Crvenoj knjizi vaskularne flore Hrvatske ima status nedovoljno poznate svojte (DD). Najstariji literaturni podatak datira iz 1802. godine (Host, J.: Viaggio botanico nell'Istra, Isole del Quarnero, e nello Dalmazia, incominciato il di 14 d'Agosto 1801 e terminato il di 6 d'Agosto 182. Rkp. II a 90. Arhiv HAZU), a autor biljku na području Privlake (Nin) navodi pod imenom *Phleum asperum* Schreb. Sredinom 19. stoljeća pod imenom *Chilochloa aspera* PB. na području Strahinjšćice spominju je Schlosser i Vukotinović (1854). No, taj nalaz dosad nije potvrđen. Najnoviji literaturni podatak o *Phleum paniculatum* Huds. s otoka Hvara je iz 1993. godine (Trinajstić, 1993). U zbirci ZA Herbarium Croaticum pohranjeni su primjerci J. K. Schlossera bez godine nalaza, a s naznakom nalazišta „in cr. australi“. Uz njih postoje i herbarizirani primjerci A. Paulina iz okolice Rogaške Slatine te biljke koje je u povijesnom okrugu „Krasso-Szoreny Seseminu“ sabrao L. Thiasz. Navedeni krug prvobitno je pripadao Mađarskoj, a danas je većim dijelom na teritoriju Rumunjske, a manjim u Srbiji. U bazi FCD nalaz *Phleum paniculatum* Huds. iz 2012. godine na otoku Braču zasad je jedino aktualno opažanje te vrste u Hrvatskoj pa bi na nju ubuduće trebalo obratiti više pažnje.



Slika 1. 1/ *Phleum paniculatum* Huds. (foto Lj. Borovečki-Voska), 2/ *Lupinus micranthus* Guss. (foto D. Šincek), 3/ *Aceras anthropophorum* (L.) W.T.Aiton (foto Lj. Borovečki-Voska).

Vrsta *Lupinus micranthus* Guss. (rutava vučika, vučika dlakava) mediteranska je biljka vezana uz jadranske travnjake brčka (NKS kod C.3.6.2.), u Hrvatskoj relativno rijetka, no zabilježena duž cijele jadranske obale od rta Kamenjak u Istri, preko otoka Krka, Molata i Dugog otoka pa prema krajnjem jugu, sve do Lokruma. Ne uživa nikakvu zaštitu.

Orhideja *Aceras anthropophorum* (L.) W.T.Aiton (okruglastogomoljasta bezostruška) u Hrvatskoj ima status nedovoljno poznate svojte (DD). S obzirom da u novije vrijeme ima sve više nalaza te vrste, poglavito na našim najjužnijim otocima te u Dubrovačkom primorju, taj će se status prilikom sljedeće revizije nacionalne Crvene liste/knjige sigurno mijenjati.

- **Schlosser, J., Vukotinović, Lj. (1854):** Naturhistorische Wanderungen durch einige Gegenden Nord-Croatiens im Jahr 1853. Österr. Bot. Woch. 4(17): 137-141.
- **Trinajstić, I. (1993):** Vaskularna flora otoka Hvara. Acta Bot. Croat. 52: 113-143.