

Ivan Padjen<sup>1</sup>  
Miroslav Mayer<sup>1</sup>  
Mario Habek<sup>2</sup>  
Snježana Dotlić<sup>3</sup>  
Branimir Anić<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju  
Klinika za unutarnje bolesti Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  
Klinički bolnički centar Zagreb  
Zagreb • Hrvatska

<sup>2</sup>Zavod za neuroimunologiju središnjeg živčanog sustava  
Klinika za neurologiju  
Klinički bolnički centar Zagreb  
Zagreb • Hrvatska

<sup>3</sup>Klinički zavod za patologiju i citologiju  
Klinički bolnički centar Zagreb  
Zagreb • Hrvatska

## Meningitis kao prva manifestacija reumatoidnog artritisa

### Meningitis as the first manifestation of rheumatoid arthritis

Reumatoidni meningitis (RM) rijedak je entitet koji se javlja češće u kasnijem tijeku reumatoidnog artritisa (RA). Opisana je pojava RM-a kao prvog očitovanja RA. U bolesnice s anamnezom dvomjesečnih Jacksonovih ataka na magnetskoj rezonanciji opisana je intenzivna opacifikacija moždanih ovojnica, bez dokaza infekcije i malignoma u likvoru. Biopsijom meningi zabilježena je

nespecifična upala, a u krvi pozitivan RF i CCP. Bolesnica je liječena manitolom, fenitoinom i deksametazonom u padajućoj dozi, uz regresiju neuroloških simptoma. Pet mjeseci nakon početka tegoba razvila je simetrični poliartritis.

**Ključne riječi:** meningitis; reumatoidni artritis; epilepsija; poliartritis