

Vesna Budišin  
Leopold Bienenfeld

Poliklinika Medikol  
Zagreb • Hrvatska

## Važnost komorbiditeta u liječenju uričnog artritisa - prikaz bolesnika

### The importance of comorbidity in treatment of gouty arthritis - a case report

Urični artritis je metabolička bolest koja se često javlja s drugim kroničnim bolestima.

Prikazujemo 67-godišnjeg bolesnika koji se liječi sedam godina zbog uričnog artritisa, a koji također posljednjih trideset godina boluje od dijabetesa ovisnog o inzulinu, hipertenzije, uz razvoj nefropatije i dijabetičke polineuropatije. Unatoč redovitom i opsežnom medikamentoznom liječenju izražena je hiperuricemija, hiperglikemija uz više vrijednosti kreatinina, a bolest progredira uz poseban problem kliničke slike Charcotova stopala lijeve noge. Tijekom dvije godine u četiri navrata dolazi do

egzacerbacije bolesti s nejasnom etiologijom artritisa. Zbog deformacije i nestabilnosti lijevog nožnog zgloba i stopala postoje dvojbe o primjeni konzervativnog ili operativnog liječenja, kao i problem opskrbe bolesnika adekvatnom ortozom.

Radom prikazujemo probleme u dijagnostici i liječenju kroničnog uričnog artritisa uz postojanje komorbiditeta zbog preklapanja kliničkih slika, polipragmazije i nemogućnosti kontrole hiperuricemije.

**Ključne riječi:** urični artritis; komorbiditet; dijagnostika; liječenje