

Petra Burić

Klinički odjel za reumatologiju i imunologiju
Klinika za unutarnje bolesti
Klinički bolnički centar Split
Split • Hrvatska

Pojavnost ulceracija u oboljelih od sistemske skleroze

Incidence of ulcerations in systemic sclerosis patients

Cilj rada bio je istražiti pojavnost ulceracija u bolesnika sa sistemskom sklerozom (SSc) koji se liječe na Kliničkom odjelu za reumatologiju i kliničku imunologiju KBC-a Split. Retrospektivnom analizom pohranjene dokumentacije obrađena su 53 bolesnika oboljela od SSc koji se liječe na Kliničkom odjelu za reumatologiju i kliničku imunologiju KBC-a Split od siječnja 2008. do rujna 2013. godine. Dijagnoza SSc postavljena je u skladu s kriterijima Američkog reumatološkog društva od strane reumatologa. Prosječna dob oboljelih od SSc bila je 59,9 g, žene su činile 91 % ispitivanih od čega je

19 % imalo ulceracije. Naime, ulceracije su bile prisutne isključivo u ženskom spolu. Bolest je najprisutnija u šestom desetljeću života (40 %), dok prema mlađoj odnosno starijoj dobi učestalost pada. Pojavnost ulceracija u oboljelih od SSc najizraženija je u dobi od 40 do 49 godine.

Našim istraživanjem dokazali smo najveću pojavnost ravnica u odnosu na broj oboljelih u dobi od 40. do 49. godine života, iako je sama bolest najprisutnija u dobi od 60. do 69. godine.

Ključne riječi: sistemska skleroza; ulceracije