

MOGUĆNOST PRIMJENE PRIPRAVKA "PROTEIN GOLD" KAO ZAMJENE ZA RIBLJE BRAŠNO U TOVU PILIĆA

POSSIBILITIES OF USING "PROTEIN GOLD" PREPARATION AS A FISH MEAL SUBSTITUTE IN FATTENING CHICKS

Ž. Mikulec, N. Mas, V. Šerman, F. Dumanovski, T. Mašek,
Ž. Horvat, V. Sušić

Izvorni znanstveni članak - Original scientific paper
UDK: 636.5:636.084.415.087.63
Primljeno - Received: 16. svibanj - may 2003.

SAŽETAK

U radu je istražena učinkovitost bjelančevinastog pripravka "Protein Gold" kao biljne alternative za riblje brašno u krmnim smjesama za tov pilića. Istraživanje je provedeno na ukupno 120 muških pilića linije Ross 308 podijeljenih u kontrolnu (K) i pokušnu (P) skupinu. Tijekom 42 dana tova pilići su hranjeni ad libitum i držani u kontroliranim zoohigijenskim uvjetima. Krmne smjese (kukuruz/sojina sačma) korištene u istraživanju bile su po sadržaju bjelančevina i energije podjednake za obje skupine. Osnovnu razliku predstavljalo je riblje brašno koje je korišteno u početnoj krmnoj smjesi za K skupinu u količini od 3,5%, dok je u početnoj krmnoj smjesi za piliće P skupine ono bilo zamijenjeno pripravkom "Protein Gold". U sastavljanju završnih krmnih smjesa za posljednja 3 tjedna tova nije korišteno riblje brašno niti za jednu skupinu pilića. Praćeni proizvodni rezultati (priраст tjelesne mase, konverzija hrane, mortalitet i klaonička iskoristivost) nisu između skupina pokazali statistički značajnu razliku ($P>0,05$), što govori u prilog zaključku da se riblje brašno u početnim krmnim smjesama za tov pilića može uspješno zamijeniti biljnim bjelančevinastim pripravkom "Protein Gold".

Ključne riječi: riblje brašno, pilići, bjelančevine, Protein Gold

UVOD

Krmiva životinjskog podrijetla već se dugi niz godina koriste kao izvori pravih bjelančevina visoke biološke vrijednosti u krmnim smjesama za perad. Međutim, pojava i način širenja bolesti koje su se potkraj 20. stoljeća proširile Europom, a tu se prvenstveno podrazumijeva bovina spongiformna encefalopatija (BSE), u potpunosti je promijenila europsko tržište sirovinama za proizvodnju stočne

hrane, a posebice se to odnosi na bjelančevinasta krmiva. Industrija stočne hrane se nakon zabrane korištenja mesno-koštanog brašna opredjelila se za korištenje još uvijek dozvoljenih životinjskih krmiva poput ribilje brašna.

Doc. dr. Željko Mikulec, doc. dr. Nora Mas, prof. dr. Vlasta Šerman, dr. sc. Franjo Dumanovski, Tomislav Mašek, dr. vet. med., Ž. Horvat, dr. vet. med., prof. dr. Velimir Sušić, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za hranidbu, Zagreb, Hrvatska - Croatia.

Riblje brašno u hranidbi monogastričnih životinja predstavlja izvanredan izvor bjelančevina visoke kakvoće s obzirom na biološku vrijednost i probavljivost. Osim toga, povoljan odnos nezasićenih masnih kiselina, visoki sadržaj pojedinih minerala (iskoristivog fosfora) i vitamina (vit. A, D, B-kompleks), ribljem brašnu daju posebnu nutritivnu važnost.

Međutim, upotreba ribljeg brašna ima i svojih lošijih strana, a tu se osim nepoželjnog organoleptičkog učinka na životinske proizvode, prvenstveno podrazumijeva mogućnost prijenosa uzročnika alimentarnih zaraznih bolesti poput salmonela. Ne treba zaboraviti niti činjenicu da se kao krmivo bogato bjelančevinama lako kvari, te da je potrebno obratiti pažnju kod skladištenja. U protivnom dolazi do razgradnje bjelančevina (dekarboksilacija aminokiselina) i stvaranja toksičnih biogenih amina (histamina, putrescina, kadaverina i sl.). Povećane količine histamina mogu uzrokovati eroziju sluznice mišićnog želuca peradi.

Još opsežnije patološke promjene u smislu ulceracija i destrukcije mukoznog sloja sluznice mišićnog želuca su posljedičnim krvarenjem i krvavim povraćanjem u brojlerskih pilića nastaju najčešće uslijed djelovanja vrlo toksične tvari za koju je također ustanovljeno da nastaje u ribljem brašnu, a nazvana je gizerozin (2-amino-9-(4-imidazolil)-7-azanonanojčna kiselina) (Okazaki i sur., 1983). Gizerozin nastaje u reakciji amino-skupine lizina i slobodnog histidina ili histamina u slučajevima prekomjernog zagrijavanja ribljeg brašna u procesima dehidracije (Masumura i sur., 1981).

No, osim pojave navedenih zdravstvenih problema peradi koji su povezani s upotrebotribljeg brašna u proizvodnji stočne hrane, potrebno je spomenuti i javno mnjenje ljudi kao krajnjih konzumenata životinjskih proizvoda.

U posljednjih petnaestak godina, pažnja potrošača, ali i znanstvene i stručne javnosti Europe i svijeta usredotočila se uglavnom na jedan segment u životinskoj proizvodnji, a to je hranidba. Razlog tome je naravno strah koji se pojavio u potrošača nakon učestalih i brojnih incidenta (BSE, trovanje dioksinom, brojni slučajevi salmonele), a kojima je zajednički put širenja bolesti - stočna hrana. To je dovelo do podizanja svijesti javnosti o tome kako proizvodnja stočne hrane u biti predstavlja veliku i važnu kariku u lancu prehrambene industrije. Zato danas u svijetu najveći utjecaj na proizvodnju hrane za ljude imaju brojne udruge potrošača, koje sve

češće zahtijevaju izbacivanje krmiva životinskog podrijetla iz stočarske proizvodnje.

Iz tih se razloga današnja industrija stočne hrane okreće alternativnim izvorima bjelančevina, koji su u biti već poznati od ranije. To se prvenstveno odnosi na biljne bjelančevine (Reddy i Eshwariah, 1989.; Peter i sur., 2000.; Aziz i sur., 2001, Babidis i sur., 2002), te na one podrijetlom od jednostaničnih organizama (Daghir i Abdul-Baki, 1977.; Onifade i Babatunde, 1996.). Novost na tržištu je pojava bjelančevinastih pripravaka koji u svom sastavu ne sadrže krmiva životinskog podrijetla, a koriste se kao zamjena za riblje brašno. Jedan od takvih pripravaka je i ispitani bjelančevinasti pripravak "Protein Gold".

MATERIJAL I METODE RADA

Istraživanje je provedeno na ukupno 120 sekiranih muških pilića tovnih hibrida linije Ross 308. Jednodnevni pilići podijeljeni su u dvije skupine (kontrolna-K i pokušna-P) po 60 u svakoj. Pilići su tijekom tova od 42 dana držani u kaveznom sustavu u pokušnim prostorijama gdje su kontrolirani zoohigijenski uvjeti odgovarali zahtjevima pilića u tovu.

Obje skupine dobivale su hranu i vodu ad libitum. Kroz prva tri tjedna istraživanja korištena je početna, dok je u druga tri tjedna korištena završna krmna smjesa za tov pilića. Sirovinski sastav krmnih smjesa za kontrolnu i pokušnu skupinu razlikovao se u odabiru krmiva (Tablica 1), dok je iz kemijskog sastava vidljivo (Tablica 2) da su po količini i uravnoteženu odnosu pojedinih hranjivih tvari krmne smjese odgovarale preporukama za tu liniju pilića. Sve krmne smjese korištene u istraživanju proizvedene su u nepeletiranom obliku.

Kako je osnovni cilj ovog istraživanja bio utvrditi mogućnost zamjene ribljeg brašna u krmnim smjesama za perad, osnovna razlika u odabiru krmiva odnosi se na izostavljanje ribljeg brašna u početnoj krmnoj smjesi za pokušnu skupinu pilića (P). Umjesto njega korišten je pripravak "Protein Gold" (proizvođač "Kušić promet" d.o.o., Sv. Ivan Zelina) u količini od 3,00%. Početna krmna smjesa za kontrolnu skupinu (K) bila je uobičajenog sastava s dodanim ribljim brašnom u količini od 3,5%. U završnim krmnim smjesama nije korišteno riblje brašno, ali u krmnoj smjesi za pokušnu skupinu i dalje je bio pripravak "Protein Gold" u istoj količini.

Tablica 1. Sirovinski sastav krmnih smjesa

Table 1. Composition of feed mixtures

Krmiva - Feedstuffs (%)	Početna krmna smjesa - Starter		Završna krmna smjesa - Finisher	
	K	P	K	P
Kukuruz - Corn	55,00	53,14	61,00	63,50
Sojina sačma - Soybean meal	28,50	29,70	22,00	21,50
Suncokretova sačma - Sunflower meal	-	-	2,00	5,00
Lucerna - Alfalfa meal	2,00	2,00	5,00	-
Kukuruzni gluten - Com gluten meal	4,00	4,50	3,00	-
Riblje brašno - Fish meal	3,50	-	-	-
PROTEIN GOLD	-	3,00	-	3,00
Ulje - Oil	2,00	2,60	2,00	2,00
Predmješavina - Premix	5,00	5,00	5,00	5,00

Tablica 2. Hranidbene vrijednosti krmnih smjesa

Table 2. Nutritional values of feed mixtures

K	Početna krmna smjesa - Starter		Završna krmna smjesa - Finisher	
	P	K	P	K
Sir. Bjelančevine - Crude protein (%)	22,12	22,56	18,38	18,72
Metionin - Methionine (%)	0,69	0,72	0,61	0,66
Metionin+Cistin - Met.+ Cystine (%)	0,99	1,03	0,88	0,94
Lizin - Lysine (%)	1,45	1,45	1,09	1,11
Arginin - Arginine (%)	1,56	1,49	1,28	1,19
Treonin - Threonine (%)	0,87	0,88	0,71	0,72
Triptofan - Tryptophane (%)	0,31	0,30	0,23	0,21
Kalcij - Calcium (%)	1,19	1,09	1,02	1,05
Fosfor - Phosphorus (%)	0,67	0,60	0,57	0,61
Natrij - Sodium (%)	0,20	0,20	0,14	0,15
Sirova vlaknina - Crude fiber (%)	3,74	3,79	4,35	3,96
Sirova mast - Crude fat (%)	4,72	5,16	4,82	4,74
ME (kJ/kg)	12,055	12,106	12,516	12,612

"Protein Gold" je pripravak koji se sastoji prvenstveno od nusproizvoda prehrambene industrije, te dodatka biljnih ulja, minerala i aminokiselina. Pripravak ne sadrži bjelančevine životinjskog podrijetla, pa stoga predstavlja biljnu alternativu ribljem

brašnu. Sadržaj hranjivih tvari u pripravku prikazan je na tablici 3.

Od proizvodnih parametara praćen je tjedni i ukupni prirast tjelesne mase, tjedna i ukupna konverzija hrane, mortalitet i klaonička iskoristivost.

Vrijednosti praćenih proizvodnih pokazatelja dobivene su tijednom kontrolom tjelesne mase pilića i svakodnevnim praćenjem utroška hrane.

Tablica 3. Sadržaj hranjivih tvari u pripravku "Protein Gold"

Table 3. Nutrient content in preparation "Protein Gold"

S. bjelančevina, najmanje Crude protein, min. (%)	58,00
S. vlaknina, do - Crude fiber, max. (%)	4,50
Kalcij, najmanje - Calcium, min. (%)	2,00
Fosfor (ukupni), najmanje Phosphorus (total), min. (%)	0,70
Natrij, najmanje - Sodium, min. (%)	0,30
Metionin + Cistin, najmanje Met. + Cystine, min. (%)	2,50
Lizin, najmanje - Lysine, min. (%)	4,00
Treonin, najmanje - Threonine, min. (%)	1,50
ME, najmanje - ME min. (MJ/kg)	13,60

Klaonička iskoristivost kao i udio masa pojedinih dijelova tijela u živoj masi određeni su kod 10 nasumce odabralih pilića iz svake skupine na kraju tova. Trupovi pilića obrađeni su prema standardima tzv. "grill-obrade", što podrazumijeva trup bez

glave, vrata, unutrašnjih organa (voljke, crijeva, jetre, srca, slezene, mišićnog želuca i kloake) i donjih dijelova nogu (Živković, 1986.).

Obje skupine pilića obuhvaćene su uobičajenim režimom vakcinacije, tj. 21. dana su okulonazalno vakcinirani protiv Newcastleske bolesti. Zdravlje pilića svakodnevno je tijekom istraživanja prouđivano klinički.

U statističkoj obradi srednjih vrijednosti težina pilića korištena je analiza varijance, dok su podaci o udjelima pojedinih dijelova tijela analizirani t-testom. Statistički značajnim razlikama smatrane su one kod kojih je $P<0,05$ (Steel i Torrie, 1980.).

REZULTATI I RASPRAVA

Iz proizvodnih rezultata (Tablica 4) vidljivo je da su s obzirom na tjelesnu masu pilići obje skupine prvog dana istraživanja bili vrlo izjednačeni (K-41,38g, P-41,43g). Iako su pilići kontrolne skupine hranjeni krmnom smjesom koja je sadržavala riblje brašno postigli tijekom prva tri tjedna tova nešto bolje rezultate, razlike u vrijednostima prosječne tjelesne mase (K-671,38g, P-640,11g), prirasta (K-630g, P-598,68g) i konverzije (K-1,52 kg/kg, P-1,54 kg/kg) u odnosu na pokusne piliće u čijoj je hrani riblje brašno zamijenjeno bjelančevinastim pripravkom nisu bile statistički značajne ($P>0,05$).

Tablica 4. Proizvodni rezultati

Table 4. Production results

Dani Days	n	Skupina Group	Prosječna tjelesna masa Average body weight (g)	Prosječni prirast Average weight gain (g)	Utrošak hrane Feed consumption (g)	Konverzija hrane Feed conversion rate (kg/kg)
1.	60	K	41,38	-	-	-
	60	P	41,43	-	-	-
1. - 21.	60	K	671,38	630,00	958,26	1,52
	60	P	640,11	598,68	925,08	1,54
22. - 42.	60	K	2207,50	1536,12	3116,57	2,03
	60	P	2203,20	1563,09	3031,10	1,94
Ukupno Total	60	K	2207,50	2166,12	4074,83	1,88
	60	P	2203,20	2161,77	3956,18	1,83

Mogućnost zamjene ribilje brašna biljnim krmivima u početnoj krmnoj smjesi za tov brojlera istraživali su i Reddy i Eshwariah (1989.). Oni su biljnim bjelančevinastim krmivima bez dodatka lizina i metionina uspjeli zamijeniti ribilje brašno do 75% njegova udjela u krmnoj smjesi.

Statistički značajnih razlika nije bilo niti u drugom dijelu tova (22. do 42. dana) kada su pilići hranjeni završnim krmnim smjesama, no u tom razdoblju pilići pokušne skupine postigli su bolje proizvodne rezultate (priраст 1563,09 g, konverzija hrane 1,939 kg/kg) u odnosu na kontrolnu skupinu (priраст 1536,12 g, konverzija hrane 2,028 kg/kg). Razlog tome je izostanak ribilje brašna u sastavu završne krmne smjese za piliće kontrolne skupine, dok je u hrani za pokušne piliće bjelančevinasti pripravak "Protein Gold" ostao i dalje nazočan u količini od 3%. Ribilje brašno izostavljeno je iz kontrolne završne krmne smjese radi njegovog poznatog nepovoljnog organoleptičkog učinka na kakvoću mesa.

Bjelančevinasti pripravak je u odnosu na tu nepoželjnu značajku ribilje brašna iskazao svoju prednost u smislu mogućnosti njegove neograničene primjene u završnim krmnim smjesama.

Dobiveni konačni proizvodni rezultati pilića nakon cijelog razdoblja tova od 42 dana pokazali su da su pilići hranjeni klasičnim krmnim smjesama u kojima je početna sadržava ribilje brašno kao izvor esencijalnih aminokiselina postigli veću konačnu tjelesnu masu (2207,50g) od pilića pokušne skupine (2203,20g) koji su bili hranjeni krmnim smjesama u kojima je biološka vrijednost bjelančevina bila poboljšana bjelančevinastim pri-

pravkom. Međutim, manji ukupni utrošak hrane u pokušnoj skupini doveo je u konačnici do bolje ukupne konverzije hrane u pokušnih pilića (1,83 kg/kg) u odnosu na kontrolne (1,88 kg/kg). Razlike u vrijednostima konačnih tjelesnih masa, prirasta i konverzije nisu pokazale statističku značajnost ($P>0,05$).

Ovakvi se rezultati podudaraju s rezultatima istraživanja koje su proveli Babidis i sur. (2002.) u kojem su ribilje i mesno brašno iz krmnih smjesa za tovne piliće u potpunosti zamijenili kukuruznim glutenom. Nakon 42 dana tova pokazalo se da supstitucija životinjskih krmiva glutenom nije imalo značajnijeg učinka na praćene proizvodne rezultate, tj. na tjelesnu masu, konzumiranje hrane i konverziju hrane.

Slična zapažanja objavili su Aziz i sur. (2001.), nakon istraživanja u kojem je sojinom sačmom zamijenjeno 25, 50, 75 i 100% udjela ribilje brašna u krmnim smjesama za tov pilića. Sojina sačma bila je izbalansirana dodatkom metionina i dikalcijevog fosfata. Rezultati su pokazali da takva supstitucija može u potpunosti zamijeniti ribilje brašno, jer u proizvodnim rezultatima nije bilo statistički značajnijih razlika.

Dio rezultata klaoničke obrade od po 10 nasumce odabralih pilića iz svake skupine prikazani su na tablici 5. Vidljivo je da su pilići pokušne skupine postigli bolje vrijednosti randmana (74,0%) u odnosu na kontrolne (71,9%). Osim toga, kod pokušne skupine pilića zabilježen je i veći udio prsa (23,96%) i bataka s nadbatacima (21,50%) u živoj masi u odnosu na kontrolnu skupinu (22,38% i 21,21%).

Tablica 5. Rezultati klaoničke obrade (n=10)

Table 5. Carcass yield performance (n=10)

	Kontrolna skupina (K) Control group (K)	Pokusna skupina (P) Experimental group (P)
Živa vaga (g) - Live weight (g)	2400	2400
Trup (g) - Carcass weight (g)	1725	1776
Randman(%) - Carcas yield (%)	71,9	74,0
Udio prsa u živoj masi (%) - Breast in liveweight (%)	22,38	23,96
Udio bataka s nadbatacima u živoj masi (%) Thigh and drumstick in live weight (%)	21,21	21,50

Iako razlike između skupina nisu statistički značajne ($P>0,05$), potrebno je napomenuti da su postignuti rezultati randmana i udjela važnijih dijelova trupa u živoj masi pileteta u istraživanju bolji u odnosu na vrijednosti koje su deklarirane za mužjake iste tjelesne mase te linije hibrida (prsa 18,11%, bataci s nadbatacima 22,96% i randman 71,22%) (Anonimous, 2002.). Dobiveni rezultati, s obzirom na klaoničku iskoristivost, podudaraju se s rezultatima dobivenim u istraživanju Večerek i sur. (2002.), gdje su autori također utvrdili veći stupanj klaoničke iskoristivosti u linijama tovnih hibrida Ros 208 i 308 nego što je deklarirano.

U istraživanjima u kojima je riblje brašno u krmnim smjesama za tov pilića zamijenjeno glutenom (Babidis i sur., 2002.) ili aminokiselinski izbalansiranom sojinom sačmom (Aziz i sur., 2001.) razlika u klaoničkoj iskoristivosti također se nije pokazala statistički značajnom.

Na kraju je potrebno spomenuti i podatak o mortalitetu. Kao što je vidljivo iz tablice 4, tijekom cijelog razdoblja tova nije zabilježeno niti jedno uginuće. Ta se rijetka pojava može pripisati kvalitetno odabranim pilićima, kao i strogo kontroliranim zoohigijenskim uvjetima koji su u pokušnom prostoru bili održavani u optimalnim vrijednostima.

Kako razlike praćenih proizvodnih rezultata nisu bile statistički značajne ($P>0,05$) može se zaključiti da ispitivani bjelančevinasti pripravak može uspješno zamijeniti riblje brašno u krmnim smjesama za tov pilića.

Pilići hranjeni krmnim smjesama u kojima je bio umiješan bjelančevinasti pripravak "Protein Gold" postigli su gotovo isti prirast tjelesne mase kao i pilići kontrolne skupine koji su u početnoj krmnoj smjesi imali umiješano riblje brašno, dok je korištenje pripravka u krmnim smjesama pokušnih pilića postiglo bolje rezultate u vrijednostima konverzije hrane. Osim toga, bolji randman i veći udjeli poželjnih i iskoristivih dijelova mesa u pokušnih pilića također govore u prilog korištenja pripravka "Protein Gold" u krmnim smjesama za tov pilića.

LITERATURA

1. Anonimous (2002): Ross Broiler Management Manual. Aviagen Limited, Midlothian, Scotland, UK.
2. Aziz, M. A., Z. H. Khandaker, M. M. Islam (2001): Effect of replacing protein from fish meal with soybean on the performance of broiler chicken. Indian Journal of Animal Nutrition 18(1), 23-28.
3. Babidis, V., P. Florou-Paneri, D. Kufidis, E. Christaki, A. B. Spais, V. Vassilopoulos (2002): The use of corn gluten meal instead of herring and meat meal in broiler diets and its effect on performance, carcass fatty acids composition and other carcass characteristics. Archiv für Geflügelkunde 66 (4), 145-150.
4. Daghir, N. J., T. K. Abdul-Baki (1977): Yeast Protein in Broiler Rations. Poultry Science 56, 1836-1841.
5. Masumura, T., H. Horaguchi, H. Horikawa, M. Sugahara (1981): Gizzard erosion and ulceration in broilers. 3. Toxic substance(s) in fish meal. Japanese Poultry Science 18, 98-104.
6. Okazaki, T., T. Noguchi, K. Igarashi, Y. Sakagami, H. Seto, K. Mori, H. Naito, T. Masumura, M. Sugahara (1983): Gizzerosine, a new toxic substance in fishmeal, caused severe gizzard erosion in chicks. Agricultural Biological Chemistry 47, 2949-2952.
7. Onifade, A. A., G. M. Babarunde (1996): Supplemental value of dried yeast in a high-fibre diet for broiler chicks. Animal Feed Science and Technology 62 (2-4), 91-96.
8. Peter, C. M., Y Han, S. D. Boling-Frankenbach, C. M. Parsons, D. H. Baker (2000): Limiting order of aminoacids and the effects of phytase on protein quality in corn gluten meal fed to young chicks. Journal of Animal Science 78, 2150-2156.
9. Reddy, V.R. Eshwariah (1989): Effect of graded replacement of fish meal with vegetable proteins in broiler starter rations. Indian Journal of Animal Nutrition 6 (2), 166-168.
10. Steel, R. G. D., J. K. Torrie (1980): Principles and Procedures of Statistics. A Biometrical Approach. McGraw-Hill Book Co., New York, USA.
11. Večerek, V., Eva Strakova, P. Suchy, I. Krai, P. Kresala (2002.): Testiranje dvaju hibrida pilića mesnog tipa (Ross 208 i 308) s gledišta njihove iskoristivosti. Krmiva 44 (1), 7-10.
12. Živković, J. (1986.): Higijena i tehnologija mesa. II dio Kakvoča i prerada, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb.

SUMMARY

The aim of this study was to investigate to effectiveness of the protein preparation "Protein Gold" as a plant alternative to fish meal in broiler feed mixtures. The investigation was conducted on 120 male one-day old chicks (Ross 308), divided into a control (K) and trial (P) group. During 42 days of fattening chicks were fed ad libitum, and held in controlled zoohygienic conditions. Feed mixtures (corn/soybean meal) used in investigation were equal in the metabolizable energy and crude protein content. The main difference was fish meal which was used in starter mixture for group K in the proportion of 3.5%, while in starter for group P it was substituted with the protein preparation "Protein Gold". Fish meal was not used in the formulation of finisher mixtures for the last three weeks of fattening of both groups. Values of recorded production results (body weight gain, feed conversion rate, mortality rate and carcass yield) were not statistically significant ($P>0,05$) which supports the conclusion that fish meal can be substituted with plant protein preparation "Protein Gold" in starter mixtures in chick fattening.

Key words: fish meal, chickens, proteins, Protein Gold



TVORNICA STOČNE HRANE
KUŠIĆ PROMET

Psarjevo donje 61, 10380 Sv. Ivan Zelina, tel/fax: 01/2069-202

objavljuje svoj novi proizvod:

Zamjena za riblje brašno

PROTEIN GOLD

Ne sadrži bjelančevine životinjskog podrijetla.

Upotrbljivo za sve vrste i kategorije životinja.

Za sve detaljnije obavijesti obratite se našoj stručnoj službi