




---

**ZNAČENJE FIZIKALNE TERAPIJE U  
LIJEČENJU I REHABILITACIJI  
REUMATSKIH BOLESNIKA**

---

**P 14**

**KOMPARATIVNO ISTRAŽIVANJE  
UČINKOVITOSTI ULTRAZVUKA I  
SONOFOREZE (DIKLOFENA) U  
LIJEČENJU SINDROMA BOLNOG RAMENA**

**T. Vlak<sup>1</sup>,**  
**T. Nakić<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>=*KLINIČKA BOLNICA, SPLIT*

<sup>2</sup>=*PLIVA d.d. ZAGREB*



Cilj ovog istraživanje je bio da se utvrdi postojanje razlike u učinkovitosti dviju metoda fizikalne terapije u liječenju sindroma bolnog ramena.

Ispitivanje je provedeno u dvije skupine bolesnika:

Skupina A: skupinu liječenu terapijskim ultrazvukom su činila 33 bolesnika (16 žena i 17 muškaraca) prosječne životne dobi 49,3 godine. Svakom je od njih terapijski ultrazvuk, intenziteta  $1,0 \text{ W/cm}^2$ , bio apliciran na rame 10 puta, u trajanju od po 5 minuta, mobilnom tehnikom aplikacije.

Skupina B: skupinu liječenu sonoforezom (diklofenak gel kao kontaktno sredstvo) je činio 31 bolesnik (14 žena i 17 muškaraca) prosječne životne dobi 48,1 godina. Tretman sonoforezom je trajao po 5 minuta, ponavljan je 10 puta, mobilnom tehnikom aplikacije i intenzitetom od  $1,0 \text{ W/cm}^2$ .

Razlika učinkovitosti metoda je ocijenjivana na osnovu objektivnih parametara (opseg pokreta) i anamnističkih podataka (bol).

Nakon statističke obrade podataka, pokazalo se da je metoda liječenje sonoforezom značajno bolja glede analgetskog učinka, a kod ispitanika skupine B bila je i značajno bolje povećana retrofleksija u ramenu.