

Fizikalna terapija u bolesnice sa sistemskim eritemskim lupusom i miastenijom gravis - prikaz slučaja

Gordana KOKANOVIĆ, Davorka ROSIĆ, Dinko VELEDAR

Poliklinika "dr.Drago Čop" Zagreb

Sistemski eritemski lupus (SLE) je kronična, organ-nespecifična, autoimuna bolest. Zahvaća brojne organe i organske sistave.

Miastenija gravis (MG) je organ-specifična, autoimuna bolest koju karakterizira motorička slabost. Do bolesti dolazi radi poremećaja u prijenosu podražaja na neuromuskularnoj spojnici uslijed čega i dolazi do mišićne slabosti. Sam naziv i potječe od riječi "myasthenia" koja označava bolest-slabost mišića i riječi "gravis" koja označava težinu-ozbiljnost bolesti.

U radu je prikazana 52-godišnja bolesnica koja je prije više godina razvila simetrične bolne, otekline šaka. Učinjenom obradom, pozitivan RF, CCP i CRP, a u korelaciji s kliničkom slikom dijagnosticiran je reumatoidni artritis. Uz medikamentoznu terapiju primjenjena je i fizikalna terapija, za koju je bolesnica i bila motivirana i koja je dovodila do poboljšanja. Nakon nekoliko godina, a radi pogoršanja općeg stanja učinjena je proširena obrada i dijagnosticiran je SLE. U dalnjem liječenju uz određenu medikamentoznu terapiju, povremeno je provodila i fizikalnu terapiju s dobrim odgovorom. Prije dvije godine, dolazi do pogoršanja u vidu progresivne motoričke slabosti. Primjenjena je i fizikalna terapija, na koju već u samom početku dolazi do progresije motoričke slabosti. Učinjenom obradom dijagnosticirana MG, Pridružena i sekundarna polineuropatija. Uz medikamentoznu terapiju primjenjena je i fizikalna terapija, koju je trebalo pažljivo istitrirati i dozirati.