

Teo Senseoivć

Pregledni rad

Zaštita uljane repice od bolesti

Zaštita uljane repice od suhe truleži korijena i stabljike - *Phoma lingam*

Uljana repica može biti znatno oslabljena kada već u jesen bude napadnuta bolestima od kojih je sada najvažnija *Phoma lingam* uzročnik suhe truleži korijena i stabljike uljane repice.

Osim zaštite od bolesti, rana primjena fungicida stimulira razvoj korijenovog sistema



i akumuliranje dovoljnih količina hranjiva na njeno prezimljivanje. Dozaciju pripravka treba prilagoditi briju listova repice tj. u fazi 6 listova ići s dozom 0,5 l a kod većeg 1,0 l/ha.

Suha trulež korijena i stabljike na uljanoj repici- *Phoma lingam*

Pripravak	Form.	Djelatne tvari %	Proizvodi Distribuira	Konc. i doza kg., l./ha.
Folicur EW 250	EW	25 % tebukonazol	Bayer Pinus Agro d.o.o.	0,5-1,0 u jesen i 1,0 l u proljeće ili jednokratno u proljeće 1,5 l/ha

**Zaštita uljane repice od bijele truleži-
Sclerotinia sclerotiorum i crne pjegavosti- Alternaria spp.**

Pripravak	Form.	Djelatne tvari %	Proizvodi Distribuira	Konc. i doza kg., l./ha.
Folicur EW 250	EW	25,0% tebukonazol	Bayer Pinus Agro	1,5 l/ha
Kidan	SC	25,5 % iprodion	Bayer CropSci.	2,0-3,0 l/ha
Ronilan DF	DF	50,0% vinklozolin	BASF Chromos Agro	1,0 kg/ha u punoj cvatnji
Sumilex	SC	50,0% procimidon	Sumimoto Herbos d.d.	1,0-1,5 l/ha u cvatnji do dva puta tijekom vegetacije

Zaštita uljane repice od sive pljesni- Botrytis cinerea

Pripravak	Form.	Djelatne tvari %	Proizvodi Distributer	Konc. i doza kg., l./ha.
Folicur EW 250	EW	25,0 % tebukonazol	Bayer CropSci. Pinus Agro d.o.o.	0,5-1,0 u jesen i 1,0 1 u proljeće ili jednokratno u proljeće 1,5 l/ha
Kidan	SC	25,5 % iprodion	Aventis CropSci.	2,0-3,0 l/ha
Ronilan DF	DF	50 % vinklozolin	BASF Chromos Agro	1,0 l/ha