




61 godina s Vama!

Godina 40 • broj 1-2 • Zagreb 2017.

UDK 632

ISSN 03509664

9 770350 966004

Sadržaj
Sredstva
za zaštitu
bilja
2017.g.

**glasnik
zaštite
bilja**

GLASNIK ZAŠTITE BILJA

Glavni urednik:

Katarina Lučić, mag. ekonomije

Izvršni urednik:

dr. sc. **Magdalena Zrakić**

Stručni urednik:

prof. dr. sc. **Stjepan Sito**

Stručno uredništvo:

prof. dr. sc. **Dani Benčić**

- Zagreb, R. Hrvatska

doc. dr. sc. **Sanja Fabek Uher**

- Zagreb, R. Hrvatska

dr. sc. **David Gluhić**, znanstveni suradnik

- Poreč, R. Hrvatska

prof. dr. sc. **Ivo Grgić**

- Zagreb, R. Hrvatska

Mirjana Perica, dipl. ing. agr.

- Split, R. Hrvatska

mag. **Tomaž Poje**

- Ljubljana, R. Slovenija

mag. ing. agr. **Valerija Pokos**

- Varaždin, R. Hrvatska

prof. dr. sc. **Milan Pospišil**

- Zagreb, R. Hrvatska

dr. sc. **Željko Prgomet**

- Rovinj, R. Hrvatska

mr. sc. **Nino Rotim**

- Mostar, BiH

prof. dr. **Denis Stajnko**

- Maribor, R. Slovenija

Prof. dr. sc. **Dragan Škorić**, akademik

- Novi Sad, R. Srbija

prof. dr. **Tanas Trajčevski**

- Skopje, R. Makedonija

prof. dr. **Vojislav Trkulja**

- Banja Luka, BiH

izv. prof. dr. sc. **Karolina Vrandečić**

- Osijek, R. Hrvatska

dr. sc. **Zvonimir Zdunić**

- Osijek, R. Hrvatska

Lektor za hrvatski jezik:

Zrinka Sabadoš, prof.

Lektor za engleski jezik:

Srđan Bohucki, prof.

Izdavač: "Zadružna štampa", d.d.

Direktor:

Katarina Lučić, mag. ekonomije

Dizajn i grafička priprema: **Dario Jelusić • Pro-contra** d.o.o., Zagreb

Tisk: **TISKARA ZELINA** d.o.o., Sv. I. Zelina

Radovi objavljeni u časopisu „GLASNIK ZAŠTITE BILJA“ referirani su u svjetskim referalnim časopisima:

CAB Abstracts (CAB INTERNATIONAL), FSTA (Food Science and Technology Abstracts),

ZOOR (Zoological Record), Ulrichsweb.

GLASNIK ZAŠTITE BILJA, punih 61 godina prati razvoj poljoprivrede kod nas i u svijetu, te pod istim naslovom izlazi 40 godinu. Putem razmjene i citiranja GLASNIK ZAŠTITE BILJA dostupan je čitateljima diljem svijeta. GZB izlazi dvomjesečno - 6 brojeva godišnje.

Preplata za 2017. godinu iznosi 452,00 kn, a za inozemstvo 80 eura

Zagreb, Maksimirka 132, tel./fax: 01/ 2316-060, 2316-050, 2911 258

E-mail: zadruzna-stampa@inet.hr ili info@zastitabilja.com.hr

www.zastitabilja.com.hr • www.zadruzna.hr

Sadržaj

Pregled pripremile:

Andrea Lipovski, mag. ing. agr.

Branimira Marić Ivandija, mag. ing. agr.

Pregledni rad

1. HERBICIDI.....	16	
1.1. Ariloksifenoksi- propionati.....	16	
1.1.1. Fluazifop-P	1.1.2. Kizalofop-P-etyl	1.1.3. Propakizafop
1.1.4. Fenoksaproprop		
1.2. Cikloheksandioni.....	19	
1.2.1. Cikloksidim	1.2.2. Kletodim	
1.3. Fenilpirazolini.....	21	
1.3.1. Pinoksalen		
1.4. Sulfonilurea herbicidi.....	22	
1.4.1. Amidosulfuron	1.4.6. Nikosulfuron	1.4.11. Triasulfuron
1.4.2. Flazasulfuron	1.4.7. Oksasulfuron	1.4.12. Tribenuron
1.4.3. Foramsulfuron	1.4.8. Prosulfuron	1.4.13. Trisulfuron
1.4.4. Jodosulfuron	1.4.9. Rimsulfuron	1.4.14. Tritosulfuron
1.4.5. Metasulfuron- metil	1.4.10. Tifensulfuron-metil	
1.5. Imidazolinoni.....	36	
1.5.1. Imazamoks		
1.6. Triazolopirimidini.....	37	
1.6.1. Florasulam		
1.7. Triazini.....	38	
1.7.1. Terbutilazin		
1.8. Triazinoni.....	40	
1.8.1. Metamitron	1.8.2. Metribuzin	
1.9. Piridazinoni.....	44	
1.9.1. Kloridazon	1.9.2. Piridat	
1.10. Fenil- karbamati.....	46	
1.10.1. Desmedifam	1.10.2. Fenmedifam	
1.11. Uree.....	48	
1.11.1. Klortoluron	1.11.2. Linuron	1.11.3. Izoproturon
1.11.4. Metobromuron		
1.12. Nitrili (benzonitrili).....	51	
1.12.1. Bromoksinil		
1.13. Benzotiadiazinoni.....	52	
1.13.1. Bentazon		
1.14. Dipiridili.....	54	
1.14.1. Dikvat		
1.15. Difenileteri.....	58	
1.15.1. Oksifluorfen		
1.16. N- feniftalimidi.....	59	
1.16.1. Flumioksazin		
1.17. Piridinkarboksiamidi.....	60	
1.17.1. Diflufenikan		
1.18. Triketoni.....	60	
1.18.1. Mezotripton	1.18.2. Tembotripton	

1.19. Izoksazoli.....	63	
1.19.1. Izoksaflutol		
1.20. Izoksazolidinoni.....	64	
1.20.1. Kломазон		
1.21. Glicini (aminofosfonati).....	65	
1.21.1. Glifosat		
1.22. Fosfinska kiselina (aminofosfonati).....	75	
1.22.1. Glufosinat		
1.23. Dinitroanilini.....	77	
1.23.1. Pendimetalin		
1.24. Benzamidi.....	81	
1.24.1. Propizamid		
1.25. Kloracetamidi.....	82	
1.25.1. Dimetaklor	1.25.2. S-dimetenenamid	1.25.3. Metazaklor
1.25.4. S-metolaklor	1.25.5. Petoksamid	
1.26. Acetamidi.....	85	
1.26.1. Napropamid		
1.27. Oksiacetamidi.....	86	
1.27.1. Flufenacet		
1.28. Tiokarbamatni.....	87	
1.28.1. Prosulfokarb		
1.29. Benzofuran.....	88	
1.29.1. Etofumesat		
1.30. Derivati fenoksi-karboksilnih kiselina.....	88	
1.30.1. 2,4-D	1.30.2. Diklorprop-P = 2,4 DP-P	1.30.3. MCPA
1.31. Derivati benzojeve kiseline.....	91	
1.31.1. Dikamba		
1.32. Derivati piridin karboksilne kiseline.....	93	
1.32.1. Fluoksipir	1.32.2. Klopiralid	1.32.3. Pikloram
1.33. Triazoli.....	98	
1.33.1. Amitrol		
1.34. Različitog kemijskog podrijetla.....	98	
1.34.1. Aminopiralid	1.34.2. Fluorokloridon	
Herbicidni pripravci i kulture u kojima se rabe.....	100	
 2. FUNGICIDI.....	113	
A) ORGANSKI FUNGICIDI		
 2.1. Acilanini.....	113	
2.1.1. Benalaksil	2.1.2. Metalaksil-M	2.1.2.a) Za tretiranje sjemena
2.2. Hidroksi-2-amino-pirimidini.....	117	
2.2.1. Bupirimat		
2.3. Tiofanati/		
Benzimidazoli.....	117	
2.3.1. Tiofanat metil	2.3.2. Tiabendazol	
2.4. Toluamidi.....	119	
2.4.1. Zoksamid		

2.5. Piridinilmetil- benzamidi.....	120	
2.5.1. Fluopikolid		
2.6. Piridinil etil benzamid	121	
2.6.1. Fluopiram		
2.7. Oksatin karboksamidi.....	121	
2.7.1. Karboksin	2.7.1.a) Za tretiranje sjemena	
2.8. Piridin karboksamidi.....	122	
2.8.1. Boskalid		
2.9. Metoksi-akrilati ("Strobilurini").....	124	
2.9.1. Azoksistrobin		
2.10. Pirazol-karboksamidi.....	129	
2.10.1. Fluksapiroksad	2.10.2. Izopirazam	2.10.3. Benzovindiflupir
2.11. Metoksi-karbamat ("Strobilurini").....	131	
2.11.1. Piraklostrobin		
2.12. Oksimino acetati ("Strobilurini").....	132	
2.12.1. Krezoksim-metil	2.12.2. Trifloksistrobin	
2.13. Oksimino-acetamidi ("Strobilurini").....	135	
2.13.1. Dimoksistrobin		
2.14. Oksazolidindioni.....	135	
2.14.1. Famoksado		
2.15. Imidazolinoni.....	136	
2.15.1. Fenamidon		
2.16. Cianoimidazoli.....	136	
2.16.1. Ciazofamid		
2.17. Sulfamoil-triazoli.....	137	
2.17.1. Amisulbrom		
2.18. Dinitrofenil krotonati.....	137	
2.18.1. Meptil dinokap		
2.19. 2,6-dinitroanilini.....	138	
2.19.1. Fluazinam		
2.20. Anilino-pirimidini.....	139	
2.20.1. Ciprodinil	2.20.2. Pirimetanil	
2.21. Kinolini.....	141	
2.21.1. Kinokifen		
2.22. Fenilpiroli.....	142	
2.22.1. Fludioksonil	2.22.1.a) Za tretiranje sjemena	
2.23. Dikarboksimidi.....	144	
2.23.1. Iprodion		
2.24. Karbamati.....	144	
2.24.1. Propamokarb-hidroklorid		
2.25. Amidi karboksiline kiseline.....	147	
2.25.1. Dimetomorf	2.25.2. Iprovalikarb	2.25.3. Mandipropamid
2.26. Imidazoli.....	150	
Inhibitori biosinteze ergosterola (grupa I)		
2.26.1. Imazalil	2.26.2. Prokloraz	

2.27. Triazoli.....	151	
Inhibitori biosinteze ergosterola (grupa I)		
2.27.1. Ciprokonazol	2.27.6. Metkonazol	2.27.11. Tebukonazol
2.27.2. Difenkonazol	2.27.7. Miklobutaniil	2.27.11. a) Za tretiranje sjemena
2.27.2. a) Za tretiranje sjemena	2.27.8. Penkonazol	2.27.12. Tetrakonazol
2.27.3. Epoksikonazol	2.27.9. Propikonazol	2.27.13. Triadimenol
2.27.4. Fenbukonazol	2.27.10. Protokonazol	
2.27.5. Flutriafol	2.27.10. a) Za tretiranje sjemena	
2.28. Morfolini.....	166	
Inhibitori biosinteze ergosterola (grupa II)		
2.28.1. Fenpropimorf		
2.29. Piperidini.....	167	
Inhibitori biosinteze ergosterola (grupa II)		
2.29.1. Fenpropidin		
2.30. Spiroketalamini.....	167	
Inhibitori biosinteze ergosterola (grupa II)		
2.30.1. Spiroksamin		
2.31. Hidroksianilidi.....	168	
Inhibitori biosinteze ergosterola (grupa III)		
2.31.1. Fenheksamid		
2.32. Ditiokarbamati.....	169	
2.32.1. Ciram	2.32.3. Metiram	2.32.5. Tiram
2.32.2. Mankozeb	2.32.4. Propineb	2.32.5. a) Za tretiranje sjemena
2.33. Ftalimidi.....	176	
2.33.1. Folpet	2.33.2. Kaptan	2.33.2. a) Za tretiranje sjemena
2.34. Kloronitrili.....	178	
2.34.1. Klortalonil		
2.35. Guanidini.....	179	
2.35.1. Dodin		
2.36. Kinoni.....	180	
2.36.1. Ditianon		
2.37. Cianoacetamid-oksimi.....	180	
2.37.1. Cimoksanil		
2.38. Etil fosfonati.....	181	
2.38.1. Fosetyl-aluminij		
2.39. Kinazolinoni.....	183	
2.39.1. Prokinazid		
2.40. Benzofenoni.....	184	
2.40.1. Metrafenon		
2.41. Benzoilpiridini.....	184	
2.41.1. Piriofenon		
B) ANORGANSKI FUNGICIDI		
2.42. Fungicidi na osnovi bakra (Cu).....	185	
2.42.1. Bakarni (II) sulfat	2.42.2. Bakarni oksiklorid	2.42.3. Bakarni hidroksid
2.42.4. Bakar hidroksid - kalcij	2.42.5. Kombinacije bakra i	2.42.6. Kombinacije bakra i
sulfat kompleks	organских fungicida	mineralnih ulja
2.43. Fungicidi na osnovi sumpora (S).....	191	

3. INSEKTICIDI.....		196
3.1. Karbamati.....		196
3.1.1. Metiokarb	3.1.1.b) Za suzbijanje puževa	3.1.2. Pirimikarb
3.1.1. a) Za tretiranje tla i/ili sjemena	3.1.1.c) Repelent za ptice	
3.2. Organofosfati.....		199
3.2.1. Dimetaoat	3.2.2. a) Za tretiranje tla	3.2.3. Pirimifos-metil
3.2.2. Klorpirifos	3.2.4. Fosmet	3.2.3. a) Za dezinfekciju žitarica
3.3. Antranilni diamidi.....		205
3.3.1 Klorantraniliprol		
3.4. Sintetski piretroidi.....		206
3.4.1. Alfa-cipermetrin	3.4.3. a) Za dezinfekciju	3.4.6. Tau-fluvalinat
3.4.2. Cipermetrin	3.4.4. Esfenvalerat	3.4.7. Teflutrin
3.4.3. Deltametrin	3.4.5. Gama i lambda cihalotrin	3.4.7. a) Za tretiranje tla i/ili sjemena
3.5. Neonikotinoidi.....		222
3.5.1. Acetamiprid	3.5.3. Klotianidin	3.5.5. Tiametoksam
3.5.2. Imidakloprid	3.5.4. Tiakloprid	3.5.5. a) Za tretiranje sjemena
3.5.2.a) Za tretiranje sjemena, "gomolja i lučica		
3.6. Avermektini.....		231
3.6.1 Abamektin	3.6.2. Emamektin benzoat	
3.7. Spinosini.....		234
3.7.1. Spinosad		
3.8. Pimetrozin (Piridini).....		236
3.8.1. Pimetrozin		
3.9. Derivati benzoiluree - (Regulatori razvoja insekata)		238
3.9.1. Diflubenzuron	3.9.2. Lufenuron	3.9.3. Teflubenzuron
3.10. Diacilhidrazini.....		239
3.10.1. Metoksifenoziđ	3.10.2. Tebufenoziđ	
3.11. Keto-enoli.....		241
3.11.1. Spirodiklofen	3.11.2. Spirotetramat	
3.12. Insekticidi različitog kemijskog podrijetla.....		242
3.12.1. Fenoksikarb	3.12.3. Fostiazat	3.12.5. Metaflumizон
3.12.2. Flonikamid	3.12.4. Indoksakarb	
3.13. Pripravci za zimsko prskanje.....		245
3.13.1. Mineralna ulja	3.13.2. Kombinirani pripravci bakra i mineralnog ulja	
3.14. Pripravci za fumigaciju.....		247
3.14.1. Aluminijev fosfid	3.14.2. Magnezijev fosfid	
3.15. Mikrobiološki insekticidi.....		248
3.15.1. Bacillus thuringiensis	3.15.2. Cydia pomonella granulovirus	
3.16. Dijatomejska zemlja.....		250
4. AKARICIDI.....		250
4.1. Abamektin	4.4. Klofentezin	4.7. Piriproksifen
4.2. Etoksađol	4.5. Spirodiklofen	
4.3. Fenazakin	4.6. Tebufenpirad	
5. NEMATOCIDI.....		254
5.1. Dazomet	5.2. Fostiazat	5.3. Oksamil
5.4. Fluopiram		

6. LIMACIDI.....	256	
6.1. Metaldehid	6.2. Metiokarb	6.3. Željezo (III) pirofosfat
7. KORVIFUGI	257	
7.1. Metiokarb		
8. RODENTICIDI.....	257	
8.1. Bromadiolon		
9. REGULATORI RASTA I FIZIOTROPI.....	259	
9.1. Etefon	9.3. Klorprofam	9.5. Proheksadion
9.2. Klormekvat	9.4. Maleinski hidrazid	9.6. Trineksapak
10. OSTALA SREDSTVA.....	262	
10.1. Benzojeva kiselina	10.2. Vapno	
11. OKVAŠIVAČI.....	262	
12. ATRAKTANTI	265	
Indeks pripravaka	268	
Indeks djelatnih tvari	278	
Tablica razrjeđivanja	282	

Sredstva za zaštitu bilja 2017.

Sažetak

Sredstva za zaštitu bilja 2017. sadrži pregled sredstava za zaštitu bilja dozvoljenih za uporabu u Republici Hrvatskoj u 2017. godini. Sva sredstva koja se stavlaju u promet u Republici Hrvatskoj moraju biti registrirana pri nadležnoj upravi Ministarstva poljoprivrede. Informacije o sredstvima za zaštitu bilja mogu se pronaći i na web stranicama Ministarstva poljoprivrede (FIS Web Portal).

Sredstva su podijeljena prema namjeni u najznačajnije skupine: herbicidi, fungicidi i zoocidi. Svaka skupina sadrži pregled sredstava prema aktivnim tvarima. O svakom sredstvu navedeni su sljedeći podaci: trgovачki naziv, formulacija, količina djelatne tvari, proizvođač i distributer, te koncentracija ili doza za suzbijanje uz popis štetočinja i kultura za koje sredstvo ima dozvolu za primjenu. Također, navedene su i karence za kulture u kojima je primjena dozvoljena.

Zbog brojnih izmjena te dopuna rješenja i registracija, sredstva za zaštitu bilja se smiju koristiti isključivo prema uputama za uporabu koji se nalaze na ambalaži proizvoda. Svaka primjena sredstava za zaštitu bilja na bilo koji drugi način od navedenog u uputi za korištenje i na etiketi obavlja se isključivo na vlastitu odgovornost.

Ključne riječi: sredstva za zaštitu bilja, herbicidi, fungicidi, zoocidi.

Review

Plant Protection Products 2017.

Summary

The document Plant Protection Products 2017 gives an overview of plant protection products permitted for use in the Republic of Croatia in 2017. All plant protection products that are put in distribution in the Republic of Croatia must be registered with the competent authority of the Ministry of Agriculture. Information on registered plant protection products can be found on the website of the Ministry of Agriculture (the FIS Web Portal).

Plant protection products are, according to their application, divided into three major groups: herbicides, fungicides and zoocides. Each group offers an overview of products according to active substances. Each plant protection product, along with a list of pests and crops for which a permit for application was obtained, includes the following information: trade name, formulation, amount of active ingredients, manufacturer and distributor, and suppression concentration or dosage. Also listed are due pre-harvest intervals of crops for which the application is allowed.

Due to the numerous amendments to relevant decisions and registration procedures, plant protection products may only be used according to the instructions for use indicated on the packaging. Any application of plant protection products in any manner other than specified in the instructions for use and on the label shall be considered performed exclusively at one's own risk.

Key words: plant protection products, herbicides, fungicides, zoocides.

1. HERBICIDI

1.1. Ariloksifenoksi-propionati

(engl. Aryloxyphenoxy-propionate ‘FOPs’)

Herbicidi iz skupine ariloksifenoksi-propionata (derivata fenoksipropionata) inhibiraju enzim acetilkoenzim A karboksilazu (ACCase) koji je odgovoran za sintezu malonil koenzima A i masnih kiselina zbog čega dolazi do spriječavanja tvorbe lipida koji su biljci neophodni za izgradnju staničnih membrana. Na osnovu navedenog mehanizma djelovanja ovi herbicidi su razvrstani u **HRAC grupu A. Predstavljaju važnu skupinu visoko selektivnih herbicida za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u širokolistnim kulturama** (“graminicidi”). Pretpostavlja se da je tolerantnost širokolistnih biljaka na ovu grupu herbicida rezultat neznatnih razlika u samoj strukturi navedenog enzima.

Herbicidi iz ove skupine se primjenjuju nakon nicanja biljke i korova. Rabe se u relativno niskim količinama po jedinici površine. Visoko su selektivni i vrlo male toksičnosti. Svojom pojavom znatno su unaprijedili kemijsku borbu protiv travnih korova u dikotiledonim kulturama.

1.1.1. Fluazifop – P

Djelatna tvar izaziva inhibiciju enzima ACCase, odgovornog za sinteze lipida neophodnih u izgradnji staničnih membrana, i to isključivo kod trava. Stanične membrane određuju što može ući ili izići iz stanice.

Ne suzbija: Festuca ovina, Festuca rubra i Poa annua.

Ne primjenjuje se u kombinaciji s drugim herbicidima.

Potpuno selektivan na širokolistne usjeve. I u dvostruko višim dozama od preporučenih, nanesen na listove uzgojenih biljaka ne izaziva oštećenja. Apsorbira se preko lista, prodire ksilemom i floemom u točke rasta. Prvi simptomi su vidljivi nakon 7-14 dana od prskanja, a do konačnog sušenja dolazi nakon 3-4 tjedna. Sušenje se postupno prenosi s najmlađih k starijim dijelovima biljke. Suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne korove u dikotiledonim kulturama. Jednogodišnje trave trebaju u vrijeme tretiranja biti s 2-4 lista, a višegodišnje od 15-20 cm.

LD₅₀ 2925. S.O. = III.

1.1.2. Kizalofop-P-etil (kizalofop-P-tefuril)

Djelatna tvar izaziva inhibiciju enzima ACCase odgovornog za sinteze lipida neophodnih u izgradnji staničnih membrana i to isključivo kod trava. Stanične membrane određuju što može ući ili izići iz stanice.

Primjenjuje se kao graminicid u usjevima/nasadima: šećerne i stočne repe, soje (samo prije cvatnje), suncokreta, uljane repice, krumpira, vinove loze i jabuka; u fazi 3-6 listova travnih korova. Za bolje djelovanje može se dodati Radovit N ili Bijelo ulje 1-2%. Osjetljive kulture na zanošenje: žitarice i kukuruz. Ne koristiti u mladom krumpiru i povrću.

LD₅₀ 1480. S.O. = III. K - 77 dana krumpir, šećerna repa, soja, suncokret; 49 dana vinova loza

1.1.3. Propakizafop

Djelatna tvar izaziva inhibiciju enzima ACCase odgovornog za sinteze lipida neophodnih u izgradnji staničnih membrana i to isključivo kod trava. Stanične membrane određuju što može ući ili izići iz stanice.

Biljka ga apsorbira putem lista. Brzo se translocira u sve dijelove biljke. Za manje od 1 sata u cijelosti je u biljci i nema mogućnosti ispiranja padalinama i smanjenja herbicidnog djelovanja.

LD₅₀ 5000. S.O. = III.

1.1.4. Fenoksaprop

Djelatna tvar izaziva inhibiciju enzima ACCase odgovornog za sinteze lipida neophodnih u izgradnji staničnih membrana i to isključivo kod trava. Stanične membrane određuju što može ući ili izići iz stanice. Pripravak je namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih trava u usjevima: pšenice i ječma: Phalaris paradoxa, Poa trivialis, Avena fatua, Apera spica-venti.. Ne suzbija: Agropyron repens, Bromus spp., Cynodon dactylon, Festuca spp., Lolium multiflorum, Lolium perenne, Poa annua i Poa pratensis. Biljka usvaja preparat već 1-3 sata nakon prskanja, tako da ga kiša ne može isprati.

LD₅₀ 2260. S.O. = III. K - OVP.

1.2. Cikloheksandioni

(engl. Cyclohexanedione ‘DIMs’)

Cikloheksandioni imaju isti mehanizam djelovanja kao i ariloksifenoksi-propionati, odnosno i oni inhibiraju enzim acetilkoenzim A karboksilazu (ACCase) koji je odgovoran za sintezu malonil koenzima A i masnih kiselina zbog čega dolazi do inhibicije biokemijskih procesa sinteze lipida kod trava, na temelju čega su i oni razvrstani u **HRAC grupu A**. Biljka ih apsorbira preko lista i translocira do meristema.

Cikloheksandioni su relativno mala, ali vrlo značajna skupina translokacijski visokoselektivnih herbicida koji su kao i derivati fenoksipropionata namijenjeni suzbijanju travnih vrsta korova u širokolisnim kulturama (“graminicidi”). U tlu se relativno brzo razgrade. Skloni su ispiranju. Vrlo su niske toksičnosti. Selekcijom kulture stanica u SAD-u i nekim europskim zemljama su uzgojeni hibridi kukuruza rezistentni prema predstavnicima ove skupine herbicida. Svojom pojavom znatno su unaprijedili borbu protiv travnih korova u dikotiledonim kulturama.

1.2.1. Cikloksidim

Djelatna tvar izaziva inhibiciju enzima ACCase odgovornog za sinteze lipida neophodnih u izgradnji staničnih membrana i to isključivo kod trava. Stanične membrane određuju što može ući ili izići iz stanice. Ne suzbija Poa annua. U krumpiru se ne koristi u miksu s drugim pripravcima. Pripravak za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u svim širokolisnim usjevima. Djelatna tvar translocira kroz cijelu biljku i zaustavlja rast meristemskog tkiva. Za tri tjedna korovne biljke potpuno propadaju. Povoljni uvjeti za rast biljke tj. toplo i vlažno vrijeme ubrzavaju herbicidni učinak. Jednogodišnje trave trebaju imati od 2 do 5 listova

(do konca busanja), a višegodišnje trave trebaju u vrijeme prskanja biti 10-15 cm visine s izuzetkom sirka iz rizoma koji treba biti od 20-40 cm. Već dva sata nakon primjene u cijelosti je u biljci i nema opasnosti od ispiranja i smanjenog djelovanja.

LD₅₀ 3940. S.O. = III.

1.2.2. Kletodim

Djelatna tvar izaziva inhibiciju enzima ACCase odgovornog za sinteze lipida neophodnih u izgradnji staničnih membrana i to isključivo kod trava. Stanične membrane određuju što može ući ili izići iz stanice.

Vrlo se brzo apsorbira putem lista i translocira cijelom biljkom te ubrzano nakuplja u meristemskim tkivima. Već jedan sat nakon primjene sav je u biljci i nema opasnosti od ispiranja kišom. Zbog svoje niske toksičnosti i brze razgradnje u tlu minimalni su rizici od mogućnosti trovanja ljudi koji ga primjenjuju, te riba kao i podzemnih voda. Pripada inhibitorima rasta meristema i biosinteze lipida. U osjetljivim biljkama kletodim se veže na enzim acetil koenzim A karboksilazu odgovoran za sintezu lipida. Prvi simptomi koji se na osjetljivim biljkama mogu uočiti jesu: zaustavljanje rasta (sedam dana nakon primjene), tkiva u blizini meristema postaju smeđa i trunu, novo formirani listovi postaju žuti (klorotični) i postupno odumiru. Kako stariji listovi odumiru, pokazuju promjenu u boji od narančaste, crvene do ljubičaste. Kletodim učinkovito suzbija podzemne i nadzemne dijelove trava čime spriječava njihov novi rast. Kod nas se primjenjuje u usjevima šećerne repe, soje, suncokreta, uljane repice, luka, češnjaka i krumpira. U usjevu šećerne repe se preporučuje split aplikacija. Najučinkovitiji je u vrijeme aktivnog rasta korova kada su u mlađem razvojnom stadiju (jednog. trave 3-5 listova, višegodišnje trave - 25 cm, pirika - 25 cm i trska oko 50 cm ili 4-5 listova).

S.O. = III. K - 35 dana rajčica, 42 dana grah (ne za vrlo rane sorte), 49 dana šećerna repa i krumpir, OVP ostalo.

1.3. Fenilpirazolini

(engl. Phenylpyrazoline‘DEN’)

Fenilpirazolini imaju isti mehanizam djelovanja kao i ariloksifenoksi - propionati i cikloheksandioni, odnosno i oni inhibiraju enzim acetilkoenzim A karboksilazu (ACCase) koji je odgovoran za sintezu malonil koenzima A i masnih kiselina zbog čega dolazi do inhibicije biokemijskih procesa sinteze lipida kod trava, na temelju čega su i oni razvrstani u **HRAC grupu A**.

Njihov, za sada, jedini predstavnik pinoksaden je namijenjen za suzbijanje travnih vrsta korova u usjevu strnih žita. Prema svojoj strukturi ovaj herbicid nije sličan postojećim “fop” ili “dim” herbicidima za suzbijanje travnih korova. Nema ograničenja u plodosmjeni.

1.3.1. Pinoksaden

Djelatna tvar izaziva inhibiciju enzima ACCase, odgovornog za sinteze lipida neophodnih u izgradnji staničnih membrana i to isključivo kod trava. Stanične membrane određuju što može ući ili izići iz stanice. Rabi se uz pomoćno sredstvo specijalno razvijeno za ovaj pripravak. Kompatibilan i široke mogućnosti glede izbora vremena primjene. Nema ograničenja u plodosmjeni.

LD₅₀ - 5000, S.O.=III, K – OVP

1.4. Sulfonilurea herbicidi

(engl. Sulfonylurea)

Herbicidi iz grupe sulfonilurea kod osjetljivih biljaka inhibiraju rad enzima acetolaktat sintetaze (ALS) zbog čega u biljci izostaje biosinteza esencijalnih aminokiselina: valina, leucina i izoleucina, na temelju čega su razvrstani u **HRAC grupu B**. Izostanak biosinteze navedenih aminokiselina rezultira brzim prestankom rasta, a potom i ugibanjem tretiranih biljaka. Ove herbicide biljke prvenstveno usvajaju preko lista, zbog čega ih isključivo primjenjujemo nakon nicanja korova. Sulfoniluree karakterizira i visoka biološka učinkovitost na veliki broj važnih jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, kratko vrijeme poluraspada (degradacija se odvija brže u tlima s nižom pH vrijednosti), mala toksičnost za životinje i ljude (čovjek i životinje ne posjeduju ALS enzim i ne mogu sintetizirati ove aminokiseline). Za sve predstavnike sulfonilurea grupe karakteristično je da su vrlo djelotvorni u niskim dozama. Skloni su ispiranju, no kako se rabe u niskim dozama, ekološki su prihvatljiviji od klasičnih herbicida.

Herbicidi iz grupe sulfonilurea su relativno nova skupina herbicida koja je sve više zastupljena u gotovo svim značajnijim kulturama. Međutim, sve veći problem ove perspektivne grupe herbicida je sve masovnija pojava rezistentnosti na pojedine pripravke. Također, treba izbjegavati aplikaciju herbicida iz grupe sulfonilurea u slučajevima kada se na tlu nalaze površinske vode ili ako je tlo zasićeno vodom, a zbog moguće fitotoksičnosti potrebno je posebno voditi brigu o ispiranju prskalice i opreme. Pri primjeni se treba točno pridržavati uputa proizvođača te poštivati ograničenja i plodored jer su pojedini (stariji spojevi) vrlo perzistentni pa ograničavaju plodored.

1.4.1. Amidosulfuron

Pripravci na bazi amidosulfurona su selektivni sistemični herbicidi namijenjeni za suzbijanje jednogodišnjih i manjeg broja višegodišnjih širokolisnih korova u usjevima ozime i jare pšenice i ječma (ljepljiva broćika - Galium aparine, ptičji dvornik - Polygonum aviculare, slakasti dvornik - Polygonum convolvulus, veliki dvornik - Polygonum persicaria, kamilica - Matricaria chamomilla, ambrozija - Ambrosia elatior i dr.). Korovna biljka ga apsorbira putem lista, a neznatnim dijelom i preko tla. Učinak na korove vidljiv je nakon 3 do 5 tjedana od primjene. Primjena: od tri lista do pojave drugog koljenca pšenice i ječma. Za suzbijanje, *Galium spp.* može se primijeniti i u busanju. Rabi se i za suzbijanje korova na travnjacima, pašnjacima i golf igralištima. Nakon prskanja, dovoljan je jedan sat bez padalina da se u potpunosti usvoji. Nakon

usvajanja zaustavlja se rast korova, a nakon 7 - 14 dana pojavljuju se crvenkasto-plavo-ljubičaste mrlje kao prvi znak letalnih promjena u biljci. Vrlo dobro ga podnose sve vrste žitarica: ozima i jara pšenica, ozimi i jari ječam, ozima raž i pšenoraž. Može se rabiti u usjevu zobi i pri niskim temperaturama (od + 5° C).

LD₅₀ 5000. T - 0,05. S.O. = III. K - OVP, na travnjacima i pašnjacima: 21 dan.

1.4.2. Flazasulfuron

Pripravak na bazi flazasulfurona je kontaktno-sistemično-rezidualni herbicid namijenjen za suzbijanje većine jednogodišnjih i nekih višegodišnjih korova u vinogradima i oko željezničkih pruga. Dobro se nadopunjava s pripravcima na osnovi glifosata i sulfosata. Primjenjuje se u nasadima vinove loze starijim od 4 god. Treba spriječiti dodir s lisnom masom i izbojcima loze. Primjenjuje se u pre-em. (sam) i post-em. (sam ili u kombinaciji s gore navedenim herbicidima). Najbolje učinke postiže u vrijeme intezivnog rasta korova.

LD₅₀ 4700. O - III. T - 0,01 grožđe. K - 63 dana vinova loza.

1.4.3. Foramsulfuron

Pripravci na bazi foramsulfurona su noviji sistemični selektivni post-em. Herbicidi iz grupe sulfonilurea namijenjeni za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih (koštan, muharike, svračica) i širokolisnih korova (europski mračnjak, šćir, pelinolisna ambrozija, lobode), te za smanjenje zakoravljenosti s višegodišnjim uskolisnim korovima (sirak, pirika) u usjevu merkantilnog kukuruza. Korovna biljka usvaja foramsulfuron preko lista, a neznatno i preko tla. Izoksadifen etil koji se kao herbicidni zaštitnik nalazi u pripravku ubrzava razgradnju foramsulfurona u kukuruzu, a usporava u korovnim biljkama. Ravnomjerno se raspoređuje unutar biljke i izaziva inhibiciju biosinteze lančanih aminokiselina. Kukuruz treba biti u fazi od 2-6 lista, a korovi od 1 do najviše 5 kod uskolisnih i 2 do 4 lista kada se radi o širokolisnim. Može se kombinirati s djelatnim tvarima kao što su: dikamba, bromoksinil, piridat, 2,4-D, terbutilazin i dimetenamid u ranom postu. Dva sata nakon prskanja u cijelosti je usvojen i padaline nakon tog vremena nemaju utjecaja na njegovu učinkovitost.

LD₅₀> 5000. S.O. = III. T - 0,05.

1.4.4. Jodosulfuron

Pripravci na bazi jodosulfurona su sistemični selektivni herbicidi namijenjeni za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u usjevu pšenice i ječma. Kao i druge djelatne tvari iz ove skupine, u korovnim biljkama izaziva inhibiciju sinteze aminokiselina. Unutar biljke širi se floemom i ksilemom, a herbicidni učinak vidljiv je nakon 4-6 tjedana od tretiranja. Dva sata nakon prskanja pripravci su u cijelosti u biljci i naknadne oborine nemaju utjecaja na učinkovitost.

LD₅₀ 2678. S.O. = III. K - OVP.

Kontaktno-sistemični herbicid za suzbijanje: uskolisnih korova (*Apera spica venti*, *Lolium spp.* *Phalaris spp.*, *Poa annua*, *Poa trivialis*) i širokolisnih korova (*Amaranthus retroflexus*, *Anagallis arvensis*, *Anthemis spp.*, *Atriplex spp.*, *Bifora radians*, *Capsella bursa pastoris*,

Centaurea cyanus, Chenopodium album, Cirsium arvense, Galeopsis spp., Galinsoga ciliata, Galium aparine, Lamium spp., Matricaria spp., Myosotis arvensis, Papaver rhoeas, Polygonum spp., Ranunculus arvensis, Raphanus raphanistrum, Rumex spp., Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Sonchus spp., Stellaria media, Trifolium spp., Vicia spp., Viola spp., kao i samonikle uljane repice).

1.4.5. Metsulfuron-metil

Pripravci na bazi metsufuron-metila su sistemični selektivni herbicidi namijenjeni za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolistnih korova u usjevima ozime pšenice i jarog ječma. Biljka ovu djelatnu tvar usvaja korijenom i listom, poslije čega se ona sistemično translocira bazipetalno i akropetalno. Za poboljšanje djelovanja na Gallium spp. preporučuje se dodatak najniže doze fluroksipir estera.

LD₅₀ 5000. T - 0,05. O - ISO, K - OVP.

1.4.6. Nikosulfuron

Pripravci na bazi nikosulfurona su sistemični selektivni folijarni herbicidi namijenjeni za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih (sirak iz rizoma, pirika i drugi), kao i nekih širokolistnih korova u usjevu kukuruza. Biljka ovu djelatnu tvar usvaja preko lista, zbog čega kukuruz u vrijeme tretiranja treba imati od 3-6 listova. Ozime žitarice sijati najmanje 4, a jare 8 mjeseci nakon primjene. 10 mjeseci nakon primjene siju se soja i grah, a sve ostale kulture nakon 12 mjeseci.

LD₅₀ 6000. S.O. - III. K - 63 dana.

1.4.7. Oksasulfuron

Pripravci na bazi oksasulfurona su sistemični selektivni translokacijski herbicidi namijenjeni za suzbijanje brojnih jednogodišnjih širokolistnih i nekih uskolistnih korova u usjevu soje. Biljka ovu djelatnu tvar usvaja putem lista, a u vlažnom tlu i putem korijena. Kod neujednačenog rasta korova može se primijeniti i u dvije polovične doze (2 x 50 g/ha) u razmaku od jednog do dva tjedna. Prskati treba kada je soja od prva tri lista do četiri trolista, a korovi od 2-6 lista. Do ugibanja korova dolazi približno tri tjedna nakon primjene.

LD₅₀ > 5000. S.O. - III. K - OVP.

1.4.8. Prosulfuron

Pripravci na bazi prosulfurona su sistemični folijarni herbicidi namijenjeni za suzbijanje najvažnijih jednogodišnjih širokolistnih korova (hrapavog šćira, pelinolisne ambrozije, bijele lobode, običnog malog čička, europskog mračnjaka, velikog dvornika, slatkastog dvornika, poljske gorušice, i dr.) u usjevu kukuruza bez podusjeva.

T - 0,05 mg/kg. S.O. III.

1.4.9. Rimsulfuron

Pripravci na bazi rimsulfurona su sistemični folijarni herbicidi namijenjeni za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih, kao i jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolistnih korova u usjevu kukuruza i krumpira. Djelatna tvar se translocira u cijelu biljku i koncentrira u točkama rasta. Kukuruz u vrijeme prskanja mora imati od 2-7 listova. Može se kombinirati s pripravcima na bazi: bentazona, dikambe, metribuzina, tifensulfurona i dr. (za širokolistne korove koje rimsulfuron slabije suzbiha). Učinkovit na jednogodišnje (koštan, svračica, muharike, proso) i višegodišnje uskolistne (divlji sirak iz rizoma, pirika) i neke širokolistne korove. Kao i kod nikosulfurona jednogodišnje trave ne smiju imati više od 5 listova! Za razliku od nikosulfurona ima određeno djelovanje i preko tla. Preporučuje se dodavanje neionskih okvašivača: Trend 90, Citowett i sličnih u škropivo (u spremnik prksalice idu zadnji).

LD₅₀ > 5000. S.O. = III.

1.4.10. Tifensulfuron-metil

Pripravci na bazi tifensulfuron-metila su selektivni post-em. herbicidi namijenjeni za suzbijanje širokolistnih korova u usjevu kukuruza od 2-5 lista i soji od 1-3 trodijelne dok su korovi u fazi od 2-4 lista. Rabi se za suzbijanje širokolistnih korova, i nekih prema atrazinu rezistentnih korova (Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Ambrosia artemisiifolia, Abutilon theophrasti) u kukuruzu i soji.

LD₅₀ 5000. S.O. = III. K - OVP.

1.4.11. Triasulfuron

Pripravci na bazi triasulfurona su selektivni herbicidi namijenjeni za suzbijanje širokolistnih i nekih uskolistnih korova u usjevima strnih žitarica. Djelatna tvar se dobro usvaja preko lista i korijena. Rabi se u kombiniranim pripravcima.

K - OVP. LD₅₀>5000.

Aktivna tvar triasulfuron više nije odobrena na razini EU.

1.4.12. Tribenuron

Pripravci na bazi tribenurona su selektivni herbicidi namijenjeni za suzbijanje širokolistnih korova u usjevima strnih žitarica. Kratke su perzistentnosti i ne ograničavaju plodosmjenu niti nakon proljetne primjene. Mogu se koristiti i u kraškim područjima. Proizvođač preporučuje kombinaciju Granstar 15-20 g/ha i Starane 250 EC 0,4-0,5 l/ha sve do pojave drugog koljenca u pšenici. Već 1 sat nakon prskanja cjelokupna količina pripravka je u biljci i nema mogućnosti ispiranja padalinama.

LD₅₀ 5000. S.O. = III.

1.4.13. Triflusulfuron

Pripravci na bazi triflusulfurona su selektivni post-em. herbicidi namijenjeni za suzbijanje jednogodišnjih širokolistnih korova u usjevu šećerne i stočne repe.

Suzbijaju i Abutilon theophrasti. Kratkog su rezidualnog djelovanja. Treba ih primijeniti više puta tijekom vegetacije u kombinaciji s mineralnim uljem ili Herbovit 90 / Trend 90.

Zbog proširenja spektra rabe se s pripravcima na osnovi: fenmedifama, etofumesata, desmedifama, klopiralida, metamitrona i kvizalofop. Dozu je potrebno prilagoditi vrsti, broju i stadiju razvoja korova. Već 3 sata nakon prskanja djelatna tvar je u cijelosti u biljci i nema mogućnosti ispiranja padalinama.

Neučinkoviti su na *Chenopodium* spp.

$LD_{50} > 5000$. S.O. = III. K - OVP.

Korovi trebaju biti u fazi od kotiledona do 2 prava lista!

1.4.14. Tritosulfuron

Pripravak na bazi tritosulfurona je selektivni herbicid namijenjen za suzbijanje velikog broja jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usjevu ozimih i jarih žitarica. Pri primjeni je potrebno dodati okvašivač.

S.O. = III. K - OVP osim 70 dana kukuruz za silažu (Callam).

1.5. Imidazolinoni

Imidazolinoni imaju isti mehanizam djelovanja kao i herbicidi iz grupe sulfonilurea, odnosno i oni kod osjetljivih biljaka inhibiraju rad enzima acetolaktat sintetaze (ALS) zbog čega u biljci izostaje biosinteza esencijalnih aminokiselina: valina, leucina i izoleucina, na temelju čega su razvrstani u **HRAC grupu B**. Biljka ih usvaja preko korijena i preko lista. Iako se primjenjuju u vrlo niskim dozama, mnogi od njih su vrlo perzistentni zbog čega se u tlu njihove biološki aktivne rezidue mogu pronaći i nekoliko godina nakon tretiranja. Upravo zbog perzistentnosti i posljedica koje proizlaze zbog perzistentnosti, mnogi herbicidi iz ove skupine u mnogim zemljama svijeta su od nedavno zabranjeni.

Jedini herbicid iz ove skupine koji ima široko područje primjene je imazamoks koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova nakon nicanja usjeva i korova u usjevima soje, graha, graška i lucerne. Imidazolinoni nisu pretjerano toksični za toplokrvne organizme zbog čega su razvrstani u treću skupinu otrova. U SAD-u i nekim zemljama Europe su selekcijom kulture stanica uzgojeni hibridi suncokreta i sorte soje tolerantni na imidazolinon herbicide.

1.5.1. Imazamoks

Djelatna tvar izaziva inhibiciju enzima acetolaktat sintaze (ALS) odgovornog za sintezu esencijalnih aminokiselina: valina, leucina i izoleucina. Zaštitu obaviti kada su soja, grah i grašak u fazi od 1-3 trodijelne, a lucerna u fazi tri trodijelne. Manje perzistentan od drugih djelatnih tvari iz ove grupe. Spektar suzbijanja: jednogodišnji širokolisni korovi, višegodišnji širokolisni korovi, travne.

LD_{50} 5000. S.O. = III.

1.6. Triazolopirimidini

(engl. Triazolopyrimidine)

Triazolopirimidini imaju isti mehanizam djelovanja kao i herbicidi iz grupe sulfonilurea i imidazolinona, odnosno i oni kod osjetljivih biljaka inhibiraju rad enzima acetolaktat sintetaze (ALS) zbog čega u biljci izostaje biosinteza esencijalnih aminokiselina: valina, leucina i izoleucina, na temelju čega su razvrstani u **HRAC grupu B**.

Triazolopirimidini su novija skupina herbicida koji se koristi za suzbijanje širokolistih korova u usjevu strnih žitarica u vrlo niskim količinama po jedinici površine. Biljka ih usvaja preko korijena i preko lista. Perzistentni su u tlu te u određenoj mjeri ograničavaju plodored.

1.6.1. Florasulam

Djelatna tvar izaziva inhibiciju enzima acetolaktat sintaze (ALS/AHAS) odgovornog za sintezu lančanih aminokiselina: valina, leucina i izoleucina. Pripravak namijenjen suzbijanju širokolistih korova u svim usjevima ozimih i jarih žitarica.

LD₅₀ > 6000. S.O. = III. K - OVP.

1.7. Triazini

(engl. Triazine)

Triazini kod osjetljivih biljaka inhibiraju fotosintezu u fotosistemu II, u kloroplastima tilakoidnih membrana, što dovodi do blokiranja transporta elektrona od QA do QB, a što rezultira zaustavljanjem fiksacije CO₂ i produkcije ATP i NADPH₂ potrebnih za normalni porast biljke. Na osnovu navedenog mehanizma djelovanja triazini su razvrstani u **HRAC grupu C1**. Ove herbicide biljka apsorbira iz tla preko korijena, poslije čega se oni transportiraju ksilemom u zelene dijelove gdje djeluju u kloroplastima ometajući normalni tok fotosinteze. Simptomi toksičnog djelovanja triazina vidljivi su u vidu intervenoznih kloroza i žutila na rubu lista, poslije čega se kod osjetljivih biljaka pojavljuje kloroza i nekroza.

Triazini su relativno stara, ali vrlo značajna i relativno jeftina grupa herbicida širokog spektra djelovanja na dikotiledone korove. Općenito, triazini su skloni adsorpciji zbog čega su mnogi od njih u tlu perzistentni. Prosječne doze razgrade se za 4-6 mjeseci. Daleko najznačajniji predstavnik ove grupe bio je atrazin koji se masovno rabio u zaštiti kukuruza od korova. Ipak, posljednjih godina zbog pooštrenih propisa (maksimalno dopuštena količina u pitkoj vodi iznosi 0,1 ppb) i zbog široke primjene, pojedini triazini, a naročito atrazin, mogu se naći u pitkoj vodi u količinama većim od dopuštenih propisom. Upravo zbog tog razloga u mnogim zemljama svijeta mnogi triazini, a naročito atrazin, su zabranjeni ili im je ograničena uporaba i doze.

U svijetu je veliki broj korovnih vrsta razvio rezistentne biotipove na ovu skupinu herbicida.

1.7.1. Terbutilazin

Djelatna tvar izaziva inhibiciju procesa fotosinteze. Rabi se u suzbijanju jednogodišnjih širokolistnih korova u usjevu kukuruza bez podusjeva (za zrno i silažu) poslije sjetve, a prije nicanja, ranom postu i u nasadima voćaka i vinove loze starijim od 2 godine u proljeće u suzbijanju sjemenskih korova. U tlu je manje ispirljiv od atrazina i služi kao alternativa u izboru zemljišnih pripravaka u kukuruzu. Mehanizam djelovanja i ciljana mjesta djelovanja istovjetna su atrazinu. U ranom postu (do 2-3 lista kukuruza) učinkovitost poboljšava dodatak 1-2 l/ha bijelog ulja. Nakon berbe kukuruza ne smije se sijati uljana repica, lucerna i djetelina.

LD₅₀ 2100. S.O. = III. K - OVP za kukuruz za zrno i mlijecna zrioba za kukuruz za zrno.

1.8. Triazinoni

(engl. Triazine)

Triazinoni imaju isti mehanizam djelovanja kao i herbicidi iz grupe triazina, uracila, piridazinona ifenil-**karbamata** odnosno i oni kod osjetljivih biljaka inhibiraju proces fotosinteze u fotosistemu II, zbog čega u tretiranoj osjetljivoj biljci izostaje fiksacija CO₂ i produkcija ATP i NADPH₂, a koji su neophodni za normalni porast biljke, na temelju čega je i ova grupa herbicida razvrstana u **HRAC grupu C1**.

Triazinoni su vrlo učinkoviti pre-em. i post-em. herbicidi. Suzbijaju širokolistne, ali i neke uskolisne korove, dok su na višegodišnje korove neučinkoviti. Redovito se rabe u kombinaciji s herbicidima djelotvornim za suzbijanje travnih korova. Triazinoni su nesimetrični triazini, kod kojih je perzistentnost u tlu nešto kraća od većine simetričnih triazina i iznosi 3-6 mjeseci.

Pripravci na osnovi metribuzina se koriste u soji, krumpiru, rajčici, lucerni i sunčokretu, dok se pripravci na osnovi metamitrona rabe u usjevu šećerne i stočne repe. Određene sorte krumpira i soje pokazuju sortnu osjetljivost prema metribuzinu.

1.8.1. Metamitron

Djelatna tvar izaziva inhibiciju procesa fotosinteze. Zemljišni (rezidualni) i folijarni (kontaktni) pripravak za suzbijanje jednogodišnjih širokolistnih korova, izrazite selektivnosti za kulturu. Uporaba: pre-em. ili višekratno u post-em. u usjevu šećerne i stočne repe. Na varijantu prskanja poslije sjetve, a prije nicanja treba se odlučiti kada očekujemo jaču pojavu korova prije nicanja repe i u dovoljno vlažnim tlima. Dozu odrediti prema sadržaju humusa te spektru i uzrastu korova. Izvanredno selektivan jer i nekoliko puta veće doze od preporučenih ne ostavljaju nikakve štete na repi. Osnovni partner u kombinaciji s drugim pripravcima za suzbijanje: europskog mračnjaka, ambrozije, osjaka ili travnih korova. U postu prskanja obaviti u kotiledonskom stadiju korova kada zadovoljavaju i niže doze metamitrona uz dodatak ulja.

LD₅₀ 3300. S.O. = III. K - OVP.

1.8.2. Metribuzin

Djelatna tvar izaziva inhibiciju procesa fotosinteze. Selektivni pripravak za suzbijanje velikog broja jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova. Usvaja se korijenom (pre-em.) i listom (post-em.). U usjevu krumpira se primjenjuje nakon sadnje i formiranja humaka ili tijekom vegetacije. U usjevu rajčice iz direktne sjetve se koristi u dozi od 0,3 kg/ ha prije nicanja i 0,4-0,7 kg/ha u fazi 4-6 lista rajčice. U lucerni se koristi u vrijeme mirovanja ili prije kretanja vegetacije. Doze je potrebno prilagoditi sadržaju humusa u tlu, pri čemu se niže doze rabe na srednje teškim, a veće na teškim, humusom bogatijim tlama. U sušnom periodu učinkovitost metribuzina je znatno manja.

LD₅₀ 2200. S.O. = III.

1.9. Piridazinoni

(engl. Pyridazinone)

Piridazinoni imaju isti mehanizam djelovanja kao i herbicidi iz grupe triazina, triazinona, uracila ifenil-karbamata, odnosno i oni kod osjetljivih biljaka inhibiraju proces fotosinteze u fotosistemu II, zbog čega u biljci izostaje fiksacija CO₂ i produkcija ATP i NADPH₂, koji su neophodni za normalni porast biljke, na temelju čega su i oni razvr-stani u **HRAC grupu C1**.

Piridazinoni su relativno stara skupina herbicida koja se odlikuje dobrom efikasnošću za suzbijanje jednogodišnjih sjemenskih širokolisnih korova. Na korove djeluju u nicanju preko korijenovog sustava ili preko lista kod primjene u vegetaciji. Iz ove skupine na tržištu su prisutni kloridazon koji se već dugo godina rabi za suzbijanje korova u usjevu šećerne i stočne repe i blitve te piridat. Selektivan je u sva tri roka primjene. Redovito se rabi u kombinaciji s drugim herbicidima. Pogodan je pripravak za višekratnu primjenu sa umanjenim količinama. Iskazuje osrednju perzistentnost (4-8 tjedana).

1.9.1. Kloridazon

Djelatna tvar izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama kojim svjetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Selektivni, zemljivojno-rezidualnokontaktni pripravak za suzbijanje jednogodišnjih sjemenskih širokolisnih korova u usjevu repe u pre- i post-em.-u. Učinak u velikoj mjeri ovisi o vlazi u tlu. Na korove djeluje u nicanju preko korijenovog sustava ili preko lista kod primjene u vegetaciji. Korovi su najosjetljiviji u fazi nicanja. Dozu prilagoditi sadržaju humusa u tlu. S više od 2 para pravih listova učinkovitost kloridazona se bitno smanjuje. Najbolje prskanje obaviti 3-5 dana prije nicanja repe na dobro pripremljenom tlu. Proizvođač ga preporučuje i u luku u više odvojenih rokova primjene u smanjenim dozama.

LD₅₀ 3300. S.O. = III. K - OVP osim za ciklu - 93 dana. Lišće stočne repe smije se koristiti 70 dana poslije tretiranja.

1.9.2. Piridat

Djelatna tvar se koristi za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u ratarskim kulturama te povrnicama nakon nicanja/presadživanja kulture. Bolji rezultati postižu se kod višekratne primjene.

1.10. Fenil-karbamati

(engl. Phenyl-carbamate)

Fenil-karbamati imaju isti mehanizam djelovanja kao i herbicidi iz grupe triazina, triazinona, uracila i piridazinona, odnosno i oni kod osjetljivih biljaka inhibiraju proces fotosinteze u fotosistemu II, zbog čega u biljci izostaje fiksacija CO₂ i produkcija ATP i NADPH₂, koji su neophodni za normalni porast biljke, na temelju čega su i oni razvrstani u **HRAC grupu C1**.

Iz ove skupine na tržištu su prisutne djelatne tvari dezmedifam i fenmedifam koji se rabe u usjevima šećerne repe i blitve za suzbijanje jednogodišnjih širokolistnih korova. Malo su perzistentni. Budući da su jedni od vodećih herbicida za suzbijanje korova u usjevu šećerne repe, na njihovoj osnovi i u kombinaciji s drugim herbicidima (etofumesat), na tržištu postoji veći broj registriranih pripravaka.

1.10.1. Desmedifam

Djelatna tvar izaziva inhibiciju procesa fotosinteze. Kontaktnog je djelovanja, učinkovita na korove iz fam. Amaranthaceae i veliki broj drugih širokolistnih korova. Ako je šećerna repa u fazi kotiledona, primjenjene količine pripravaka ne smiju biti veće od 1 l/ha. Prvi tretman protiv korova se obavlja kada je većina korova u fazi kotiledona uz uvjet da repa ima dva prava lista, ali se to u praksi često provodi i znatno ranije. Nakon 5-10 dana tretman se ponavlja kada je većina korova u fazi kotiledona.

LD 50 > 5000. S.O. = III.

1.10.2. Fenmedifam

Djelatna tvar izaziva inhibiciju fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama kojim svjetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Kontaktni herbicid za uporabu u kombinaciji s drugim djelatnim tvarima u suzbijanju jednogodišnjih širokolistnih korova u mlađem razvojnom stadiju. Za učinkovito djelovanje pripravaka potrebno je da 3-4 sata nakon prskanja ne bude padalina. Kod OF pripravka to vrijeme je 1-2 sata, a za Betanal AM-11 New najmanje 6 sati!

LD₅₀ 8000. S.O. = III.

1.11. Uree (supstituirani derivati fenilurea)

(engl. Urea)

Herbicidi iz grupe urea kod osjetljivih biljaka inhibiraju proces fotosinteze u fotosistemu II, zbog čega su razvrstani u **HRAC grupu C2**. Ovi herbicidi primarno djeluju preko korijena, odakle se putem vode translociraju sve do listova gdje se vežu na kloroplast i ometaju proces fotosinteze zbog čega dolazi do ugibanja osjetljivih korovnih biljaka. Primjenjuju se nakon sjetve, ali i nakon nicanja. Čvrsto se vežu na čestice tla. Slabo podliježu ispiranju zbog čega su relativno perzistentni. Razgrade se u toku 3-6 mjeseci. Maksimalna koncentracija sredstva zadržava se u površinskom sloju tla odakle ga biljka apsorbira korijenom. Selektivnost im se zasniva na prostornoj razlici između na površinu tla nanijetog filma herbicida i dubine položenog sjemena kulture (prostorna selektivnost).

Herbicidi iz grupe urea su relativno starija, ali vrlo značajna skupina herbicida. Širokog su spektra djelovanja na veliki broj korova, ali ne djeluju na višegodišnje korove. Male su otrovnosti zbog čega su svi razvrstani u treću skupinu otrova. Klortoluron i izoproturon su već duži niz godina vodeći herbicidi na području suzbijanja travnih korova u strnim žitaricama. Radi proširenja spektra na neke širokolisne korove, rabe se zajedno s herbicidima iz drugih skupina. Linuron se sam ili u kombinaciji s drugim herbicidima rabi u kukuruzu, krumpiru, suncokretu, soji i mrkvi.

1.11.1. Klortoluron

Djelatna tvar izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama kojim svjetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Rabi se za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova. Primjenjuje se prije ili poslije nicanja ozimih usjeva tijekom jeseni ili u proljeće sve do konca busanja. Prskanje jarih žitarica se ne preporučuje kao ni kasno posijanih ozimina, u vrijeme jakih mrazeva i na lakim tlima s manje od 1,2% humusa. Korovna biljka ga usvaja korijenom i listom. Najčešće u kombinaciji s djelatnim tvarima za suzbijanje širokolisnih korova.

LD₅₀ 10000. S.O. = III. K - OVP.

1.11.2. Linuron

Djelatna tvar izaziva inhibiciju procesa fotosinteze. U slučaju većih padalina nakon primjene moguće su fitotoksične pojave na klijancima budući da je samo "prostorno" selektivan. Zemljjišni i folijarni (u manjoj mjeri) pripravak za suzbijanje širokolisnih korova u velikom broju kultura. Korovna biljka ga usvaja i korijenom i listom. Za dobar učinak potrebna je dobra predsjetvena priprema i vlaga u tlu. Do odumiranja korova dolazi tijekom 8-14 dana. U biljci se kreće akropetalno. Nije za uporabu na tlima s manje od 1,5% i više od 6% humusa. Ne rabiti u mladoj mrkvi namijenjenoj prodaji.

LD₅₀ 1500 - 4000. S.O. = III.

1.11.3. Izoproturon

Djelatna tvar za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova u žitaricama u pre-em. ili post-em. primjeni. Korovna biljka je usvaja korijenom i listom. U tlu ostaje na dubini od 5-10 cm gdje suzbića sve korove u klici ili nicanju. Usjev u vrijeme tretiranja treba biti od tri lista do konca busanja, a korovi od 1 lista do punog busanja. Nije dovoljno učinkovit protiv divlje zobi.

Aktivna tvar izoproturon više nije odobrena na razini EU.

LD₅₀ 1800. S.O. = III. K - OVP.

1.11.4. Metobromuron

Djelatna tvar za suzbijanje jednogodišnjih širokolistnih i travnih korova. Imala je dozvolu za suzbijanje korova u pre-em roku primjene u krumpiru. U slučaju propadanja usjeva, na tlu na kojem je primjenjeno sredstvo, uz zaoravanje na dubinu 15-20 cm smiju se sijati ili saditi korjenasto i/ili lisnato povrće, nakon mjesec dana kukuruz, mrkva, grah, mahune, grašak i suncokret; nakon 6 mjeseci: žitarice; nakon 12 mј. ostale kulture.

K – OVP

1.12. Nitrili (benzonitrili)

(engl. Nitrile)

Nitrili predstavljaju heterogenu i relativno stariju skupinu kontaktnih herbicida s izvjesnim translokacijskim djelovanjem. Bromoksinil kod osjetljivih biljaka inhibira proces fotosinteze u fotosistemu II, zbog čega je on razvrstan u **HRAC grupu C3**. Suzbija isključivo širokolistne korove, naročito kad se nalaze u mlađem razvojnog stadiju. Selektivan je u kukuruzu i strnim žitaricama.

Iako je građom jako sličan bromoksinilu, diklobenil se po svojim biološkim karakteristikama bitno razlikuje od njega pošto kod osjetljivih biljaka inhibira građu staničnih stijenki, a ima utjecaj i na sintezu enzima celuloze, zbog čega je razvrstan u **HRAC grupu L**. Hlapiv je pa na tržište dolazi isključivo u formi granulata. Diklobenil biljka apsorbira korijenom i preko lista. Herbicid je širokog spektra. Perzistentan je 6-12 mjeseci (ovisno o dozi). Rabi se kao selektivni herbicid u vinovoj lozi, kruški, breskvi, malinama i ribizlu, te kao totalni herbicid u ukrasnom šiblju, grmlju, živicama, na putovima, grobljima i slično.

1.12.1. Bromoksinil

Djelatna tvar izaziva inhibiciju fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama kojim svjetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Fitotoksičan kada se primjenjuje s uljem i na višim temperaturama od 22°C ili u vlažnim uvjetima. Relativno nizak LD₅₀! Selektivni kontaktni pripravak za suzbijanje jednogodišnjih širokolistnih korova u usjevu kukuruza. Kukuruz u vrijeme primjene treba biti od 2-4 lista, a korovi od 4-6. Kompatibilan s većinom pripravaka. Ne prskati po hladnom, vjetrovitom i kišovitom vremenu. Potrebno 6 sati od tretiranja bez padalina da bi se pripravak u cijelosti usvojio.

LD₅₀190. S.O. = II. K - 60 dana kukuruz za zrno i silažu, 45 dana kukuruz šećerac, OVP za luk.

1.13. Benzotiadiazinoni

(engl. Benzothiadiazinone)

Benzotiadiazinoni su nešto starija skupina herbicida koja kod osjetljivih biljaka inhibira proces fotosinteze u fotosistemu II, zbog čega su razvrstani u **HRAC grupu C3**. Koriste se za suzbijanje jednogodišnjih širokolistnih korova, a njihov jedini predstavnik je bentazon. Ovaj herbicid je kontaktnog djelovanja. Apsorbira se lišćem i minimalno se bazipetalno translocira poslije folijarne primjene. Maksimalna količina se apsorbira 4 sata poslije upotrebe ili za još

kraće vrijeme ako se upotrebi sa adjuvantom. Kod razvijenih biljaka bentazon se apsorbira i korijenom iz hranjivog medija i transportira u nadzemne dijelove biljke. Kloroza se pojavljuje 3-5 dana poslije primjene, poslije čega dolazi do nekroze i otpadanja osušenih listova. U tlu se bentazon razgrađuje relativno brzo. Polovični vijek raspada iznosi mu 20 dana. Tolerantne biljke ga brzo metaboliziraju formirajući glukozil konjugate koji su manje pokretljivi i toksični za tretiranu biljku. Selektivan je u kukuruzu i mahunarkama (soji, grahu, grašku i lucerni). Rezidue bentazona u biljnem materijalu razgrade se unutar 6 tjedana. Rabi se sam, ali i u kombinaciji s drugim herbicidima.

1.13.1. Bentazon

Djelatna tvar izaziva inhibiciju fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama kojim svjetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Djeluje isključivo preko zelenih (živih) biljnih dijelova. Ugrađuje se u klorofil i remeti proces fotosinteze. Zeleni dijelovi korova postupno žute i nakon nekoliko dana potpuno se osuše. Nekroza nastaje u neposrednoj zoni kontakta kapljice škropiva i površine lista. Translokacija djelatne tvari kroz biljku je minimalna, zbog čega svi biljni dijelovi moraju biti dobro poprskani škropivom. Viša relativna vлага zraka i temperatura pojačavaju učinkovitost pripravka. Kukuruz i sirak su potpuno tolerantni na bentazon u svim fenofazama razvoja. Učinkovit je na korove u fazama od 2-6 listova. Nakon prskanja ne smije padati kiša barem 6 sati. Ne prskati pri jakim rosama, zbog mogućnosti ispiranja. Može se primijeniti i u split aplikaciji u intervalu od 10-15 dana. Suncokret u vrijeme suzbijanja ne bi smio imati više od 4 lista. Za soju je potpuno selektivan ako se primjenjuje nakon prve troliske do pred cvatnju soje, a u krumpiru po obavljenom zagrtanju kada je 10-15 cm visine na nikle korove. Ne u kombinaciji s folijarnim graminicidima! Proizvođač ga preporučuje i u luku u više odvojenih rokova primjene u smanjenim dozama tijekom vegetacije. U tlu se razgradi uz pomoć mikroorganizama nakon mjesec dana. Ne veže se na čestice tla. Brza razgradnja onemogućava njegovu akumulaciju u površinskim i podzemnim vodama. Slabo hlapljiv i neznatno opasan po susjedne osjetljive usjeve. Opasnost se povećava dodatkom okvašivača škropivu. Neznatne akutne toksičnosti za životinje. Prvi simptomi na tretiranim korovima vidljivi su nakon 2-7 dana od primjene.

LD₅₀ 1100. S.O. = III.

1.14. Dipiridili

(engl. Bipyridylum)

Dipiridili su mala, ali vrlo važna skupina post-em. kontaktnih neselektivnih herbicida koji kod osjetljivih biljaka inhibiraju proces fotosinteze preusmjeravajući elektrone iz fotosistema I pri čemu se formiraju superoksiidi, koji oštećuju stanične membrane i citoplazmu, zbog čega su razvrstani u **HRAC grupu D**. Ovi herbicidi pri dodiru uništavaju sve zelene dijelove biljke sa kojima dođu u kontakt, zbog čega se često rabe kao desikanti. Vrlo brzo se folijarno apsorbiraju, tako da kiša već 30 minuta poslije primjene ne izaziva ispiranje preparata. Transportiraju se skoro isključivo ksilemom. Folijarna apsorpcija se poboljšava dodavanjem neionskih okvašivača.

Glavna osobina ove grupe je njihova brza inaktivacija u kontaktu s tlom, zbog čega je neposredno nakon njihove primjene moguće sijati bilo koju kulturu bez ikakva ograničenja. Zbog potpune inaktivacije u tlu i širokog spektra djelovanja na korove ovi herbicidi su bili sinonim pripravaka za „kemijsko oranje“ ili zamjena klasičnoj obradi oranjem i pripremi tla prije sjetve, zbog čega su u svijetu znatno pripomogli uvođenju minimalne i reducirane obradbe tla. Osim kao totalni, usmjerrenom aplikacijom pod list širom svijeta se koristi u vinogradima i voćnjacima kao selektivni herbicidi. Zbog pozitivnih karakteristika, već duži niz godina vodeći su herbicidi u svijetu. Međutim, dipiridili su vrlo opasna sredstva. Za parakvat (Gramoxone) do danas nije pronađen protuotrov. Širom svijeta zabilježena su namjerna i slučajna trovanja, sva sa smrtnim posljedicama.

1.14.1. Dikvat

Djelatna tvar izaziva brzo razaranje staničnih stijenki stvaranjem vrlo toksičnih spojeva usko povezanih s fotosintezom. Vrlo topljav u vodi. Snažno se veže na čestice glinasto ilovastih tala. Vrlo toksičan za sisavce. Razgradnja se najvećim dijelom odvija uz pomoć ultraljubičastog zračenja, a utjecaj mikroorganizama neznatan. Pripravak za uporabu u suzbijanju velikog broja jednogodišnjih uskolistih i širokolistih korova; za desikaciju sjemenskog i merkantilnog krumpira, soje (14 dana prije berbe), suncokreta, uljane repice (najkasnije 14 dana prije žetve), lucerne i djeteline (u zriobi). Djeluje kontaktno i vrlo brzo. Desikaciju obaviti u vrijeme biološke zrelosti usjeva.

LD₅₀ 231. S.O. = II (preko 20% djelatne tvari); inače III.

1.15. Difenileteri

(engl. Diphenylether)

Herbicidi iz grupe difeniletera kod osjetljivih biljaka uzrokuju inhibiciju enzima protoporfirinogen oksidaze (PPO) odgovornog za biosintezu klorofila koji katalizira oksidaciju protoporfirenogena (PPGIX) u protoporfirin (PPIX), što izaziva oštećenja stanične membrane i na kraju ugibanje osjetljive biljke, zbog čega su razvrstani u **HRAC grupu E**. Predstavljaju grupu herbicida širokog spektra djelovanja na jednogodišnje širokolistne korove. Kontaktog su učinka, zbog čega ih dominantno primjenjujemo nakon nicanja korova. Vrlo brzo se apsorbiraju lišćem biljaka pa minimalni gubici nastaju poslije kiše 1 sat poslije primjene. Primarno se trasnportiraju ksilemom. Bolje djeluju na širokolistne korove, iako iskazuju izvjesne učinke i na klijance trava. Djeluju i preko korijena, no tad ih je potrebno primijeniti u višim dozama.

Jedini predstavnik ove grupe je selektivni kontaktni herbicid oksifluorfen koji je namijenjen suzbijanju korova u usjevu suncokreta, luka, kupusa i cvjetače, te voćnjacima i vinogradima. Difenil eteri se vrlo čvrsto vežu na adsorpcijski kompleks tla te se gotovo ne pomiču s površine tla. Perzistentnost u tlu im je različita. Rezidue oksifluorfena mogu osjetljivim kulturama štetiti i naredne sezone.

1.15.1. Oksifluorfen

Djelatna tvar izaziva inhibiciju enzima protoporfirinogen oksidaze (PPO) i kidanje stanične stijenke korovne biljke. Kontaktni, selektivni i rezidualni zemljšni pripravak za suzbijanje širokolistnih korova. Obično se rabi u kombinaciji s drugim djelatnim tvarima. Dobra predsjetvena priprema i kvalitetna aplikacija stvara herbicidni "film" koji uništava klijajuće korove. Ne ulazi u biljku i ne translocira u njoj. Na suncokretu izaziva prolazne fitotoksične simptome. Dopuštena jedna primjena godišnje.

LD₅₀ 5000. S.O. = III.

1.16. N-fenilftalimidi

(engl. N-phenylphthalimide)

N-fenilftalimidi imaju isti mehanizam djelovanja kao i herbicidi iz grupe difeniletera i oksadiazola, odnosno i oni kod osjetljivih biljaka izazivaju inhibiciju enzima protoporfirinogen oksidaze (PPO, odgovornog za biosintezu klorofila, koji katalizira oksidaciju protoporfirinogena (PPGIX) u protoporfirin (PPIX), što izaziva oštećenja stanične membrane i na kraju ugibanje osjetljive biljke, zbog čega su i oni razvrstani u **HRAC grupu E**. N-fenilftalimidi su nešto novija skupina herbicida koji se koriste za suzbijanje širokolistnih korova. Vrlo brzo se apsorbiraju lišćem biljaka mada mogu biti apsorbirani i korijenovim sustavom. Primarno se transportiraju ksilemom. Listovi osjetljivih biljaka poslije tretiranja u početku postaju klorotični, poslije čega nekrotiziraju i opadaju za 1-3 dana.

1.16.1. Flumioksazin

Djelatna tvar izaziva inhibiciju enzima protoporfirinogen oksidaze (PPO), odgovornog za sintezu jednog od međuproizvoda klorofila. Pripravak namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolistnih korova u usjevu kukuruza nakon sjetve, a prije nicanja i u vinogradima. Smije se primijeniti najkasnije 48 sati nakon sjetve. Za proširenje spektra djelovanja na jednogodišnje travne korove kombinira se pripravcima učinkovitim na iste. Djeluje kao inhibitor protoporfirinogen oksidaze.

LD₅₀ > 5000. S.O. = III. K - OVP.

1.17. Piridinkarboksamidi

(engl. Pyridinecarboxamide)

Herbicidi iz grupe piridinkarboksamida kod osjetljivih biljaka inhibiraju biosintezu karotenoida blokiranjem aktivnosti enzima fiton desaturaze (PDS), zbog čega su razvrstani u **HRAC grupu F1**. Bez karotenoida koji imaju zaštitnu ulogu, molekule klorofila se vrlo brzo razgrade uslijed čega novi listovi dobijaju bijelu ili svjetlo žutu boju ("Bleaching"), zbog čega osjetljive biljke na kraju ugibaju.

Piridinkarboksamidi se odlikuju kontaktnim i rezidualnim djelovanjem, a namijenjeni su suzbijanju širokolistnih i nekih uskolistnih korova u usjevu pšenice i ječma. Djelatna tvar se zadržava na površini tla tvoreći nevidljivi herbicidni film koji uništava klijance korova u nicanju.

1.17.1. Diflufenikan

Djelatna tvar izaziva inhibiciju enzima fiton desaturaze (PDS) odgovornog za sintezu karotenoida. Selektivni pripravak kontaktnog i rezidualnog djelovanja, namijenjen suzbijanju širokolisnih i nekih uskolisnih korova u usjevima pšenice i ječma. Može se rabiti poslije sjetve, a prije nicanja ili u postu od 2-3 lista do konca busanja. Listovi klijanaca koji su se razvili iz sjemena koje se u vrijeme prskanja ovim pripravcima nalazilo na površini tla prolazno mijenjaju boju u bijelu ili crvenu. Najčešće se rabi u kombinaciji s drugim djelatnim tvarima.

LD₅₀ 2000. S.O. = III. T - 0,1 žitarice. K - OVP.

Pripravak: **Legato Plus, Alister Grande, Tornado forte, Alister New.**

1.18. Triketoni

(engl. Triketone)

Herbicidi iz grupe triketona kod osjetljivih biljaka inhibiraju biosintezu karotenoida blokiranjem aktivnosti enzima 4-hidroksifenil-piruvat dioksigenaze (4-HPPD), zbog čega su razvrstani u **HRAC grupu F2**. Bez karotenoida koji imaju zaštitnu ulogu, molekule klorofila se vrlo brzo razgrade uslijed čega novi listovi dobijaju bijelu ili svijetlo žutu boju ("Bleaching"), zbog čega osjetljive biljke na kraju ugibaju.

Triketoni su novija grupa herbicida vrlo dobre djelovanja za suzbijanje mnogih širokolisnih i nekih uskolisnih korova. U biljci su izrazito pokretljivi u oba smjera. U zemljištu su relativno perzistentni zbog čega za osjetljive biljke mogu predstavljati problem u plodoredu.

1.18.1. Mezotriion

Djelatna tvar izaziva inhibiciju enzima 4-hidroksifenil-piruvat dioksigenaze (4-HPPD) odgovornog za sintezu karotenoida. Bez karotenoida, koji imaju zaštitnu ulogu molekula klorofila, on se vrlo brzo razgradi te su novi listovi bijele ili svijetlo žute boje. Mezotriion je dobiven istraživanjem leptospermona, tvari izolirane iz ukrasne biljke Callistemon citrinus. U biljci vrlo brzo kola u oba smjera. Nakon primjene na listovima se može pojaviti blijeđenje, prolaznog karaktera i bez utjecaja na daljnji razvoj i prirod kukuruza.

Nakon primjene ne smiju se sijati dvije godine: šećerna i stočna repa, špinat, grah i grašak. Sjetva soje može se obaviti 12 mjeseci nakon primjene ovog pripravka. Na jesen iste godine smiju se sijati: pšenica, pšenoraž i ozimi ječam, a dublje preoravanje potrebno je obaviti prije sjetve uljane repice, lucerne ili djeteline. Učinkovit je u suzbijanju širokolisnih i malog broja uskolisnih korova. Za suzbijanje travnih korova treba koristiti neki od pre-em. graminicida. Kod primjene u postu obavezno dodati okvašivač. Nakon 3 lista kukuruza može se kombinirati s nikosulfuronom ili rimsulfuronom. Za 14 dana dolazi do ugibanja tretiranih biljaka, a rast i razvoj korova nastupa odmah nakon prskanja. Omjer usvajanje listom i korijenom je 80 : 20%.

LD₅₀> 500.

1.18.2. Tembotrion

Tembotrion izaziva inhibiciju enzima 4-hidroksifenil-piruvat dioksigenaze (4-HPPD) odgovornog za sintezu karotenoida. Bez karotenoida, koji imaju zaštitnu ulogu molekula klorofila, on se vrlo brzo razgradi te su novi listovi bijele ili svijetlo žute boje (“Bleaching”), zbog čega osjetljive biljke na kraju ugibaju.

Laudis je sistemični herbicid za suzbijanje korova u merkantilnom kukuruzu:

- jednogodišnjih travnih korova: obična svračica (*Digitaria sanguinalis*), obični koštan (*Echinochloa crus galli*) i muharike (*Setaria spp.*);
- jednogodišnjih širokolistnih korova: europski mračnjak (*Abutilon theophrasti*), šćir (*Amaranthus spp.*), pelinolisna ambrozija (*Ambrosia elatior*), bijela loboda (*Chenopodium album*) i dr. Travne korove najbolje suzbija do stadija 3 lista, a širokolistne do 4 lista (europski mračnjak, pelinolisna ambrozija do 2 lista). Za poboljšanje učinka na širokolistne korove može se kombinirati sa herbicidima na temelju foramsulfurona.

1.19. Izoksazoli

(engl. Isoxazole)

Izoksazoli imaju isti mehanizam djelovanja kao i herbicidi iz grupe triketona, odnosno i oni kod osjetljivih biljaka inhibiraju biosintezu karotenoida blokiranjem aktivnosti enzima 4-hidroksifenil-piruvat dioksigenaze (4-HPPD), zbog čega su razvrstani u **HRAC grupu F2**. Bez karotenoida koji imaju zaštitnu ulogu, molekule klorofila se vrlo brzo razgrade uslед čega novi listovi dobivaju bijelu ili svijetlo žutu boju (bljenje), zbog čega osjetljive biljke na kraju ugibaju.

Izoksazoli predstavljaju noviju skupinu herbicida koji djeluju na jednogodišnje širokolistne korove, a slabije na jednogodišnje travne korove. Biljka ih apsorbira preko korijena. Izvjesni učinak iskazuju i na tek izniklim korovima. Umjerene su perzistentnosti. Trenutno jedini predstavnik ove grupe je izoksaflutol, koji se rabi u kukuruzu. Na tržište je plasiran kao zamjena za atrazin.

1.19.1. Izoksaflutol

Djelatna tvar izaziva inhibiciju enzima hidroksi fenil piruvat dioksigenaze (HPPD) odgovornog za sintezu karotenoida. Bez karotenoida, koja ima zaštitnu ulogu molekula klorofila se vrlo brzo razgradi te su novi listovi bijele ili svijetlo žute boje. Zemljivo pripravak namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolistnih i (nekih) uskolistnih korova. Nakon usvajanja ksilom i floemom translocira cijelom biljkom. Uporaba: poslije sjetve, a prije nicanja ili rani post-em. Najbolji rezultati postižu se primjenom na mlade korove u aktivnom rastu (od nicanja do 2 lista), a slabiji su u suši. Najbrže se očituje u meristemu zbog blokade sinteze pigmenata i bijeloj boji listova. U nekim zemljama registriran i za rani post-em. (do 3 lista kukuruza). Najčešće u kombinaciji s nekim od acetanilida. Učinkovit i u sušnim proljećima.

LD₅₀ 5000. S.O. = III. K - OVP.

1.20. Izoksazolidinoni

(engl. Isoxazolidinone)

Herbicidi iz grupe izoksazolidinona kod osjetljivih biljaka inhibiraju biosintezu karotenoida blokiranjem aktivnosti enzima u putu biosinteze izoprenoida, mada im mehanizam djelovanja još uvijek nije u potpunosti razjašnjen, zbog čega su razvrstani u **HRAC grupu F3**. Bez karotenoida koji imaju zaštitnu ulogu, molekule klorofila se vrlo brzo razgrade uslijed čega novi listovi dobijaju bijelu ili svijetlo žutu boju (“Bleaching”), zbog čega osjetljive biljke na kraju ugibaju.

Izoksazolidinoni predstavljaju relativno noviju skupinu herbicida koji djeluju na jednogodišnje travne i širokolisne korove. Trenutno jedini predstavnik ove grupe je klomazon, koji se primjenjuje prije sjetve soje ili sadnje duhana, dok se u usjevu uljane repice rabi nakon nicanja u relativno niskim dozama. U značajnjem stupnju klomazon se apsorbira korijenom i stabiljikom klijanaca korova (koleoptilom kod travnih korova i hipokotilom i epikotilom kod širokolisnih korova). Slabo se apsorbiraju kada se folijarno primjeni. Poslije apsorpcije korijenom u nadzemene dijelove biljke se prenosi ksilemom. Također se slabo translocira floemom poslije folijarne primjene. Poslije nicanja mlade biljke su obično osjetljive prema ovom herbicidu, kada postaju bjeličaste i nekrotične. Drift (zanošenje) parama može izazvati blijedenje listova obližnjih stabala, zeljastih kultura i općenito vegetacije.

1.20.1. Klomazon

Djelatna tvar izaziva inhibiciju više enzima sličnih (HPPD) odgovornih za sintezu karotenoida. Bez karotenoida, koja ima zaštitnu ulogu molekula klorofila se vrlo brzo razgradi te su novi listovi bijele ili svijetlo žute boje. Zanošenjem ili parama može izazvati na listovima prolazno bijeljenje ili žućenje susjednih kultura. Zemljšni pripravak za suzbijanje uskolisnih i nekih širokolisnih korova. Primjena poslije sjetve ili sadnje, a prije nicanja ili prije sjetve ili sadnje uz inkorporaciju. U biljkama izaziva inhibiciju sinteze pigmenata koji čuvaju molekulu klorofila od razornog djelovanja sunčanih zraka. Usvaja se korijenom i premješta ksilemom k vrhu biljke i difuzijom dospijeva u listove. Ne pokazuje sposobnost kretanja u suprotnom smjeru ili iz lista u list. Radi proširenja spektra koristi se u kombinaciji s drugim djelatnim tvarima. Perzistentan - voditi računa o plodosmjeni! Nakon 9 mjeseci od primjene dopuštena sjetva: kukuruza, graha, graška i sadnja rajčice; nakon 16 mjeseci: zobi, prosa, lucerne i rajčice iz sjemena; nakon 18 mjeseci: šećerne i stočne repe i nakon 12 mjeseci svih ostalih usjeva.

S.O. = III. LD₅₀ 1406. K - OVP.

1.21. Glicini (aminofosfonati)

(engl. Glycine)

Herbicidi iz grupe glicina kod osjetljivih biljaka inhibiraju aktivnost enzima 5-enolpiruvilšikimat-3-fosfat (EPSP)sintetaze koja producira EPSP iz šikimat-3-fosfata i fosfoenolpiruvata u metaboličkom putu šikimske kiseline. EPSP inhibira korištenje aromatičnih aminokiselina triptofana, tirozina i fenilalanina koje su neophodne za sintezu proteina ili za biosintetski put rasta, zbog čega su razvrstani u **HRAC grupu G**.

Dodavanjem ovih aminokiselina egzogeno potpuno se zaustavlja toksičnost glifosata na više biljke što ukazuje da je inhibicija sinteze proteina involvirana u ove efekte. Sisavci nemaju EPSP enzim i svoje potrebe za ovim aminokiselinama zadovoljavaju drugim izvorima hrane.

Jedini predstavnik ove grupe je totalni herbicid glifosat, koji je izraziti sistemik, sa translokacijskim djelovanjem na jednogodišnje i višegodišnje korove. Ekotoksikološke karakteristike su mu vrlo povoljne. Ne ostavlja rezidue u tlu. Ne kontaminira vode, plodine. U procesu metabolizma glifosat se u biljkama polako metabolizira do amino metil fosfonske kiseline. Rabi se širom svijeta za totalno suzbijanje korova, zatim u višegodišnjim nasadima, vodotocima, na željezničkim prugama, putovima u naseljenim mjestima i sl. Masovno se rabi u genetski modificiranim biljkama.

1.21.1. Glifosat

Djelatna tvar izaziva inhibiciju enzima 5-enolpiruvilšikimat-3-fosfat (EPSP)sintetaze odgovornog za sintezu aromatskih aminokiselina: fenilalanina, tirozina i triptofana. Ne selektivni izrazito sistemični-translokacijski pripravci za suzbijanje velikog broja jednogodišnjih travnih i širokolistnih korova te višegodišnjih korova s dubokim korijenom, rizomima i gomoljima. Najčešće se rabi u formi izopropilamino soli. Primjenjuje se na listove korova.

Snažno se veže na koloide tla u tolikoj mjeri da više nije pristupačan biljkama. U tlu se razgradnja najvećim dijelom odvija uz pomoć mikroorganizama, a manjim, kemijskim putem hidrolizom, oksidacijom i fotodegradacijom. Potrebno je šest sati iza primjene glifosata da bude suho jer u protivnom djelotvornost može biti smanjena.

LD₅₀ 4320. S.O. = III. Neznatno toksičan za sisavce.

Primjena uz utrošak vode na bazi 200-400 l/ha.

Na strništima za suzbijanje: Agropyron repens, Sorghum halepense, Cynodon dactylon, Cyperus rotundus i sličnih u dozi 8-10 l/ha kada ovi korovi razviju lisnu masu i dostignu visinu 15-40 cm, pred cvatnju i u cvatnji kada je silazno koljanje asimilata najintenzivnije. Površine na kojima je primijenjeno sredstvo ne smiju se obrađivati najmanje 7 dana, a kod suzbijanja otpornih višegodišnjih korova 2-3 tjedna.

U vinogradima i voćnjacima (jabuka, kruška, marelica, šljiva, višnja, maslina) u količini:

- 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova
- 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova
- 8-12 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova s osobito dubokim korijenom ili rizomima u punoj vegetaciji.

U nasadu vinove loze se primjenjuje do završetka cvatnje, a u voćnjacima najkasnije u roku od 90 dana od početka cvatnje kada korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu; tj. kod visine korova 15-40 cm.

Smije se koristiti samo u nasadima starijim od 2 godine, odnosno ne smije se koristiti u voćnjacima i vinogradima dok je kora još zelena.

Za pred žetveno suzbijanje korova u žitaricama i za desikaciju uljane repice, tretiranjem najkasnije 14 dana prije žetve u dozi 2-4 l/ha. Slama s tretiranih površina ne smije se koristiti za kompost u proizvodnji povrća, gljiva i silažu.

Za obnovu livada i pašnjaka, tretiranjem u vrijeme intenzivnog rasta korova i livadnih trava u dozi 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova i 4-10 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova.

U suhim kanalima (III i IV reda) ili u povremeno plavljenim kanalima i močvarama koje se nakon odvodnje privode kulturi u dozi 4-8 l/ha uz napomenu da djelovanje pripravka traje od 14-21 dan te se u tom periodu ne smiju kositi ili obrađivati. Voda se smije puštati u kanale najranije 7 dana nakon primjene.

Na neobrađenim površinama primjenom u vrijeme pune vegetacije u dozi 4-12 l/ha.

Na željezničkim prugama za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova u dozi 8-12 l/ha.

U šumskim nasadima iz zrakoplova radi suzbijanja drvenastih korova: divljeg kestena, lijeske, gloga, topole, johe, bagrema, divlje ruže, kupine, borovnice, bazge, vrijesa, bukve, hrasta, graba, breze, vrbe i sl. u količini:

- 5-6 l/ha u nasadima bijelog i crnog bora uz utrošak vode od 75-100 l/ha.
- 6-7 l/ha u nasadima smreke uz utrošak vode od 75 l/ha.
- 7-8 l/ha kod pripreme površina za pošumljavanje uz utrošak vode od 75 l/ha.
 - U šumskim rasadnicima tretiranjem između redova u vegetaciji uz obavezno korištenje štitnika u dozi 4,5 l/ha. Za primjenu koristiti uređaje niskog pritiska.
 - U sadnicama smreke i bora u dozi 6 l/ha tretiranjem po cijeloj površini u vrijeme potpunog mirovanja četinjača, a rasta korova.
 - U mladim nasadima četinjača za suzbijanje drvenastih korova:
 - tretiranjem drvenastih korova tijekom vegetacije uz uporabu štitnika u koncentraciji od 2%,
 - tretiranjem po cijeloj površini početkom jeseni kada su sadnice u fazi završnog rasta u koncentraciji 1%.
 - Za suzbijanje izdanaka i izbojaka tretiranjem panjeva odmah nakon sječe stabala (svibanj-prosinac) 15% otopinom.
 - Poslije čiste sječe šume u pripremi površina za sadnju:
- tretiranjem izdanaka i izbojaka u punoj vegetaciji u periodu intenzivnog rasta u 1% koncentraciji.
- tretiranjem svježe posjećenih panjeva u periodu kolovoz-rujan u 2% koncentraciji.

Količina pripravka ovisi o stupnju zakorovljenoosti i vrsti korova. Za najvažnije vrste iznosi:

- 4 l/ha za *Agropyron repens*,
- 4-5 l/ha za *Sorghum halepense*, *Cirsium arvense*, *Rumex crispus*, *Rumex obtusifolius*, *Artemisia vulgaris*, *Taraxacum officinale*, *Aegopodium podagraria*,
- 6-8 l/ha za *Rubus spp.*, *Cyperus rotundus*,
- 8-10 l/ha za *Cynodon dactylon*

Primjenjuju se pred cvatnjem i u doba cvatnje korova kada je silazno kolanje asimilata najintenzivnije.

Primjena uz utrošak vode na bazi 100-200 l/ha:

Prije pripreme za sjetvu kukuruza, suncokreta, krumpira i šećerne repe, za suzbijanje:

- jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova kada su 5-10 cm visoki u dozi 1,5-2 l/ha,
pirike - kada je visine 10-25 cm u dozi 2-3 l/ha,
- *Cirsium arvense* u stadiju razvoja pune rozete (15-25 cm visine) u dozi 3-4 l/ha.

Obrada tla i sjetva mogu se obaviti 5 dana nakon primjene.

Nije dopuštena uporaba glifosata prije sjetve šećerne repe na laganim pjeskovitim tlima.

Nakon žetve/berbe kultura (strništa, površine iza povrtnih kultura...), za suzbijanje:

- pirike-kada je visine 10-25 cm u dozi 2-3 l/ha, *Cirsium arvense* u stadiju razvoja pune rozete (15-25 cm visine) u dozi 3-5 l/ha, divljeg sirka kada je visine 15-30 cm i poljskog slaka (*Convolvulus arvensis*) kada je visok 20-40 cm u dozi 5-6 l/ha.

U vinogradima, voćnjacima (visokih uzgojnih oblika): jabuke, kruške, marelice, masline, za suzbijanje:

- jednogodišnjih travnih iširokolisnih korova kada su 5-10 cm visoki u dozi 1,5-2 l/ha;
- pirike-kada je visine 10-25 cm u dozi 2-3 l/ha, *Cirsium arvense* u stadiju razvoja pune rozete (15-25 cm visine) u dozi 3-4 l/ha, divljeg sirka kada je visine 15-30 cm i poljskog slaka (*Convolvulus arvensis*) kada je visok 20-40 cm u dozi 5-6 l/ha, troškota (*Cynodon dactylon*) kada je visine 10-25 cm razdvojenom (split) pri-mjenom 2 x 2,5 l/ha.

Ne smije se koristiti u mladom voćnjaku i vinogradu (do 2 godine) dok je kora zelena, odnosno sve dok još nije formirana prava kora voćaka i vinove loze. Primjenom pripravaka na bazi glifosata sa smanjenim količinama vode može se uštedjeti, a za to je potrebna ispravna prskalica, sapnice kojima se može precizno primijeniti 100-200 l vode po hektaru, podešen radni tlak i prilagođena brzina traktora.

Za tretiranje manjih površina (okućnice, oko gospodarskih objekata, kanala, rubova cesta, ograda, oko dalekovoda, groblja i dr.) leđnim prskalicama za suzbijanje jednogodišnjih korova rabi se 1% koncentracija; za suzbijanje višegodišnjih korova 2% (100 odnosno 200 ml pripravka u 10 l vode).

1.22. Fosfinska kiselina (aminofosfonati)

(engl. Phosphinic acid)

Herbicidi iz grupe fosfinske kiseline kod osjetljivih biljaka inhibiraju aktivnost enzima glutamin sintetaze, odgovornog za sintezu glutamina iz glutamata, čija inhibicija izaziva nagomilavanje organskog amonijaka u biljnim stanicama koji na kraju postaje koban za biljku, zbog čega su razvrstani u **HRAC grupu H**.

Jedini predstavnik ove grupe je kontaktni neselektivni herbicid glufosinat-amonij koji je namijenjen suzbijanju svih zeljastih biljnih vrsta. Međutim, glufosinat-amonij suzbija samo nadzemne zeljaste biljne organe pa višegodišnje vrste korova i nakon što ih uništimo, iz podzemnih organa ponovno potjeraju. Rabi se kao kontaktni totalni herbicid za suzbijanje jedno i višegodišnjih korova u voćnjacima i vinogradima te na nepoljoprivrednim površinama, kao i za

desikaciju suncokreta, uljane repice, soje i krumpira. Biljka ga usvaja listom. Ekološki je prihvatljiv. Genetičkim modifikacijama uzgojene su sorte soje, pamuka i hibridi kukuruza rezistetni na učinak ovog herbicida.

1.22.1. Glufosinat

Glufosinat-amonij je totalni herbicid širokog spektra. Sličan je glifosatu po tome što ima jedno mjesto djelovanja, a to je enzim glutamin sintetaza odgovoran za sintezu glutamina iz glutamata.

Učinkovit na sve (zelene) stadije razvoja korova. Najbolji učinak kada korov ima veliki broj dobro razvijenih listova. Rabi se i za suzbijanje korova u kanalima za navodnjavanje i odvodnjavanje. Pogodan za primjenu na nasipima, terasama, uz ceste i željezničke pruge jer ne razara korijenov sustav korova i nema opasnosti od erozije. Prskanje obaviti samo na suhim korovima. Pripravak remeti metabolizam u stanici. Desikaciju soje obaviti kada ona izgubi 30% listova.

LD₅₀ 1450. S.O. = III.

1.23. Dinitroanilini

(engl. Dinitroaniline)

Herbicidi iz grupe dinitroanilina se kod osjetljivih biljaka vežu za tubulin, glavni mikrotubularni protein, gdje formiraju herbicid-tubulin kompleks koji inhibira obrazovanje mikrotubulina, uslijed čega dolazi do onemogućavanja odvajanja kromatida kromosoma u toku mitoze, a time i spriječavanja diobe stanica, zbog čega su razvrstani u **HRAC grupu K1**.

Dinitroanilini predstavljaju relativno stariju, ali vrlo značajnu skupinu zemljjišnih herbicida. Biljka ih apsorbira korijenom i koleoptilom u vodi. Trenutno se iz ove grupe na tržištu jedino može naći veći broj pripravaka na osnovi pendimetalina. Ovaj herbicid suzbija jednogodišnje uskolisne i neke širokolisne korove. Selektivan je za veliki broj različitih kultura kao npr: krumpir, kukuruz, žitarice, duhan, suncokret, grah, grašak, soju, jagodu, papriku, rajčicu, luk i dr. Pendimetalin se koristi poslije sjetve ili sadnje, a prije nicanja kulture. Najznačajnije mjesto apsorpcije kod visoko osetljivih travnih korova je koleoptil. Translokacija nije od značaja za suzbijanje klijanaca korova, jer se apsorpcija odigrava u koleoptilu i korijenu gdje se i događa herbicidna aktivnost. Relativno je perzistentan te je kod primjene u povrtnicama potrebno voditi računa o plodoredu.

1.23.1. Pendimetalin

Djelatna tvar zaustavlja diobu stanica snažnim djelovanjem mikrotubule što u konačnici izaziva zaustavljanje rasta korijena širokolisnih korova ili čvora busanja travnih korova. Sve djelatne tvari ove grupe su sjajno žute boje zahvaljujući nitro (- NO₂) grupama na fenilnom prstenu te ih često nazivaju i "žutim" spojevima. Cijela grupa je otkrivena i razvijena zahvaljujući radu na razvoju sinteze boja. Lipofilni su gotovo netopljivi u vodi te predstavljaju neznatnu opasnost od kontaminacije voda. Brzo se razgrađuju na suncu. Selektivni zemljjišni pripravak za suzbijanje manjeg broja jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u vrijeme

njihovog nicanja ili ranog posta. Ne na tlima s manje od 1,5% humusa. Zbog uskog spektra u kombinacijama s drugim djelatnim tvarima je selektivan u velikom broju kultura. Gotovo netopljiv u vodi. U proizvodnim programima u zaštiti: graška, graha i graha mahunara, kupusnjača iz prijesadnica i mrkve i peršina. Nakon primjene u krumpiru i povrću iste godine ne smiju se sijati: repa i cikla, a dopuštena je sjetva: kupusa, luka, salate, rajčice, mrkve, soje i kukuruza. Grašak, grahorica i ječam smiju se sijati 3 mjeseca nakon primjene pendimetalina na istoj površini. U slučaju propadanja usjeva dopuštena je sjetva samo kukuruza, a nakon 3 mjeseca svih ostalih kultura u kojima ova djelatna tvar ima dozvolu za uporabu.

LD₅₀ 1250. S.O. = III. K - 42 dana rajčica; 63 dana kukuruz za silažu, luk, krumpir, paprika i kupus; OVP ostalo.

1.24. Benzamidi

(engl. Benzamide)

Benzamidi imaju isti mehanizam djelovanja kao i herbicidi iz grupe dinitroanilina, odnosno i oni se kod osjetljivih biljaka vežu za tubulin, glavni mikrotubularni protein, gdje formiraju herbicid-tubulin kompleks koji inhibira obrazovanje mikrotubulina, uslijed čega dolazi do onemogućavanja odvajanja kromatida kromosoma u toku mitoze, a time i spriječavanja diobe stanica, zbog čega su benzamidi razvrstani u **HRAC grupu K1**.

Jedini predstavnik ove grupe je propizamid koji se apsorbira korijenom i prenosi u nadzemne dijelove biljke provodnim sustavima ksilema. Aktivan je kada se primjeni preko zemljišta, a folijarnu aktivnost pokazuje samo na nekim korovnim vrstama. Kada se apsorbira listom translokacija je svedena na najmanju moguću mjeru. Izaziva zaustavljanje rasta korijena širokolistnih ili čvora busanja travnih korova.

1.24.1. Propizamid

Djelatna tvar izaziva zaustavljanje rasta korijena širokolistnih ili čvora busanja travnih korova. Učinkovit u suzbijanju viline kose - *Cuscuta spp.* Zemljšni herbicid za čiju učinkovitost je neophodan veći sadržaj vlage u tlu i niže temperature. Visoko selektivan za lucernu, neovisno o njenoj starosti i tipu tla. Neučinkovit na korove iz fam.: Compositae, Cruciferae, Leguminosae i Liliaceae. Usvaja se većinom preko korijena. Inhibira diobu stanica.

LD₅₀ 8300. S.O. = III.

1.25. Kloracetamidi

(engl. Chloroacetamide)

Kloracetamidi kod osjetljivih biljaka inhibiraju obrazovanje mikrotubulina, uslijed čega dolazi do onemogućavanja odvajanja kromatida kromosoma u toku mitoze, a time i spriječavanja diobe stanica, zbog čega su razvrstani u **HRAC grupu K3**.

Kloracetamidi su nešto starija, ali vrlo značajna skupina herbicida sa širokim područjem primjene za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova. Herbicide iz ove skupine primjenjujemo nakon sjetve, a prije nicanja. Biljka ih usvaja preko korijena u vodi i preko hipokotila. Do danas

nije u potpunosti razjašnjen mehanizam njihovog djelovanja, ali se zna da utječu na biosintezu masnih kiselina i staničnu membranu, zbog čega priječe razvoj klijanca pa se kod osjetljivih biljaka razvija abnormalna stabljika koja ne može isklijati. Neki od herbicida iz ove grupe su učinkoviti ako ih primijenimo sve do faze dva lista korovnih trava.

Herbicidi iz ove grupe imaju široko područje primjene. Tako se acetoklor, S-metolaklor i propizaklor koriste za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolistnih korova u kukuruzu, soji, suncokretu, šećernoj repi i duhanu, dok su dimetaklor i metazaklor koriste u uljanoj repici i kupusnjačama. U tlu se u aktivnom obliku zadrže nekoliko tjedana pa do tri mjeseca. Odlično suzbijaju jednogodišnje travne i neke širokolistne korove. Herbicidi iz ove grupe izazivaju zaustavljanje rasta korijena kod širokolistnih korova ili čvora busanja kod travnih korova. Radi proširenja spektra i na širokolistne korove, redovito se rabe u kombinaciji s drugim na ovu skupinu korova učinkovitim herbicidima.

1.25.1. Dimetaklor

Djelatna tvar izaziva zaustavljanje rasta čvora busanja trava. Pripravak namijenjen suzbijanju važnijih korova u usjevu uljane repice: slakoperka, koštan, ljuljevi, mišji repak, a od širokolistnih: kamilica, mrtva kopriva, mišjakinja, jarmna, čestoslavica... Sjeme mora biti prekriveno slojem zemlje barem 2 cm. Najbolje djelovanje na korove se postiže kada su u nicanju ili prvom paru pravih listova.

K-OVP.

1.25.2. S-dimetenamid (dimetanamid-P)

S-dimetenamid se rabi za suzbijanje travnih i pojedinih širokolistnih korova.

Primjenjuje se nakon sjetve, ali i neposredno nakon nicanja usjeva i korova. Najčešće se rabi u kombinaciji s drugim djelatnim tvarima. Vrlo dobri rezultati dobiveni i inkorporacijom dimetenamida odmah nakon prskanja.

LD₅₀ 2007. S.O. = III. K - OVP.

1.25.3. Metazaklor

Metazaklor je zemljjišni herbicid djelotvoran na širokolistne i neke uskolistne korove.

Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja repice i korova. Izaziva zaustavljanje rasta čvora busanja trava. Moguće ga je primijeniti i u vegetaciji, ali vrlo rano i po mogućnosti pred kišu koja će djelatnu tvar spustiti u zonu klijanja korova. Visoko selektivan za usjev (dobro pripremiti tlo tako da sjeme uljane repice bude prekriveno slojem zemlje).

S.O. = III. LD₅₀ 2150.

1.25.4. S-metolaklor

S-metolaklor je zemljjišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih sjemenskih uskolistnih i pojedinih širokolistnih korova. Najčešće se rabi poslije sjetve, a prije nicanja uzgajane biljke i u kombinacijama s drugim djelatnim tvarima. Izaziva zaustavljanje rasta čvora busanja trava. Na lakšim i humusom siromašnjim tlima rabe se niže doze.

LD₅₀ 2780. S.O. = III.

1.25.5. Petoksamid

Petoksamid je selektivni herbicid namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih sjemenskih uskolistih i pojedinih širokolistih korova u usjevu kukuruza. Za suzbijanje ukupnog spektra korova rabi se u kombinacijama s triazinskim pripravcima.

K-OVP.

1.26. Acetamidi

(engl. Acetamide)

Acetamidi imaju isti mehanizam djelovanja kao i herbicidi iz grupe kloracetamida i oksiacetamida, odnosno i oni se kod osjetljivih biljaka inhibiraju obrazovanja mikrotubulina, uslijed čega dolazi do onemogućavanja odvajanja kromatida kromosoma u toku mitoze, a time i sprječavanja diobe stanica, zbog čega su razvrstani u **HRAC grupu K3**.

Jedini predstavnik ove grupe je selektivni herbicid napropamid koji je perzistentan i koristi se za suzbijanje velikog broja širokolistih i uskolistih korova u većem broju kultura (pa je i mogućnost štete od rezidua veća), zbog čega poslije primjene napropamida treba voditi računa o odabiru naredne kulture u plodosmjeni. Napropamid se vrlo brzo apsorbira korijenom, zbog čega su biljke prema njemu osjetljive samo u fazi nicanja. Primarno izaziva zaustavljanje rasta korijena kod širokolistih ili čvora busanja kod travnih korova.

1.26.1. Napropamid

Napropamid je selektivni zemljišni herbicid koji se koristi za suzbijanje velikog broja širokolistih i uskolistih korova u nicanju u većem broju kultura. U usjevu kupusnjača se rabi samo kod uzgoja iz prijesadnica, a kod rajčice i paprike iz sjemena i prijesadnica. Rabi se i u voćnjacima i vinogradima starijim od godinu dana (jabuka, kruška, breskva, nektarina, marelica, šljiva, trešnja, višnja, agrumi i drugi nasadi). Djetalna tvar izaziva zaustavljanje rasta korijena kod širokolistih ili čvora busanja kod travnih korova. Folijarna apsorpcija mu je slaba. Na suncu se 50 % djelatne tvari razgradi za 4 dana te ga je potrebno inkorporirati u tlo prije sjetve ili sadnje. Veliki sadržaj organske tvari u tlu značajno smanjuje učinkovitost. Perzistentan je i primjenjiv u većem broju kultura (pa je i mogućnost štete od rezidua veća), zbog čega treba voditi računa o odabiru naredne kulture u plodosmjeni. Na proljeće prve godine nakon primjene na tretiranoj površini smiju se užgajati: suncokret, grah, grašak, paprika, duhan, rajčica, krumpir i kupusnjače. Godinu dana nakon primjene na istoj površini dopušteno je sijati: strne žitarice (osim zobi), kukuruz, sirak, šećernu i stočnu repu i salatu. Sjetva zobi dopuštena je tek nakon 16 mjeseci od primjene napopamida.

LD₅₀ 4640. S.O. = III.

1.27. Oksiacetamidi

(engl. Oxyacetamide)

Oksiacetamidi imaju isti mehanizam djelovanja kao i herbicidi iz grupe kloracetamida i acetamida, odnosno i oni se kod osjetljivih biljaka inhibiraju obrazovanje mikro-tubulina, uslijed čega dolazi do onemogućavanja odvajanja kromatida kromosoma u toku mitoze, a time i spriječavanja diobe stanica, zbog čega su razvrstani u **HRAC grupu K3**.

Jedini predstavnik ove grupe je selektivni herbicid flufenacet koji je namijenjen suzbijanju uskolistih i nekoliko raširenih širokolistih korova u usjevu krumpira, soje i kukuruza. Koristi se poslije sjetve, a prije nicanja usjeva i (ili) u ranom post-em. Vrlo je povoljnih ekoloških i toksikoloških osobina. Primarno izaziva zaustavljanje rasta korijena kod širokolistih ili čvora busanja kod travnih korova.

1.27.1. Flufenacet

Djelatna tvar izaziva zaustavljanje rasta čvora busanja kod travnih i rasta korijena kod širokolistih korova. Djeluje kao inhibitor dijeljenja stanica. Vrlo je povoljnih ekoloških i toksikoloških osobina, a i koristi se u nižim dozama u odnosu na standarde. Djelotvoran u suzbijanju uskolistih i nekoliko raširenih širokolistih korova u pre i (ili) ranom post-em.

Posebno učinkovit na Sorghum halepense iz sjemena.

Nastao u Bayer-u 1988. godine. Na tržištu se nalazi uglavnom u kombinaciji s drugim djelatnim tvarima radi proširenja spektra i za suzbijanje širokolistih korova.

LD₅₀ 589 - 1617. S.O. = III. K - OVP.

Pripravak: Plateen WG 41,5

1.28. Tiokarbamatni

(engl. Thiocarbamate)

Herbicidi iz grupe tiokarbamatata kod osjetljivih biljaka inhibiraju sintezu lipida neophodnih za izgradnju stanične membrane, pri čemu ne inhibiraju enzim acetilkoenzim A karboksilazu (ACCase), uslijed čega dolazi do narušavanja sklada u razvoju i normalnim funkcijama unutar biljke, zbog čega su tiokarbamatni razvrstani u **HRAC grupu N**.

Jedini predstavnik ove skupine je prosulfokarb - selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolistih i nekih uskolistih korova u usjevu pšenice. Biljka ga apsorbira putem lista i korijena zbog čega se primjenjuje neposredno nakon sjetve ili najkasnije do stadija 3 lista pšenice. U osjetljivim biljkama prosulfokarb se nakuplja u meristemu uslijed čega dolazi do inhibicije njihovog porasta.

1.28.1. Prosulfokarb

Suzbijja jednogodišnje širokolisne i neke travne korove. Primjenjuje se neposredno nakon sjetve ili najkasnije do stadija 3 lista pšenice. Biljka ga apsorbira putem korijena. Nakuplja se u meristemu i zaustavlja rast. Kod plića položenog sjemena pšenice može prolazno zaustaviti razvoj pšenice.

LD₅₀ 1960. O - III. T - 0,1 pšenica.

1.29. Benzofuran

(engl. Benzofuran)

Benzofurani imaju isti mehanizam djelovanja kao i herbicidi iz grupe **karbamata**, odnosno i oni kod osjetljivih biljaka inhibiraju sintezu lipida neophodnih za izgradnju stanične membrane, pri čemu ne inhibiraju enzim acetilkoenzim A karboksilazu (ACCase), uslijed čega dolazi do narušavanja sklada u razvoju i normalnim funkcijama unutar biljke, zbog čega su i oni razvrstani u **HRAC grupu N**.

Jedini predstavnik ove skupine je etofumesat - zemljjišni kontaktni i rezidualni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usjevu šećerne i stočne repe. U biljku ulazi preko korijena, koleoptile, hipokotila i preko lista odakle se translocira u sve nadzemne organe. Perzistentnost ovisi o primjenjenoj dozi (6 do 10 mjeseci). Rabi se sam ili u kombinaciji sa fenmedifamom i desmedifamom.

1.29.1. Etofumesat

Etofumesat je zemljjišni kontaktni i rezidualni herbicid namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usjevu šećerne i stočne repe. Primarno se usvaja korijenom kod širokolisnih i koleoptilom kod uskolisnih korova. Rabi se sam ili u kombinaciji s drugim djelatnim tvarima. Fitotoksične pojave mogu nastati kod visokih doza primjene i pri temperaturama višim od 20°C, zbog čega ga ne treba koristiti na tlima s više od 5% humusa kao i pri jakom suncu. Na laksim tlima rabi se u nižim dozama. Na tretiranim površinama može se sijati samo šećerna repa. Ako se rabi u maksimalnim dozama pšenica se ne smije sijati ni iduće godine zbog perzistentnosti.

LD₅₀ 1200. S.O. = III.

1.30. Derivati fenoksi-karboksilnih kiselina

(engl. Phenoxy-carboxylic-acid)

Herbicidi iz grupe derivata fenoksi-karboksilnih kiselina kod osjetljivih biljaka djeluju kao indol octena kiselina, odnosno slično biljnim hormonima auksinima („sintetički auksini”), uslijed čega dolazi do stimulacije i nenormalne diobe stanica, što za posljedicu kod osjetljive biljke kao i njenih organa pokazuje simptome slične simptomima koje izazivaju auksini, a oni uključuju pojavu enacija, uvijanja stabla i peteljki, izduživanje i kovrčanje lišća te pojavu drugih deformacija, poslije čega se pojavljuje klorozna u točkama rasta, inhibicija rasta, uvenuće i nekroza, što sve zajedno na kraju dovodi do ugibanja osjetljive biljke. Na osnovu navedenog

mehanizma djelovanja **derivati fenoksi-karboksilnih kiselina** su razvrstani u **HRAC grupu O**.

Derivati fenoksi-karboksilnih kiselina su stara, jeftina i još uvijek vrlo značajna skupina herbicida koja se odlikuje dobrom efikasnošću za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolistnih korova. Još ih nazivamo i hormonskim herbicidima jer im je djelovanje u biljci slično biljnim hormonima auksinima. Primarno djelovanje ovih herbicida se pokazuje u vidu promjene propustljivosti staničnih membrana i promjenama u metabolizmu nukleinskih kiselina. Isto tako, ovi herbicidi zakiseljavaju staničnu membranu i stimuliraju aktivnost u membranama vezane ATP-aze. Redukcijom u apoplazmi snižena pH inducira elongaciju stanica izazvanu povećanjem aktivnosti nekih enzima odgovornih za funkciranje staničnih membrana. Niske koncentracije ovih herbicida također stimuliraju aktivnost RNK polimeraze uslijed čega dolazi do povećane biosinteze RNK, DNK i proteina. Abnormalno povećanje ovih procesa dovodi do nekontrolirane diobe stanica i rasta, kao i destrukcije staničnih tkiva. Nasuprot tome, visoke koncentracije ovih herbicida inhibiraju diobu stanica i rast, pri čemu se obično u meristemskim djelovima biljke akumuliraju fotosintetski asimilati i herbicidi iz floema. Također, herbicidi iz ove grupe stimuliraju izlučivanje etilena što u mnogim slučajevima dovodi do pojave karakterističnih simptoma tipa epinastija. Osjetljive biljke obično ugibaju za 3-5 tjedana.

Derivate fenoksi-karboksilnih kiselinabiljka prvenstveno usvaja preko lista, ali i preko korijena. Oni su izraziti sistemici te se sokovima premještaju u sve dijelove biljke. Djelotvorni su samo na jednogodišnje i višegodišnje širokolistne korove.

Glavno područje primjene su im strne žitarice, kukuruz te livade i pašnjaci. U tlu nisu perzistentni pa se unutar nekoliko tjedana do 3 mjeseca potpuno razgrade. Mogu izazivati velike ekonomski štete ako se primijene prije ili poslije propisanog roka na strnim žitaricama i kukuruzu, kao i zanošenjem škropiva na druge osjetljive širokolistne kulture (suncokret, šećerna repa, voćnjaci i vinogradi). Na osnovi herbicida iz ove skupine registriran je veći broj pripravaka, kao i veći broj različitih kombinacija pripravaka.

1.30.1. 2,4-D

2,4-D je selektivni translokacijski pripravak za suzbijanje nekih jednogodišnjih i višegodišnjih širokolistnih korova u usjevima žitarica, kukuruza, livadama i pašnjacima. Kao esteri manje su topljivi, ali i postojaniji u okolišu. Razgradnja se odvija mikrobiološkim putem. Ne koristiti u usjevu pšenice i ječma nakon busanja, jer se javljaju deformacije na klasu i klasićima. Velika je opasnost za susjedne kulture zbog zanošenja vjetrom. Ne ide u usjeve zobi i pšenoraži. Poseban oprez kada je u formi estera!

LD₅₀ 300-666. S.O. = III.

1.30.2. Diklorprop-P = 2,4 DP-P

Djelatna tvar izaziva poremećaj ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i dijeljene stanice, sintezu bjelančevina i disanje. Folijarni translokacijski pripravak za suzbijanje nekih širokolistnih korova od početka busanja do početka vlatanja u žitaricama. Rabiti kada su temperature više od 50 C. Većinom u kombinaciji s drugim djelatnim tvarima.

LD₅₀ 800. S.O. = III. K - OVP za žitarice.

1.30.3. MCPA

Djelatna tvar izaziva poremećaj ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i dijeljene stanice, sintezu bjelanjčevina i disanje. Selektivni translokacijski pripravak za suzbijanja nekih širokolistnih korova u žitaricama, livadama i pašnjacima. Primjenjuje se tijekom busanja.

LD₅₀ 700-800. S.O. = III. K - strne žitarice OVP.

Pripravak: Optica trio.

1.31. Derivati benzojeve kiseline

(engl. Benzoic acid)

Derivati benzojeve kiseline imaju isti mehanizam djelovanja kao i herbicidi iz grupe derivata fenoksi-karbonskih kiselina i derivata piridin karboksilne kiseline, odnosno i oni kod osjetljivih biljaka djeluju kao indol octena kiselina, tj. slično biljnim hormonima auksinima (“sintetički auksini”), uslijed čega dolazi do stimulacije i nenormalne diobe stanica, što za posljedicu kod osjetljive biljke pokazuje simptome slične simptomima koje izazivaju auksini, što sve zajedno na kraju dovodi do ugibanja osjetljive biljke. Na osnovu navedenog mehanizma djelovanja **derivati benzojeve kiseline** su razvrstani u **HRAC grupu O**.

Jedini predstavnik ove skupine je dikamba - **selektivni** sistemični translokacijski herbicid namijenjen za suzbijanje širokolistnih korova u usjevu kukuruza i strnih žitarica, kao i na livadama, pašnjacima i strništima. Dikamba se apsorbira lišćem, korijenom i stabljikom biljaka, odakle se transportira i ksilemom i floemom te akumulira u dijelovima biljke koji rastu, zbog čega se primjenjuje nakon nicanja korova. Translokacija je sporija kod trava nego kod drugih tolerantnih biljnih vrsta. Razlika u brzini transporta povezana je sa razlikama u osjetljivosti pojedinih biljnih vrsta. Na tržištu se nalazi veći broj pripravaka na bazi ove djelatne tvari, ali i u kombinaciji s drugim djelatnim tvarima radi proširenja spektra njenog djelovanja.

1.31.1. Dikamba

Dikamba je selektivni translokacijski herbicid namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolistnih korova u usjevu žitarica, kukuruza (od 3-5 listova) i na strništima. Širokog je spektra djelovanja. Posebno učinkovit na slak. Preko lista se premješta u sve dijelove biljke. Većinom je prisutan u složenim pripravcima. Na korovima izaziva pojavu deformacija pojedinih dijelova ili cijele biljke (uvijanja), pri čemu nakon desetaka dana dolazi do odumiranja osjetljive biljke.

LD₅₀ 1040-2900. S.O. = III.

1.32. Derivati piridin karboksilne kiseline

(engl. Pyridine carboxylic acid)

Derivati piridin karboksilne kiseline imaju isti mehanizam djelovanja kao i herbicidi iz grupe derivata fenoksi-karbonskih kiselina i derivata benzojeve kiseline, odnosno i oni kod osjetljivih biljaka djeluju kao indol octena kiselina, tj. slično biljnim hormonima auksinima („sintetički auksini”), uslijed čega dolazi do stimulacije i nenormalne diobe stanica, što za posljedicu kod

osjetljive biljke pokazuje simptome slične simptomima koje izazivaju auksini, što sve zajedno na kraju dovodi do ugibanja osjetljive biljke.

Na osnovu navedenog mehanizma djelovanja derivati piridin karboksilne kiseline su razvrstani u **HRAC grupu O**.

Derivati piridin karboksilne kiseline su relativno starija skupina sistemičnih translokacijskih herbicida namijenjenih za suzbijanje širokolistnih korova u usjevu strnih žitarica i kukuruza, kao i na livadama i pašnjacima, ali i kao herbicidi za suzbijanje drvenastih korova (naročito pikloram). Primjenjujemo ih nakon nicanja korova (preko lista). Fluroksipir se primjenjuje kao ester-fluroksipir metil koji se odmah poslije folijarne apsorpcije hidrolizira do izvorne kiseline (fluroksipira) koja tek tada pokazuje herbicidnu aktivnost izazivajući karakteristične simptome kao herbicidi auksinskog tipa. Perzistentnost u tlu većine herbicida iz ove skupine je relativno kratka, dok je pikloram vrlo perzistentan. Ispisu se u dublje slojeve te mogu zagaditi podzemne vode. Klopiralid je relativno perzistentan u biljci. Na tržištu se nalazi veći broj pripravaka na bazi ovih djelatnih tvari, ali i u kombinaciji s drugim djelatnim tvarima radi proširenja spektra njihovog djelovanja.

1.32.1. Fluroksipir

Pripravci na bazi fluroksipira namijenjeni su za suzbijanje većeg broja širokolistnih korova u usjevu strnih žitarica (*Galium aparine*) i kukuruza (*Abutilon theophrasti*), voćnjacima (*Convolvulus sp.*, *Rubus sp.*, ...), usjevu luka te pašnjacima i livadama (*Lamium sp.*, *Taraxacum officinale*). Fluroksipir se sat vremena nakon prskanja u cijelosti apsorbira u biljci, poslije čega nema opasnosti od ispiranja. K-63 žitarice, kukuruz i jezg. voće; 21 livade i pašnjaci za ispašu i košnju. Slamu ne koristiti za kompost namijenjen povrću.

LD₅₀ 2405. S.O. = III.

1.32.2. Klopiralid

Pripravci na bazi klopiralida su namijenjeni suzbijanju širokolistnih korova u usjevima kukuruza, strnih žita, šećerne repe, uljane repice i luka. Najčešće se rabi samostalno ili u kombinaciji s drugim pripravcima (šećerna repa, kukuruz) ili drugim djelatnim tvarima (pšenica). Najbolji učinak u suzbijanju korova postiže se kada su korovi u fazi od 2-6 listova. Kukuruz u vrijeme prskanja treba biti u fazi 2-5 listova, a pšenica i ječam od sredine busanja do konca vlatanja. U šećernoj repi se primjenjuje od kotiledona do pred sklapanje redova (2-3 x). U uljanoj repici se primjenjuje od 2 prava lista do pojave rozete. U programu Herbosa se koristi za zaštitu kupusnjača (iz sjemena od 2-6 listova i prijesadnica u rozeti) i luka (iz sjemena 3-4 lista i lučica 2-4 lista). U plodosmjeni ne sijati: lucernu, salatu, grašak (16 mjeseci) i mrkvu zbog izvanredno visoke osjetljivosti na ostatke u tlu. Ne rabiti slamu za proizvodnju komposta za povrtnice. Nakon primjene 2-3 tjedna ne ulaziti u okopavanja ili kultivacije.

LD₅₀ 4300. S.O. = III.

1.32.3. Pikloram

Djelatna tvar izaziva poremećaj ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i dijeljenje stanice, sintezu bjelančevina i disanje. Pripravak za suzbijanje poludrvenastih i drvenastih te jednogodišnjih i višegodišnjih širokolistnih korova. Vrlo brzo se usvaja (listom i korijenom), translocira i akumulira u meristemskim tkivima. Opasnost od zanošenja! Učinkovit u suzbijanju više od 200 vrsta. Primijeniti u vrijeme najintenzivnijeg razvoja drvenastih korovnih vrsta. Do sušenja drvenastih biljaka dolazi za 3 mjeseca.

LD_{50} 8200. S.O. = III. Trava s prskanih površina ne smije se koristiti za ishranu mlijecnih životinja. Ispaša zabranjena 42 dana. U tlu postojan te se u sljedećih 18 mjeseci od primjene ne smije uzgajati ni jedna kultura.

1.33. Triazoli

1.33.1. Amitrol

Sistemični neselektivni herbicid koji biljka usvaja listom i korijenom. Suzbija veliki broj jednogodišnjih i višegodišnjih korova u voćkama i vinovoj lozi.

Aktivna tvar amitrol više nije odobrena na razini EU.

$LD_{50}>5000$

1.34. Različitog kemijskog podrijetla

1.34.1. Aminopiralid

Aminopiralid je novi herbicid koji se koristi za suzbijanje širokolistnih korova (kamilica, broćika, mišjakinja, samonikli suncokret, slak, osjak i dr.) u usjevu jare i ozime pšenice te jarog i ozimog ječma.

$LD_{50}>5000$. S.O. = izvan skupine otrova.

Pripravak: Lancelot 450 WG.

1.34.2. Flurokloridon

Flurokloridon je kontaktni zemljjišni herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolistnih i nekih uskolisnih korova u usjevima kukuruza, suncokreta i krumpira. Dobre je selektivnosti i dugotrajnog djelovanja. Djelatna tvar izaziva inhibiciju enzima fiton desaturaze (PDS) odgovornog za sintezu karotenoida. Bez karotenoida, koja ima zaštitnu ulogu, molekula klorofila se vrlo brzo razgradi te su novi listovi svijetlo žute ili bijele boje. Primjenjuje se kao pre-em. herbicid u kombinaciji s drugim djelatnim tvarima radi većeg djelovanja na prisutnu korovnu floru. Dozu prilagoditi sadržaju humusa. Ne treba ga koristiti na tlima s manje od 1,5% humusa. Optimalno vrijeme primjene: prije nicanja. Nakon uporabe izbjegavati sjetu uljane repice na tretiranoj površini.

LD_{50} 1980. S.O. = III. K - 63 krumpir i silažni kukuruz, suncokret i kukuruz za zrno OVP.

2. FUNGICIDI

A) ORGANSKI FUNGICIDI

2.1. Acilanini

(engl. Acylalanines)

Fungicidi iz ove grupe inhibiraju aktivnost enzima RNK polimeraze I što dovodi do zaustavljanja sinteze nukleinskih kiselina kod fitopatogenih gljiva, na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu A1**. Sistemični su fungicidi s protektivnim i kurativnim djelovanjem. Apsorbiraju se putem lišća, stabljične (stabla) i korijena. Koriste se za suzbijanje velikog broja patogena iz razreda Oomycota. Imaju visok rizik za razvoj rezistentnosti, zbog čega se formuliraju i koriste u kombinaciji s protektivnim fungicidima.

2.1.1. Benalaksil

Fungicid za suzbijanje uzročnika plamenjače vinove loze, krumpira, rajčice, luka i krastavaca (samo u polju).

LD₅₀ - 4200. S.O. - III.

2.1.2. Metalaksil-M

Sve kombinacije koriste se za suzbijanje uzročnika plamenjače vinove loze. Kombinacija s bakrom koristi se za suzbijanje uzročnika plamenjače hmelja, soje, duhana, krumpira, rajčice, kupusa, krastavca i luka, a kombinacija s mankozebom protiv uzročnika plamenjače duhana, soje, šećerne repe, krumpira i rajčice.

LD₅₀ 1438. S.O. - III.

2.1.2.a) Za tretiranje sjemena

Koristi se za zaštitu sjemena kukuruza od uzročnika fuzarioza, polijeganja nasada i drugih bolesti. Lako se i ravnomjerno nanosi na sjeme.

K - OVP.

2.2. Hidroksi-2-amino-pirimidini

(engl. Hydroxy-(2-amino-) pyrimidines)

Fungicidi iz ove grupe inhibiraju aktivnost enzima adenozin-deaminaze što dovodi do zaustavljanja sinteze nukleinskih kiselina kod osjetljivih fitopatogenih gljiva, na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu A2**. Sistemični su fungicidi s protektivnim i kurativnim djelovanjem. Apsorbiraju se lišćem, a u biljci se transportiraju ksilemom i imaju translaminarno djelovanje. Imaju srednji rizik za razvoj rezistentnosti.

2.2.1. Bupirimat

Bupirimat je djelatna tvar prikladna za korištenje u integriranim programima zaštite bilja. Koristi se preventivno i kurativno za suzbijanje uzročnika pepelnice.

LD₅₀ - 4000. S.O. - III.

2.3. Benzimidazoli

(eng. Benzimidazoles)

Djeluju na veliki broj gljiva. Fungicidi iz ove skupine akropetalni su sistemici sa bazipetalnim kretanjem samo kod zeljastih biljaka. Kod nekih gljiva utvrđena je pojava rezistentnosti.

2.3.1. Tiofanat-metil

Sistemični fungicid namijenjen za suzbijanje uzročnika bolesti pšenice i ječma: Blumeria (Erysiphe) graminis, Fusarium spp., Pseudocercospora spp., Puccinia spp., Rhynchosporium secalis, Septoria tritici i Pyrenophora teres, kao i uzročnika bolesti šećerne repe: Cercospora beticola.

LD₅₀ - 6640-7500. S.O. - III.

2.3.2. Tiabendazol

2.4. Toluamidi

(engl. Toluamides)

Fungicidi iz ove grupe inhibiraju obrazovanje β-tubulina u toku mitoze i na toj osnovi zaustavljaju normalnu diobu stanica kod fitopatogenih gljiva, na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu B3**. Kontaktne su fungicidi s preventivnim djelovanjem. Imaju mali do srednji rizik za razvoj rezistentnosti.

2.4.1. Zoksamid

Zoksamid je kontaktni fungicid namijenjen za preventivnu zaštitu od uzročnika plamenjače rajčice i vinove loze, kao i koncentrične pjegavosti rajčice.

LD₅₀ > 5000. S.O. - III.

2.5. Piridinilmetil-benzamidi

(engl. Pyridinylmethyl-benzamides)

Fungicidi iz ove grupe utječu na delokalizaciju specifičnih proteina što dovodi do zaustavljanja mitoze i diobe stanica kod osjetljivih fitopatogenih gljiva, na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu B5**. Karakterizira ih preventivno djelovanje. Rezistentnost prema ovim fungicidima nije poznata.

2.5.1. Fluopikolid

2.6. Piridinil etilbenzamidi

(engl. Pyridinyl ethylbenzamides)

Inhibiraju aktivnost enzima sukcinat dehidrogenaze. Jedini predstavnik ove skupine je fluopiram.

2.6.1. Fluopiram

Odlikuje ga novi mehanizam djelovanja protiv fitopatogene gljive Botrytis cinerea.

Kontaktno-sistemični fungicid s preventivnim djelovanjem. Najčešće dolazi u kombinacijama.

$LD_{50} > 2000$. S.O. – III

2.7. Oksatin karboksamidi

(engl. Oxathiin carboxamides)

Fungicidi iz ove grupe inhibiraju aktivnost enzima sukcinat-dehidrogenaze čime ometaju protok elektrona u respiratornom lancu (kompleks II), što dovodi do zaustavljanja disanja kod osjetljivih fitopatogenih gljiva, na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu C2**. Sistemični su fungicidi. Koriste se za tretiranje sjemena. Imaju srednji rizik za razvoj rezistentnosti.

2.7.1. Karboksin

Sistemični fungicid za tretiranje sjemena žitarica protiv uzročnika prašne i smrđljive snijeti pšenice i ječma.

$LD_{50} - 3820$. S.O. - III. K - OVP.

2.7.1.a) Za tretiranje sjemena

2.8. Piridin karboksamidi

(engl. Pyridine carboxamides)

Piridin karboksamidi imaju isti mehanizam djelovanja kao i fungicidi iz grupe oksatin karboksamida, odnosno i oni inhibiraju aktivnost enzima sukcinat-dehidrogenaze čime ometaju normalni protok elektrona u respiratornom lancu (kompleks II), što dovodi do zaustavljanja disanja kod osjetljivih fitopatogenih gljiva, na temelju čega su i oni razvrstani u **FRAC grupu C2**. Sistemični su fungicidi. Imaju srednji rizik za razvoj rezistentnosti.

2.8.1. Boskalid

Odlikuje ga novi mehanizam djelovanja protiv fitopatogene gljive Botrytis cinerea.

Kontaktno-sistemični fungicid s preventivnim djelovanjem. Najčešće dolazi u kombinacijama.

$LD_{50} > 5000$. S.O. - izvan skupine otrova.

2.9. Metoksi-akrilati (“Strobilurini”)

(engl. Methoxy-acrylates)

Fungicidi iz ove grupe inhibiraju mitohondrijalnu respiraciju (disanje) gljiva blokiranjem transporta elektrona između citokroma b i citokroma c1 (kompleks III), na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu C3**. Navedeni mehanizam djelovanja dovodi do spriječavanja klijanja spora, kao i zaustavljanja porasta micelija i sporulacije kod osjetljivih fitopatogenih gljiva, zbog čega ovi fungicidi pokazuju protektivna, eradikativna, translaminarna i sistemična svojstva. Imaju visok rizik za razvoj rezistentnosti. Postoji mogućnost za pojavu unakrsne rezistentnosti sa drugim predstavnicima unutar **FRAC grupe C3**.

2.9.1. Azoksistrobin

Pripada novijoj generaciji fungicida s potpuno drugačijim mehanizmom djelovanja u odnosu na inhibitore biosinteze ergosterola. Suzbija uzročnike najvažnijih bolesti na vinovoj lozi, raznim povrtarskim biljkama i žitaricama, kao što su: plamenjača, pepelnica, crvena palež, crna pjegavost rozgve; te plamenjača i koncentrična pjegavost krumpira i rajčice, kao i plamenjača i pepelnica krastavaca, hrđa krizantema i pepelnica, hrđa, mrežasta pjegavost i siva pjegavost lista ječma. Zaštitu provoditi isključivo preventivno.

LD₅₀ > 5000. S.O. - III.

2.10. Pirazol-karboksamidi

Uvršteni su u C2 skupinu - inhibitori sukcinat dehidrogenaze. Na našem tržištu su dostupni pripravci na bazi sljedećih aktivnih tvari: fluksapiroksad, izopirazam i benzovindiflupir.

2.10.1. Fluksapiroksad

Aktivna tvar koja u Hrvatskoj ima dozvolu za tretiranje sjemena žitarica. Budući da je iz skupine inhibitora sukcinat dehidrogenaze, zbog cross-rezistentnosti s drugim aktivnim tvarima iz ove skupine potrebno je izbjegavati njihovu primjenu tijekom vegetacije ukoliko je sjeme tretirano pripravkom na bazi fluksapiroksada.

K - OVP.

2.10.2. Izopirazam

Izopirazam je preventivni fungicid koji djeluje na klijanje spora, inhibiciju rasta klične cijevi te sprečavanje prodiranja hife u biljno tkivo. Ima dozvolu za suzbijanje pepelnice na povrtnicama u zaštićenim prostorima.

2.10.3. Benzovindiflupir

2.11. Metoksi-karbamati (“Strobilurini”)

(engl. Methoxy-carbamates)

Metoksi-karbamati imaju isti mehanizam djelovanja kao i fungicidi iz grupe metoksi-akrilata, oksimino actata i oksimino-acetamida (“strobilurina”), kao i iz grupe oksazolidindiona i imidazolinona, odnosno i oni inhibiraju mitohondrijalnu respiraciju (disanje) gljiva blokiranjem transporta elektrona između citokroma b i citokroma c1 (kompleks III), na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu C3**. Navedeni mehanizam djelovanja dovodi do spriječavanja klijanja spora, kao i zaustavljanja porasta micelija i sporulacije kod osjetljivih fitopatogenih gljiva, zbog čega ovi fungicidi pokazuju protektivna, eradikativna, translaminarna i sistemična svojstva. Imaju visok rizik za razvoj rezistentnosti. Postoji mogućnost za pojavu unakrsne rezistentnosti sa drugim predstavnicima unutar **FRAC grupe C3**.

2.11.1. Piraklostrobin

LD₅₀ > 5000. S.O. - III. K - 42 dana vinova loza, ječam, 35 dana šećerna repa, 7-14 dana jabuka.

2.12. Oksimino acetati (“Strobilurini”)

(engl. Oximino acetates)

Oksimino acetati imaju isti mehanizam djelovanja kao i fungicidi iz grupe metoksiakrilata, metoksi-karbamata i oksimino-acetamida (“strobilurina”), kao i iz grupe oksazolidindiona i imidazolinona, odnosno i oni inhibiraju mitohondrijalnu respiraciju (disanje) gljiva blokiranjem transporta elektrona između citokroma b i citokroma c1 (kompleks III), na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu C3**. Navedeni mehanizam djelovanja dovodi do spriječavanje klijanja spora, kao i zaustavljanja porasta micelija i sporulacije kod osjetljivih fitopatogenih gljiva, zbog čega ovi fungicidi pokazuju protektivna, eradikativna, translaminarna i sistemična svojstva. Imaju visok rizik za razvoj rezistentnosti. Postoji mogućnost za pojavu unakrsne rezistentnosti sa drugim predstavnicima unutar **FRAC grupe C3**.

2.12.1. Krezoksim-metil

Djelatna tvar slična prirodnom strobilurinu - fungitoksičnoj izlučevini gljivice Strobilurus tenaceus. Registriran je za suzbijanje uzročnika čađave krastavosti plodova i pepelnice jabuke te pepelnice na vinovoj lozi.

LD₅₀ - 5000. S.O. - III.

2.12.2. Trifloksistrobin

Koristi se za suzbijanje uzročnika čađave krastavosti i pepelnice jabuke, pepelnice i plamenjače vinove loze, pjegavosti lista šećerne repe i drugih bolesti. U vinovoj lozi se primjenjuje od završetka cvatnje do formiranja bobica veličine zrna graška. Ne više od 4 prskanja tijekom vegetacije kako bi se izbjegla rana pojava rezistentnosti. Preventivno djeluje i na pojavu bolesti na jabukama tijekom skladištenja.

LD₅₀ - 2000. S.O. - III.

2.13. Oksimino-acetamidi (“Strobilurini”)

(engl. Oximino-acetamides)

Oksimino-acetamidi imaju isti mehanizam djelovanja kao i fungicidi iz grupe metoksikarbamata, metoksi-akrilata i oksimino actata (“strobilurina”), kao i iz grupe oksazolidindiona i imidazolinona, odnosno i oni inhibiraju mitohondrijalnu respiraciju (disanje) gljiva blokiranjem transporta elektrona između citokroma b i citokroma c1 (kompleks III), na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu C3**. Navedeni mehanizam djelovanja dovodi do spriječavanje klijanja spora, kao i zaustavljanja porasta micelija i sporulacije kod osjetljivih fitopatogenih gljiva, zbog čega ovi fungicidi pokazuju protektivna, eradikativna, translaminarna i sistemična svojstva. Imaju visok rizik za razvoj rezistentnosti. Postoji mogućnost za pojavu unakrsne rezistentnosti sa drugim predstavnicima unutar **FRAC grupe C3**.

2.13.1. Dimoksistrobin

S.O.- III.

Pripravak: Pictor.

2.14. Oksazolidindioni

(engl. Oxazolidinediones)

Oksazolidindioni imaju isti mehanizam djelovanja kao i fungicidi iz grupe metoksiakrilata, metoksi-karbamata, oksimino actata i oksimino-acetamida (“strobilurina”), kao i iz grupe imidazolinona, odnosno i oni inhibiraju mitohondrijalnu respiraciju (disanje) gljiva blokiranjem transporta elektrona između citokroma b i citokroma c1 (kompleks III), na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu C3**. Imaju visok rizik za razvoj rezistentnosti. Postoji mogućnost za pojavu unakrsne rezistentnosti sa drugim predstavnicima unutar **FRAC grupe C3**.

2.14.1. Famoksadon

U kombinaciji s cimoksanilom suzbija uzročnike plamenjače vinove loze, krumpira i rajčice.
LD₅₀ - 1333 (za pripravak). S.O. - III.

2.15. Imidazolinoni

(engl. Imidazolinones)

Imidazolinoni imaju isti mehanizam djelovanja kao i fungicidi iz grupe metoksi-akrilata, metoksi-karbamata, oksimino actata i oksimino-acetamida (“strobilurina”), kao i iz grupe oksazolidin-diona, odnosno i oni inhibiraju mitohondrijalnu respiraciju (disanje) blokiranjem transporta elektrona između citokroma b i citokroma c1 (kompleks III), na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu C3**. Imaju visok rizik za razvoj rezistentnosti. Postoji mogućnost za pojavu unakrsne rezistentnosti sa drugim predstavnicima unutar **FRAC grupe C3**.

2.15.1. Fenamidon

2.16. Cianoimidazoli

(engl. Cyanoimidazole)

Fungicidi iz ove grupe inhibiraju respiraciju (disanje) gljiva blokiranjem transporta elektrona između citokroma b i citokroma c1 (kompleks III), na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu C4**. Rezistentnost prema ovim fungicidima do sada nije poznata, ali se na temelju proučavanja model organizama smatra da u budućnosti mogu imati srednji do visok rizik.

2.16.1. Ciazofamid

Kontaktni - preventivni fungicid namijenjen za suzbijanje uzročnika plamenjače.

LD₅₀ > 5000. S.O. - III.

2.17. Sulfamoil-triazoli

Fungicidi u ovoj skupini inhibiraju respiraciju gljiva blokiranjem transporta elektrona između citokroma a i citokroma c1 (kompleks III), zbog čega su razvrstani u **FRAC grupu C4**.

2.17.1. Amisulbrom

Koristi se za suzbijanje plamenjače u vinogradarstvu i ratarstvu.

2.18. Dinitrofenil krotonati

(engl. Dinitrophenyl crotonates)

Fungicidi iz ove grupe inhibiraju mitohondrijalnu respiraciju (disanje) kod osjetljivih fitopatogenih gljiva prekidanjem oksidativne fosforilacije, na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu C5**. Kontaktni su fungicidi s protektivnim i kurativnim djelovanjem. Rezistentnost prema ovim fungicidima do sada nije poznata. Imaju i akaricidno djelovanje.

2.18.1. Meptil-dinokap

Komponenta dinokapa. Protektant s kurativnim i eradikativnim djelovanjem.

S.O. - III.

2.19. 2,6-dinitroanilini

(engl. 2,6-dinitroanilines)

2,6-dinitroanilini imaju isti mehanizam djelovanja kao i fungicidi iz grupe dinitrofenil krotonata, odnosno i oni inhibiraju mitohondrijalnu respiraciju (disanje) kod osjetljivih fitopatogenih gljiva prekidanjem oksidativne fosforilacije, na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu C5**. Djeluju preventivno, ali imaju dobru rezidualnu učinkovitost. Iskazuju slabu sistemičnu i kurativnu aktivnost. Rezistentnost prema ovim fungicidima do sada nije poznata, ali se smatra da u budućnosti mogu imati nizak rizik.

2.19.1. Fluazinam

Kontaktni fungicid, slab sistemik, ali dobrog rezidualnog djelovanja. Otporan na ispiranje kišom. Primjenjuje se na potpuno razvijenu lisnu masu krumpira.

LD₅₀ > 5000. S.O. - III.

2.20. Anilino-pirimidini

(engl. Anilino-pyrimidines)

Fungicidi iz ove grupe inhibiraju biosintezu metionina i lučenje hidrolitičkih enzima što dovodi do spriječavanja sinteze proteina kod fitopatogenih gljiva, na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu D1**. Ciprodinil je sistemični fungicid koji se poslije folijarne primjene apsorbira i transportira akropetalnim putem, sustavom provodnih žila ksilema, dok pirimetanil ima preventivno i kurativno djelovanje. Spriječavaju penetraciju i porast micelija gljiva u i na površini lista. Koriste se za suzbijanje širokog spektra fitopatogenih gljiva. U svijetu je već utvrđena pojava rezistentnosti fitopatogenih gljiva iz roda *Botrytis* i *Venturia* prema ovim fungicidima. Imaju srednji rizik za razvoj rezistentnosti.

2.20.1. Ciprodinil

Fungicid s preventivnim i kurativnim djelovanjem na uzročnika čađave krastavosti. Lokosistemik. Učinkovit i na pepelnici i *Monilia* spp. Treba ga primijeniti od faze "mišjih ušiju" do kraja cvjetanja. Djelotvoran i na niskim temperaturama, a dva sata nakon prskanja prisutan je u biljci u cijelosti i nema opasnosti od ispiranja d.t. Prikladan u integriranim programima zaštite bilja.

LD₅₀ > 2000. S.O. - III.

2.20.2. Pirimetanil

Djelatna tvar spriječava izlučivanje enzima patogenih gljiva neophodnih za proces infekcije i penetraciju kličnih cijevi u stanice domaćina. Djeluje kontaktno i translaminarno. Primjenjuje se preventivno i kurativno u suzbijanju uzročnika sive pljesni u velikom broju kultura. Jedan sat nakon prskanja sav je u biljci i nema opasnosti od ispiranja kišom.

LD₅₀ - 4150. S.O. - III.

2.21. Kinolini

(engl. Quinolines)

Fungicidi iz ove grupe inhibiraju sintezu G-proteina što dovodi do zaustavljanja prijenosa i pretvaranja signala kod fitopatogenih gljiva, na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu E1**. Imaju preventivno i sporo sistemično djelovanje s akropetalnom i bazipetalnom pokretljivošću. Djeluju i parama. Imaju srednji rizik za razvoj rezistentnosti, iako ne pokazuju unakrsnu rezistentnost s drugim skupinama fungicida.

2.21.1. Kinoksifen

Erizificid s izraženim preventivnim djelovanjem, sporog sistemičnog djelovanja. Djeluje i parama. Ne pokazuje unakrsnu rezistentnost s drugim skupinama fungicida. Primjenjuje se od kraja cvatnje do zatvaranja grozdova. Ne upotrebljavati doze koje su veće od maksimalno dopuštenih.

LD₅₀ - 2000. S.O. - III. T - 0,5.

2.22. Fenilpiroli

(engl. Phenylpyrroles)

Fungicidi iz ove grupe inhibiraju enzim MAP/histidin-kinazu spriječavajući prenošenje i pretvaranje osmotskih signala, zbog čega inhibiraju klijanje spora, a u manjem stupnju i rast infekcijske hife i micelija kod fitopatogenih gljiva, na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu E2**. Nisu sistemici. Imaju preventivno, djelomično i kurativno, te dugo rezidualno djelovanje. Imaju mali do srednji rizik za razvoj rezistentnosti.

2.22.1. Fludioksolonil

U kombinaciji s ciprobindilom koristi se za suzbijanje uzročnika sive pljesni. Fludioksolonil je fungicid s površinskim djelovanjem.

LD₅₀ - 5000. S.O. - III. T - 2.

2.22.1.a) Za tretiranje sjemena

Suzbija uzročnika smrdljive snijeti pšenice, fuzarioze pšenice, ječma i kukuruza, kao i prugavost lišća i prašnu snijet ječma.

LD₅₀ - 5000. S.O. - izvan skupine otrova.

2.23. Dikarboksimidi

(engl. Dicarboximides)

Fungicidi iz ove grupe inhibiraju enzim MAP/histidin-kinazu što dovodi do spriječavanja prijenosa i pretvaranja osmotskih signala, zbog čega spriječava klijanje spora kod fitopatogenih gljiva, na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu E3**. Kontaktne su fungicidi s preventivnim djelovanjem. Utvrđena je pojava rezistentnosti fitopatogenih gljiva iz roda Botrytis, kao i iz nekih drugih rodova fitopatogenih gljiva prema ovim fungicidima. Imaju srednji do visok rizik za razvoj rezistentnosti te ih treba vrlo pažljivo koristiti. Postoji mogućnost za pojavu unakrsne rezistentnosti sa drugim predstavnicima unutar **FRAC grupe E3**.

2.23.1. Iprodion

Učinkovit u zaštiti od *Monilia* spp. na cvatu i plodovima na marelicama, breskvama, višnjama i šljivama (*Monilia laxa*, *Monilia fructigena*), kao i od *Botrytis* spp. na jagodama, kupinama, ribizlama, vinovoj lozi, suncokretu, uljanoj repici i drugim kulturama. Spriječava razvoj: *Rhizopus* spp., *Aspergillus* spp., *Penicillium* spp., *Phoma* spp. i drugih bolesti.

LD₅₀ - 3500. S.O. = III.

2.24. Karbamati

(engl. Carbamates)

Fungicidi iz ove grupe inhibiraju propusnost staničnih membrana i sintezu masnih kiselina sprječavajući sintezu lipida i staničnih membrana kod fitopatogenih gljiva, na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu F4**. Sistemični su fungicidi s preventivnim djelovanjem. Rezistentnost prema ovim fungicidima do sada nije utvrđena, ali se smatra da u budućnosti mogu imati nizak do srednji rizik.

2.24.1. Propamokarb-hidroklorid

Uspješno suzbija fitopatogene gljive iz rodova: Pythium spp., Phytophthora spp., Plasmopara, Pseudoperonospora, Peronospora i Bremia. Za suzbijanje uzročnika plamenjače krastavaca primjenjuje se zalijevanjem nakon nicanja ili presađivanja s 200 ml 0,15% otopine po biljci. Zatim prskanjem 0,15% otopinom svakih 7-10 dana. Ne više od 3 tretiranja. Protiv uzročnika plamenjače paprike (Phytophthora capsici) se prska 0,25% otopinom i to najviše dva puta. Može se zaštita obaviti i zalijevanjem s 4 l otopine na m² ili 200 ml po biljci. Ne u proizvodnji ljutih i ranih paprika. Protiv uzročnika plamenjače gerbera (Phytophthora cryptogea) primjenjuje se prije presađivanja namakanjem 15 minuta u 0,15% otopini. Drugo tretiranje treba obaviti 2-3 dana nakon presađivanja 0,15% otopinom u količini od 250 ml po biljci. Treća mjeru provodi se 21-28 dana nakon presađivanja zalijevanjem 0,15% otopinom u dozi od 10 l po m².

Protiv Pythium spp. u nasadima tulipana treba očišćene lukovice potapati u 0,3% otopini tijekom 15-20 minuta. Preventivno se zalijeva i zemljište 1,5% otopinom pri čemu se mora obaviti inkorporacija na dubinu od 10-12 cm.

LD₅₀ - 2300. S.O. = III. Zbog visokih rezidua ne smije se koristiti u drugom povrću. Tretiranje tla dopušteno samo jedanput tijekom vegetacije. Ne miješati s mankozebom i propinebom.

2.25. Amidi karboksilne kiseline

(engl. Carboxylic acid amides)

Fungicidi iz ove grupe inhibiraju biosintezu fosfolipida što sprječava sintezu lipida i staničnih membrana kod fitopatogenih gljiva, na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu F5**. Djeluju sistemično i kurativno stanične membrane kod pojedinih patogena iz razreda Oomycota. Rezistentnost prema fungicidima iz ove grupe je primijećena kod Plasmopara viticola, dok kod Phytophthora infestans ona još nije utvrđena. Imaju mali do srednji rizik za razvoj rezistentnosti. Među pripadnicima ove grupe može se pojaviti unakrsna rezistentnost.

2.25.1. Dimetomorf (Cinnamic acid amides)

Lokal sistemik za suzbijanje uzročnika plamenjače vinove loze, krumpira i krastavca. Dimetomorf djeluje tako što ometa stvaranje opne stanica patogene gljive u svim razvojnim fazama bolesti. Ova aktivna tvar već poslije 60 minuta prodire duboko u tretirane dijelove biljke i odande se širi lokalno sistemično, čime su obuhvaćene već najranije faze bolesti, kada

simptomi još nisu vidljivi (1-2 dana). Odlikuje se vrlo snažnim djelovanjem na nastanak novih spora, čime se prekida širenje uzročnika plamenjače u vinogradu.

LD₅₀ - 2000. S.O. - III.

2.25.2. Iprovalikarb (Valinamide carbamates)

Inhibira rast klične cijevi zoospora i sporangija, rast hifa, a time i sporulaciju kod osjetljivih fitopatogenih gljiva. Zahvaljujući novoj kemijskoj strukturi prema ovoj djelatnoj tvari za sada nije utvrđena pojava rezistentnosti. Ima vrlo izraženo kretanje prema vrhu biljke putem provodnog sustava tako da pripravak dospijeva i u mlade listove koji u vrijeme prskanja još nisu bili formirani. Suzbija uzročnike plamenjače vinove loze, krumpira, rajčice i duhana. Ima izraženo preventivno i kurativno djelovanje.

LD₅₀ - 5000. S.O. = III.

2.25.3. Mandipropamid (Mandelic acid amides)

Odlikuje ga visoka djelotvornost za suzbijanje biljnih patogena iz razreda Oomycota i otpornost na ispiranje kišom. Ima jače translaminarno djelovanje od ostalih amida karboksilne kiseline. Mandipropamid se čvrsto veže na voštanu prevlaku lista i bobica i potom se postupno otpušta u tkivo bobica i lišća (LOK + FLO djelovanje).

2.26. Imidazoli

(engl. Imidazoles)

Inhibitori biosinteze ergosterola (grupa I)

Imidazoli imaju isti mehanizam djelovanja kao i fungicidi iz grupe pirimidina i triazola, odnosno i oni inhibiraju biosintezu ergosterola u staničnim membranama kod fitopatogenih gljiva, na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu G1**. Djeluju na drugom mjestu u odnosu na predstavnike inhibitora biosinteze ergosterola iz grupe II i III, budući da inhibiraju procese demetilacije u stanicama gljiva tako što blokiraju enzim C14-demetilazu(erg11/ cyp51) zbog čega dolazi do spriječavanja demetilacije spoja 24-metilen hidrolanosterola iz kojeg nastaje ergosterol. Bez njega membrane stanica i hife gljiva gube sposobnost regulacije tvari zbog čega dolazi do njihovog odumiranja. Sistemični su fungicidi s preventivnim i kurativnim djelovanjem. Pokazuju širok spektar djelovanja na mnoge fitopatogene gljive.

Imaju srednji rizik za pojavu rezistentnosti. Neke gljive su već razvile mehanizme rezistentnosti prema ovoj grupi fungicida. Među predstavnicima ove grupe može doći do pojave unakrsne rezistentnosti, dok unakrsna rezistentnost s predstavnicima grupe II i III inhibitora biosinteze ergosterola nije utvrđena.

2.26.1. Imazalil

Koristi se za zaštitu plodova agruma nakon berbe. Na ambalažu tretiranih agruma potrebno je navesti slijedeće upozorenje: "UPOZORENJE: Kora agruma nije za jelo. Tretirano imazalilom"

2.26.2. Prokloraz

Nema jako izraženo sistemično djelovanje. Suzbija uzročnike bolesti žitarica: *Pseudocercospora herpotrichoides*, *Pyrenophora teres*, *Rhynchosporium secalis*, *Septoria spp.*, a smanjuje napad pepelnice i *Fusarium* na klasu. Na suncokretu suzbija: *Alternaria spp.*, *Botrytis cinerea*, *Sclerotinia sclerotiorum* i *Phomopsis helianthi*.

LD₅₀ - 1600. S.O. - III.

2.27. Triazoli

(engl. Triazoles)

Inhibitori biosinteze ergosterola (grupa I)

Triazoli imaju isti mehanizam djelovanja kao i fungicidi iz grupe pirimidina i imidazola, odnosno i oni inhibiraju biosintezu ergosterola u staničnim membranama kod fitopatogenih gljiva, na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu G1**. Djeluju na drugom mjestu u odnosu na predstavnike inhibitora biosinteze ergosterola iz grupe II i III, budući da inhibiraju procese demetilacije u stanicama gljiva tako što blokiraju enzim C14-demetilazu(erg11/ cyp51) zbog čega dolazi do spriječavanja demetilacije spoja 24-metilen hidrolanosterola iz kojeg nastaje ergosterol. Bez njega membrane stanica i hife gljiva gube sposobnost regulacije tvari zbog čega dolazi do njihovog odumiranja. Sistemični su fungicidi s preventivnim i kurativnim djelovanjem. Pokazuju širok spektar djelovanja na mnoge fitopatogene gljive.

Imaju srednji rizik za pojavu rezistentnosti. Neke gljive su već razvile mehanizme rezistentnosti prema ovoj grupi fungicida. Među predstavnicima ove grupe može doći do pojave unakrsne rezistentnosti, dok unakrsna rezistentnost s predstavnicima grupa II i III inhibitora biosinteze ergosterola nije utvrđena.

2.27.1. Ciprokonazol

Sistemik širokog spektra. U pripravcima dolazi u kombinacijama sa strobilurinima, benzimidazolima, propikonazolom. Suzbija bolesti žitarica: *Blumeria (Erysiphe) graminis*, *Puccinia spp.*, *Septoria spp.*, *Rhynchosporium secalis*, *Pyrenophora teres*, te smanjuje napad *Fusarium spp.* na klasu. Na šećernoj repi suzbija uzročnike sive pjegavosti i pepelnice.

S.O. - III. LD₅₀ - 1200.

2.27.2. Difenkonazol

Sistemični fungicid namijenjen za suzbijanje uzročnika čađave krastavosti i pepelnice jabuke.

LD₅₀ - 1453. S.O. - III.

2.27.2.a) Za tretiranje sjemena

Na sjemenu pšenice suzbija: *Tilletia caries*, *Tilletia foetida*, *Ustilago tritici*, *Stagnospora - Septoria nodorum*, *Cochliobolus sativus* i smanjuje zarazu sa *Fusarium spp.* Kombinacija s CETM-om može kod nekih sorata smanjiti energiju kljanja. CETM je pomoćno sredstvo koje s Dividendom formira pjenu. K - OVP. Za sve ozime i jare te mekane i tvrde sorte pšenice.

2.27.3. Epoksikonazol

Namijenjen je za suzbijanje uzročnika bolesti žitarica: Blumeria (Erysiphe) graminis, Puccinia spp., Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis i Septoria spp. Smanjuje zarazu s Fusarium spp.

LD₅₀ - 3160. S.O. - III.

2.27.4. Fenbukonazol

Sistemik. Usvaja se tijekom 2-4 sata nakon prskanja. Ima snažno kurativno i dugo djelovanje. Nije otrovan pa se može rabiti i u punoj cvatnji.

LD₅₀ > 2000. S.O. - III.

2.27.5. Flutriafol

Namijenjen je suzbijanju uzročnika bolesti žitarica: Blumeria (Erysiphe) graminis, Puccinia spp., Pyrenophora teres te smanjuje zarazu sa Septoria spp. i Fusarium spp. na klasu. Kombiniran s karbendazimom ima širi spektar. Suzbija uzročnike pjegavosti lista, pepelnice i hrđe šećerne repe. Na suncokretu suzbija uzročnike bijele truleži, truleži glava i sive pjegavosti stabljike.

LD₅₀ - 1140. (za miša 365). S.O. - III.

2.27.6. Metkonazol

Kontaktno-sistemičan fungicid. Suzbija najvažnije uzročnike bolesti žitarica: Blumeria (Erysiphe) graminis, Puccinia spp., Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis i Septoria spp. i smanjuje zarazu Fusarium spp. U uljanoj repici suzbija uzročnike koncentrične pjegavosti komuški, bijele truleži i suhe trulež, te djeluje i kao regulator rasta.

LD₅₀ - 1459. S.O. = III.

2.27.7. Miklobutanil

Fungicid s preventivnim, kurativnim, a kod uzročnika čađave krastavosti i eradikativnim efektom. Namijenjen je suzbijanju uzročnika pepelnice jabuke, vinove loze, ruže i krastavca.

LD₅₀ - 2800. S.O. - III.

2.27.8. Penkonazol

Za preventivno i kurativno suzbijanje uzročnika pepelnice jabuke i vinove loze.

LD₅₀ - 2125. S.O. - III. K - 21 dan jabuka i kruška; 35 dana vinova loza.

2.27.9. Propikonazol

Sistemični protektivni i kurativni fungicid za suzbijanje uzročnika bolesti pšenice i ječma (Blumeria/Erysiphe graminis, Septoria spp., Puccinia spp., Rhynchosporium secalis), te pepelnice vinove loze.

LD₅₀ - 1517. S.O. - III.

2.27.10. Protikonazol

Suzbijaju najvažnije uzročnike bolesti žitarica: Blumeria (Erysiphe) graminis, Puccinia spp., Septoria spp., Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres te značajnije smanjuje napad Fusarium spp. na klasu.

2.27.10.a) Za tretiranje sjemena

U kontaktno-sistemičnom pripravku za suzbijanje uzročnika biljnih bolesti koje se prenose sjemenom na pšenici, ječmu, raži i zobi.

LD₅₀ - 6200. S.O. - III. K - OVP.

2.27.11. Tebukonazol

Sistemik širokog spektra. Suzbijaju uzročnike bolesti žitarica: Blumeria (Erysiphe) graminis, Puccinia spp., Septoria spp., Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres te značajnije smanjuje napad Fusarium na klasu (dopuštena su 2 tretiranja). Suzbijaju uzročnike čađave krastavosti i pepelnice jabuke te paleži cvijeta koštičavih voćaka. Na uljanoj repici i suncokretu suzbija: Alternaria spp., Botrytis cinerea i Sclerotinia sclerotiorum.

LD₅₀ - 3300. S.O. - III. K - 7 višnja, trešnja; 14 breskve, nektarine; 15 šljiva; 21 lubenica, dinja, krastavac, paprika, rajčica; 28 jabuka; 42 žito i vinova loza; 56 uljana repica i suncokret.

Šljiva i trešnja samo u cvatnji. Vinova loza do 3 tretiranja.

2.27.11.a) Za tretiranje sjemena

Triazolni sistemik. Spektar suzbijanja bolesti analogan triadimenolu, ali je aktivniji. Za tretiranje sjemena pšenice - protiv uzročnika smrdljive snijeti, prašne snijeti, fuzarioza; ječma - za suzbijanje uzročnika prašne snijeti ječma; raži - za suzbijanje uzročnika fuzariozne paleži klice; zobi - za suzbijanje uzročnika prašne snijeti zobi i uzročnika fuzariozne paleži klice.

LD₅₀ - 335. S.O. - III. K - OVP.

2.27.12. Tetrkonazol

Sistemični fungicid. LD₅₀ - 1150.

2.27.13. Triadimenol

Metabolit triadimefona sa sličnim spektrom. Dopuštena najviše dva tretiranja.

LD₅₀ - 700-1500. S.O. - III. K - 7 krastavac, 35 pšenica i ječam.

2.28. Morfolini

(engl. Morpholines)

Inhibitori biosinteze ergosterola (grupa II)

Fungicidi iz ove grupe inhibiraju biosintezu ergosterola u staničnim membranama kod fitopatogenih gljiva. Djeluju na drugom mjestu u odnosu na predstavnike inhibitora biosinteze ergosterola grupe I i III, budući da inhibiraju drugačije enzimatske procese - enzime Δ14-reduktazu i Δ8 --> Δ7 -izomerazu u biosintezi ergosterola (erg24, erg2), na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu G2**. Sistemičnog su djelovanja.

Imaju mali do srednji rizik za pojavu rezistentnosti. Među predstavnicima ove grupe može doći do pojave unakrsne rezistentnosti, dok unakrsna rezistentnost s predstavnicima grupa I i III inhibitora biosinteze ergosterola nije utvrđena.

2.28.1. Fenpropimorf

Suzbija uzročnike hrđe i pepelnice na pšenici i ječmu. Kombinacije imaju širi spektar.

LD₅₀ - 3000. S.O. - III. K - 42 dana pšenica i ječam.

Pripravak: Opus Team.

2.29. Piperidini

(engl. Piperidines)

Inhibitori biosinteze ergosterola (grupa II)

Fungicidi iz ove grupe inhibiraju biosintezu ergosterola u staničnim membranama kod fitopatogenih gljiva. Djeluju na drugom mjestu u odnosu na predstavnike inhibitora biosinteze ergosterola grupa I i III, budući da inhibiraju drugačije enzimatske procese - enzime Δ14-reduktazu i Δ⁸ → Δ⁷-izomerazu u biosintezi ergosterola (erg24, erg2), na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu G2**. Sistemičnog su djelovanja.

Imaju mali do srednji rizik za pojavu rezistentnosti. Među predstavnicima ove grupe može doći do pojave unakrsne rezistentnosti, dok unakrsna rezistentnost s predstavnicima grupa I i III inhibitora biosinteze ergosterola nije utvrđena.

2.29.1. Fenpropidin

Fenpropidin se koristi za suzbijanje uzročnika žutosmeđe pjegavosti lista, pepelnice, smeđe i žute hrđe i smeđe pjegavosti lista pšenice, te pepelnice, smeđe hrđe, mrežaste pjegavosti i sive pjegavosti ječmu, sive pjegavosti lista ječma i pepelnice na vinovoj lozi.

K-OVP

2.30. Spiroketalamini

(engl. Spiroketalamines)

Inhibitori biosinteze ergosterola (grupa II)

Spiroketalamini imaju isti mehanizam djelovanja kao i fungicidi iz grupe morfolina, odnosno i oni inhibiraju biosintezu ergosterola u staničnim membranama kod fitopatogenih gljiva. Djeluju na drugom mjestu u odnosu na predstavnike inhibitora biosinteze ergosterola grupa I i III, budući da inhibiraju drugačije enzimatske procese - enzime Δ¹⁴-reduktazu i Δ⁸ → Δ⁷-izomerazu u biosintezi ergosterola (erg24, erg2), na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu G2**. Sistemičnog su djelovanja.

Imaju mali do srednji rizik za pojavu rezistentnosti. Među predstavnicima ove grupe može doći do pojave unakrsne rezistentnosti, dok unakrsna rezistentnost s predstavnicima grupa I i III inhibitora biosinteze ergosterola nije utvrđena.

2.30.1. Spiroksamin

Spiroksamin se koristi za suzbijanje uzročnika pepelnice, hrđe na pšenici i ječmu, sive pjegavosti lista ječma i pepelnice na vinovoj lozi. Kombinacija ima širi spektar i ispoljava djelovanje na Septoria spp. na listu i klasu, te na smanjenje zaraze sa Fusarium spp. na klasu.

LD₅₀ - 595. S.O. - III. K-35 dana vinske sorte, 14 dana stolne sorte.

2.31. Hidroksianilidi

(engl. Hydroxyanilides)

Inhibitori biosinteze ergosterola (grupa III)

Fungicidi iz ove grupe inhibiraju biosintezu ergosterola u staničnim membranama kod fitopatogenih gljiva. Djeluju na drugom mjestu u odnosu na predstavnike inhibitora biosinteze ergosterola iz grupe I i II, budući da inhibiraju enzim 3-keto reduktazu(erg27) i proces C4-demetilacije u biosintezi ergosterola u stanicama gljiva, na temelju čega su razvrstani u

FRAC grupu G3.

Imaju mali do srednji rizik za razvoj rezistentnosti, no potrebno je voditi brigu o eventualnoj pojavi rezistentnosti.

2.31.1. Fenheksamid

Botriticid iz nove kemijske grupe namijenjen suzbijanju uzročnika sive pljesni u: vinovoj lozi, jagodama, voću, povrću i ukrasnom bilju. Djeluje i na Monilia spp. i Sclerotinia spp. Potpuno drugačiji u odnosu na dosad poznate botriticide. Djeluje preventivno i dugotrajno.

LD₅₀ > 5000. S.O. - III.

2.32. Ditiokarbamati

(engl. Dithiocarbamates)

Fungicidi iz ove grupe djeluju na više različitih načina („Multi-site activity“), na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu M3**. Imaju kontaktno i protektivno djelovanje (nesistemici). Djeluju na veliki broj fitopatogenih gljiva. Često se kombiniraju sa sistemičnim fungicidima čime se postiže efikasnija zaštita užgajanih biljaka.

Smatraju se grupom malog rizika za razvoj rezistentnosti. Nema pojave unakrsne rezistentnosti s drugim fungicidima koji djeluju na više različitih načina („Multi-site activity“) iz **FRAC grupa M1-M9**, tj. sa fungicidima na bazi bakra i sumpora, kao i fungicidima iz grupe ftalimida, klornitrila, sulfamida, guanidina i kinona.

2.32.1. Ciram

Rabi se za premazivanje rana. Pridržavati se uputa o primjeni.

LD₅₀ - 1400. S.O. - III.

2.32.2. Mankozeb

Kontaktni fungicid. Suzbija uzročnike čađave krastavosti jabuke i kruške, plamenjače vinove loze i krumpira, hrđe i septorioze strnih žita i drugih bolesti.

LD₅₀ - 6750. S.O. - III.

2.32.3. Metiram

Kontaktni fungicid širokog spektra djelovanja protiv uzročnika bolesti vinove loze, voćaka, povrtarskih biljaka, suncokreta i ukrasnog bilja. Na suncokretu dva, a rajčici tri puta tijekom vegetacije.

LD₅₀ > 10.000. S.O. - III.

2.32.4. Propineb

Koristi se protiv uzročnika plamenjače vinove loze (*Plasmopara viticola*), plamenjače krumpira i rajčice (*Phytophthora infestans*), plamenjače duhana (*Peronospora tabaci*), čađave krastavosti jabuke i kruške (*Venturia inaequalis*, *Venturia pirina*) i drugih bolesti: *Alternaria solani*, *Botrytis cinerea*, *Diplocarpon rosae*, *Peronospora tabacina*, *Phomopsis viticola*, *Pseudoperonospora humuli*, *Pseudopeziza tracheiphila*.

LD₅₀ - 8500. S.O. - III.

2.32.5. Tiram

Prvenstveno štiti sjeme od parazitskih i saprofitskih gljivica kao što su: *Aspergillus spp.*, *Fusarium spp.*, *Penicillium spp.*, *Rhizopus spp.* i *Tilletia spp.* Nadražuje kožu i sluznicu.

LD₅₀ - 780-865. S.O. - II. K - OVP.

Pripravak: Cabrio Top, Polyram DF.

2.32.5. a) Za tretiranje sjemena

Pripravak: Vitavax 200 FF.

2.33. Ftalimidi

(engl. Phthalimides)

Fungicidi iz ove grupe djeluju na više različitih načina („Multi-site activity“), na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu M4**. Imaju kontaktno i protektivno djelovanje (nesistemici). Djeluju na veliki broj fitopatogenih gljiva. Često se kombiniraju sa sistemičnim fungicidima čime se postiže efikasnija zaštita uzgajanih biljaka.

Smatraju se grupom malog rizika za razvoj rezistentnosti. Nema pojave unakrsne rezistentnosti s drugim fungicidima koji djeluju na više različitih načina („Multi-site activity“) iz **FRAC grupa M1-M9**, tj. sa fungicidima na bazi bakra i sumpora, kao i fungicidima iz grupe ditiokarbamata, kloronitrila, sulfamida, guanidina i kinona.

2.33.1. Folpet

U parazitskoj gljivi ometa djelovanje brojnih enzima zbog čega nastaju smetnje u metabolizmu ugljičnih hidrata, aminokiselina i fosfata. Uspješno suzbija uzročnike mnogih najštetnijih bolesti u vinogradima, voćnjacima i u zgajalištima cvijeća. U spektru obuhvaća: Alternaria spp., Botrytis cinerea, Phomopsis viticola, Plasmopara viticola, Venturia inaequalis i druge.

LD₅₀ - 10.000. S.O. - III.

2.33.2. Kaptan

Djelatna tvar površinskog djelovanja. Suzbija uzročnike najopasnijih bolesti na voću, vinovoj lozi, povrću i cvijeću. Najdjelotvorniji u preventivnoj primjeni protiv uzročnika čađave krastavosti.

LD₅₀ - 9000. S.O. - III.

2.33.2.a) Za tretiranje sjemena

Suzbija uzročnike: Fusarium spp., Ustilago maydis, Ascochyta spp., Colletotrichum spp. i druge uzročnike bolesti na sjemenu kukuruza.

2.34. Kloronitrili

(engl. Chloronitriles)

Fungicidi iz ove grupe djeluju na više različitih načina (“Multi-site activity”), na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu M5**. Imaju kontaktno i protektivno djelovanje (nesistemici). Djeluju na veliki broj fitopatogenih gljiva.

Smatraju se grupom malog rizika za razvoj rezistentnosti. Nema pojave unakrsne rezistentnosti s drugim fungicidima koji djeluju na više različitih načina („Multi-site activity“) iz **FRAC grupa M1-M9**, tj. sa fungicidima na bazi bakra i sumpora, kao i fungicidima iz grupe ditiokarbamata, ftalimida, sulfamida, guanidina i kinona.

2.34.1. Klortalonil

Jedan od najvažnijih kontaktnih fungicida širokog spektra djelovanja i primjenjiv u velikom broju kultura. Djeluje preventivno inhibiranjem klijanja spora.

LD₅₀ - 5000. S.O. - III.

2.35. Guanidini

(engl. Guanidines)

Fungicidi iz ove grupe djeluju na više različitih načina (“Multi-site activity”), na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu M7**. Preventivni i kurativni fungicidi lokalne sistemičnosti.

Guanidini pripadaju grupi fungicida s niskim rizikom za razvoj rezistentnosti, no pojava rezistentnosti Venturia inaequalis na dodin upućuje da dodin možda nije inhibitor na više mesta djelovanja. Nema pojave unakrsne rezistentnosti s drugim fungicidima koji djeluju na više

različitih načina (“Multi-site activity”) iz **FRAC grupa M1-M9**, tj. sa fungicidima na bazi bakra i sumpora, kao i fungicidima iz grupe ditiokarbamata, ftalimida, kloronitrila, sulfamida i kinona.

2.35.1. Dodin

Sistemik s protektivnim i eradicativnim djelovanjem. Koristi se protiv uzročnika čađave krastavosti jabuke, kovrčavosti lista breskve, crvene paleži lišća ribizla i kozičavost lišća višnje i trešnje.

LD₅₀ - 851. S.O. - III. 75 dana breskva; 60 dana jabuka i kruška; 14 višnja i trešnja.

2.36. Kinoni

(engl. Quinones)

Fungicidi iz ove grupe djeluju na više različitih načina („Multi-site activity“), na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu M9**. Imaju preventivno i djelomično kurativno djelovanje.

Smatraju se grupom malog rizika za razvoj rezistentnosti. Nema pojave unakrsne rezistentnosti s drugim fungicidima koji djeluju na više različitih načina („Multi-site activity“) iz **FRAC grupa M1-M7**, tj. sa fungicidima na bazi bakra i sumpora, kao i fungicidima iz grupe ditiokarbamata, ftalimida, kloronitrila, sulfamida i guanidina.

2.36.1. Ditianon

Fungicid niskog rizika na razvijanje rezistentnosti. Djeluje kao protektant i djelomično kurativno. Koristi se za suzbijanje uzročnika čađave krastavosti jabuke, plamenjače i crne pjegavosti rozgve vinove loze, lisne pjegavosti višnje i kovrčavosti i šupljikavost lista breskve. Može nadražiti kožu i sluzokožu. Može se primijeniti u svim razvojnim fazama jabuke i kruške. Breskve samo do faze neposredno prije početka bubrenja (B/C).

LD₅₀ - 300. S.O. - III.

2.37. Cianoacetamid-oksimi

(engl. Cyanoacetamide-oxime)

Mjesto djelovanja fungicida iz ove grupe je nepoznato. Odlikuju se preventivnim i kurativnim djelovanjem i ograničenom translaminarnom sistemičnošću. Imaju mali do srednji rizik za pojavu rezistentnosti. Ipak se preporučuje provođenje mjera za nadzor nad pojmom rezistentnosti.

2.37.1. Cimoksanil

Kontaktna djelatna tvar translaminarne sistemičnosti za suzbijanje uzročnika plamenjače vinove loze, krumpira i rajčice. Postoje samo kombinirani pripravci. Dopuštena do 4 prskanja tijekom vegetacije.

LD₅₀ - 960. S.O. - III.

2.38. Etil fosfonati

(engl. Ethyl phosphonates)

Mjesto djelovanja fungicida iz ove grupe je nepoznato. To su sistemični fungicidi s protektivnim i kurativnim djelovanjem. Djeluju na fitopatogene gljive iz razreda Oomycota (Phytophthora spp., Pythium spp., Plasmopara spp., Peronospora spp., Pseudoperonospora spp. i Bremia spp.). Niskog su rizika za razvoj rezistentnosti.

2.38.1. Fosetyl-aluminij

Fungicid s površinskim uzlaznim i silaznim sistemičnim djelovanjem. Suzbija uzročnika plamenjače na vinovoj lozi, krastavcima i drugim iz fam. Cucurbitaceae, salati i hmelju. Ne djeluje na uzročnika plamenjače krumpira. Učinkovit je i na uzročnika bakterijske paleži jabučastih voćaka (Erwinia amylovora).

LD₅₀ - 7080. S.O. - III.

2.39. Kinazolinoni

(engl. Quinazolinone)

Mjesto djelovanja fungicida iz ove grupe je nepoznato, na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu U7**. Odlikuju se preventivnim i kurativnim djelovanjem i lokalnom sistemičnosti. Poznata je pojava rezistentnosti prema fungicidima iz ove grupe. Imaju srednji rizik za pojavu rezistentnosti, zbog čega je potrebno provoditi preporuke FRAC-a (Fungicide Resistance Action Committee) pri korištenju ovog fungicida. Utvrđena je pojava unakrsne rezistentnosti Uncinula necator prema fungicidima na bazi prokinazida i fungicidima na bazi djelatne tvari kinoksifen, dok ta pojava kod Blumeria (Erysiphe) graminis nije utvrđena.

2.39.1. Prokinazid

Lokosistemični fungicid translaminarnog kretanja, preventivnog i kurativnog učinka, namijenjen suzbijanju uzročnika pepelnice vinove loze (Uncinula necator). Osjetljiv je na fotolizu.

LD₅₀ - 2000. S.O. - III .

2.40. Benzofenoni

(engl. Benzophenone)

Mjesto djelovanja fungicida iz ove grupe je još uvijek nepoznato, na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu U8**. Smatra se da utječu na organizaciju ili polarizaciju aktin cikloskeletona. To su lokosistemični fungicidi s protektivnim, kurativnim i eradikativnim (antisporulacijskim) djelovanjem. Benzofenoni su nova grupa fungicida, namijenjena za suzbijanje uzročnika pepelnice. Rezistentnost prema fungicidima iz ove grupe nije poznata.

2.40.1. Metrafenon

Lokosistemični fungicid translaminarnog kretanja, preventivnog i kurativnog učinka, namijenjen suzbijanju uzročnika pepelnice vinove loze (*Uncinula necator*).

2.41. Benzoilpiridini

2.41.1. Piriofenon

Fungicid translaminarnog djelovanja. Ima preventivno i kurativno djelovanje na uročnika pepelnice.

B) ANORGANSKI FUNGICIDI

2.42. Fungicidi na osnovi bakra (Cu)

(engl. Copper fungicides)

Fungicidi na bazi bakra djeluju na više različitih načina („Multi-site activity“), na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu M1**. Imaju kontaktno i protektivno djelovanje (nesistemici). Imaju širok spektar djelovanja za suzbijanje uzročnika bolesti voćaka, vinove loze, povrća i hmelja. Koriste se i za premazivanje rana nakon rezidbe. Često se kombiniraju sa sistemičnim fungicidima čime se postiže efikasnija zaštita uzgajanih biljaka. Na osjetljivim sortama vinove loze mogu izazvati palež za vlažnog i hladnog vremena. Na jabučastom voću smiju se koristiti do početka cvatnje, a na koštičavom voću samo za mirovanja vegetacije (za zimsko prskanje u 2 puta jačim koncentracijama od navedenih za prskanje u vegetaciji). Ovo se odnosi i na kombinacije s organskim fungicidima.

Smatraju se grupom malog rizika za razvoj rezistentnosti. Nema pojave unakrsne rezistentnosti s drugim fungicidima koji djeluju na više različitih načina („Multi-site activity“) iz **FRAC grupa M2-M9**, tj. sa fungicidima na bazi sumpora, kao i fungicidima iz grupe ditiokarbamata, ftalimida, kloronitrila, sulfamida, guanidina i kinona.

2.42.1. Bakarni (I) oksid

Preventivni fungicid i baktericid za suzbijanje uzročnika plamenjače, pjegavosti lista i čađave krastavosti jabuke, bakterijske paleži jabuke, kovrčavostilišća breskve, paunovog oka masline i drugih bolesti.

LD₅₀ - 261. S.O. - III. K - 14 dana krumpir, lubenica, rajčica; 28 bundeva; 35 vinova loza; OVP jabuka, breskva, krastavci; 56 maslina.

2.42.2. Bakarni oksiklorid

Koristi se za suzbijanje uzročnika plamenjače vinove loze, rajčice, krumpira, luka, krastavaca; kovrčavosti i šupljikavosti lista breskve; čađave krastavosti jabuke i kruške.

LD₅₀ - 700. S.O. - III. K - 14 dana krumpir, rajčica, hmelj; 21 dan luk i grah; 35 dana vinova loza; 56 dana maslina. Karenca je kod voćaka ograničena vremenom primjene. Na koštičavim voćkama dopuštena primjena samo u vrijeme mirovanja vegetacije. Lakše se ispiru kišom nego bordoška juha.

2.42.3. Bakarni hidroksid

Djeluje na način da inhibira enzimatski sustav patogena.

LD₅₀ - 489.

2.42.4. Bakar hidroksid - kalcij sulfat kompleks

2.42.5. Kombinacije bakra i organskih fungicida

Pripravak: Ridomil Gold plus 42,5 WP, Curzate B WG, Galben C.

2.42.6. Kombinacije bakra i mineralnih ulja

Za suzbijanje uzročnika bolesti jezgričavog i koštičavog voća (tzv. "plavo pranje"), štitastih i lisnih ušiju, crvenog pauka i drugih štetnika koji prezimljuju na voćkama i vinovoj lozi. Primjena samo za mirovanja vegetacije: Neznatno opasni.

S. O. - III. K – OVP

2.43. Fungicidi na osnovi sumpora (S)

(engl. Sulphur fungicides)

Fungicidi na bazi sumpora djeluju na više različitih načina („Multi-site activity“), na temelju čega su razvrstani u **FRAC grupu M2**. Ta se sredstva ponajprije koriste za suzbijanje uzročnika pepelnice na vinovoj lozi, jabukama, breskvama, krastavcima i drugim biljnim vrstama. Djeluju i na uzročnike nekih drugih bolesti, kao što je npr. čađava krastavost jabuke, kao i na grinje. Kod viših temperatura mogu prouzročiti palež biljaka.

Smatraju se grupom malog rizika za razvoj rezistentnosti. Nema pojave unakrsne rezistentnosti s drugim fungicidima koji djeluju na više različitih načina („Multi-site activity“) iz **FRAC grupa M1-M9**, tj. sa fungicidima na bazi bakra, kao i fungicidima iz grupe ditiokarbamata, ftalimida, kloronitrila, sulfamida, guanidina i kinona.

LD₅₀ > 5000. S. O. - izvan skupine otrova. K - 7 krastavci u polju i zaštićenom prostoru, grašak, grah, hmelj; 14 ostalo povrće i voće; 35 vinova loza i 42 dana ratarske kulture. Ne koristiti za zadnje tretiranje u kombinaciji s ditiokarbamatima radi produljenja perzistentnosti. Na jagodičastom voću namijenjenom za industrijsku preradu ne koristiti u razdoblju od cvatnje do berbe. Karenca za Cosavet DF- 21 dan za jagodu, ogrozd i ribiz. Radna karenca: 1 dan.

3. INSEKTICIDI

3.1. Karbamati

(engl. Carbamates)

Karbamati djeluju na živčani sustav insekata imaju isti mehanizam djelovanja kao i insekticidi iz grupe organofosfata, odnosno i onisu inhibitori enzima acetilkolin esteraze (AChE), na temelju čega su razvrstani u **IRAC grupu 1A**. Zbog inhibicije ovog enzima u organizmu insekata dolazi do nagomilavanja acetilkolina, koji je neophodan za transmisiju živčanih impulsa, što dovodi do paralize različitih organa, posebno mišića, a potom i uginuća tretiranih insekata.

Acetilkolin je kemijski posrednik u stanicama živčanog sustava (parasimpatomimetik) i kod insekata je neophodan za transmisiju živčanih impulsa. Receptori acetilkolina u organizmu insekta su: stanice koje inerviraju postsinaptičke receptore (srce, žljezde i glatka muskulatura), kao i stanice koje inerviraju presinaptičke receptore i somatski motorni živci (ganglije, vlakna skeletnih mišića i nadbubrežna žljezda).

Fiziološka uloga acetilkolin esteraze je u katalitičkom djelovanju, odnosno u hidrolizi acetilkolina na kolinergičnim sinapsama u organizmu insekta. Pri inhibiciji acetilkolinesteraze dolazi do: muskarinskog djelovanja (zbog stimulacije parasympatikusa); nikotinskog djelovanja (stimulacija, a zatim paraliza vegetativnih ganglija i skeletnih mišića), kao i stimulativnog, a zatim depresivnog djelovanja na pojedine dijelove centralnog živčanog sustava insekata, pri čemu manja inaktivacija acetilkolin esteraze kod insekata dovodi do hiperaktivnih funkcija, ovisnih od povećanja koncentracije acetilkolina, dok znatnije povećanje acetilkolina kod njih uzrokuje paralizu različitih organa.

Svi karbamati su opasna do vrlo opasna sredstva. Neki od njih imaju kontaktno, a neki sistemično djelovanje, zbog čega se neki koriste za suzbijanje velikog broja štetočinja, dok su neki izraziti aficidi (sredstva za suzbijanje lisnih uši). Zbog svojstva da metaboliziraju u toksičnije spojeve od početne djelotvorne tvari, nekima je vrlo ograničena upotreba i zabranjeni su u nekim kulturama (npr. u povrću).

Prema preporuci IRAC (Insecticide Resistance Action Committee), da bi se izbjegla opasnost od pojave unakrsne rezistencije, insekticidi na bazi aktivnih tvari koje pripadaju IRAC grupama 1A (karbamati) i 1B (organofosfati) se mogu naizmjenično koristiti, odnosno rotirati, samo u slučaju da nema drugih alternativa i kada je sa sigurnošću poznato da mehanizmi unakrsne rezistencije nisu utvrđeni kod populacije insekata koja će biti tretirana.

3.1.1. Metiokarb

Djeluje rezidualno jer metabolizira u sulfoksid i sulfon. LD₅₀ - 100. S.O. - II (ispod 40% - III).

3.1.1.a) Za tretiranje tla i/ili sjemena

Tretiranjem sjemena štiti biljku od žičnjaka ili rovca, a sjeme i od ptica repellentnim djelovanjem.

Karenca - OVP.

3.1.1.b) Za suzbijanje puževa

Koristi se u obliku zatrovanih mamaca koji se rasipaju po tlu uz biljke. Mladi tek izlegli puževi izuzetno su osjetljivi na ove pripravke. U vrijeme spolne zrelosti osjetljivost ponovno raste. Najveći uspjeh u suzbijanju se postiže rano u proljeće kada su se puževi tek izlegli.

LD₅₀ - 100. S.O. - II, odnosno III (do 40% djelatne tvari). K - 21 dan.

3.1.1.c) Repelent za ptice

To je za sada jedino sredstvo za odbijanje napada ptica (vrane, golubovi, fazani).

3.1.2. Pirimikarb

Sistemični selektivni aficid za suzbijanje i najotpornijih vrsta lisnih ušiju. Slabo toksičan za pčele i korisne insekte.

LD₅₀ - 147. S.O. - II, odnosno III (do 50% djelatne tvari).

3.2. Organofosfati

(engl. Organophosphates)

Organofosfati djeluju na živčani sustav insekata imajući isti mehanizam djelovanja kao i insekticidi iz grupe karbamata, odnosno i onisu inhibitori enzima acetilkolin esteraze (AChE), na temelju čega su razvrstani u **IRAC grupu 1B**. Zbog inhibicije ovog enzima u organizmu insekata dolazi do nagomilavanja acetilkolina, koji je neophodan za transmisiju živčanih impulsa, što dovodi do paralize različitih organa, posebno mišića, a potom i uginuća tretiranih insekata.

Acetilkolin je kemijski posrednik u stanicama živčanog sustava (parasimpatomimetik) i kod insekata je neophodan za transmisiju živčanih impulsa. Receptori acetilkolina u organizmu insekta su: stanice koje inerviraju postsinaptičke receptore (srce, žljezde i glatka muskulatura), kao i stanice koje inerviraju presinaptičke receptore i somatski motorni živci (ganglije, vlakna skeletnih mišića i nadbubrežna žljezda).

Fiziološka uloga acetilkolin esteraze je u katalitičkom djelovanju, odnosno u hidrolizi acetilkolina na kolinergičnim sinapsama u organizmu insekta. Pri inhibiciji acetilkolinesteraze dolazi do: muskarinskog djelovanja (zbog stimulacije parasimpatikusa); nikotinskog djelovanja (stimulacija, a zatim paraliza vegetativnih ganglija i skeletnih mišića), kao i stimulativnog, a zatim depresivnog djelovanja na pojedine dijelove centralnog živčanog sustava insekata, pri čemu manja inaktivacija acetilkolin esteraze kod insekata dovodi do hiperaktivnih funkcija, ovisnih od povećanju koncentracije acetilkolina, dok znatnije povećanje acetilkolina kod njih uzrokuje paralizu različitih organa.

Prema načinu djelovanja organofosfati su podijeljeni u dvije temeljne skupine: nesistemici koji djeluju kontaktno na površini tretiranog objekta (biljke) i sistemici koji prodiru u biljku koja ih prenosi kolanjem sokova svojim provodnim snopovima. Sistemici djeluju želučano (sisanjem sokova), a neki imaju i kontaktno djelovanje.

Prema preporuci IRAC (Insecticide Resistance Action Committee), da bi se izbjegla opasnost od pojave unakrsne rezistencije, insekticidi na bazi aktivnih tvari koje pripadaju IRAC grupama 1A (karbamati) i 1B (organofosfati) se mogu naizmjenično koristiti, odnosno rotirati, samo u slučaju da nema drugih alternativa i kada je sa sigurnošću poznato da mehanizmi unakrsne rezistencije nisu utvrđeni kod populacije insekata koja će biti tretirana.

3.2.1. Dimetoat

Sistemik. Uz sistemično, ima izraženo i kontaktno djelovanje, pa se koristi za suzbijanje insekata koji sišu (lisne i štitaste uši, stjenice, tripsi itd.) i grizu (maslinova mušica i moljac, trešnjina muha, šljivine osice, razne gusjenice, voćna muha, jabučni savijači i drugi). Djeluje i na grinje. Namijenjen je za suzbijanje štetnih insekata u voćarstvu, duhanu, repi i kupusnjačama. Ne tretirati biljke ovim insekticidom u vrijeme cvatnje!

LD₅₀ oko 150. S.O. - III (1- 40% djelatne tvari). Prodire kroz neoštećenu kožu.

3.2.2. Klorpirifos

Nesistemik. Kontaktni, želučani i dišni insekticid. Hlapljiv i čvrsto se veže na čestice tla. Koristi se za suzbijanje štetnika voćaka (lisne i krvave uši, lisne buhe, savijača, cvjetara i drugih), šećerne repe, uljane repice, duhana, kukuruza, pšenice, (sovice, metlice, lisne uši, stjenice, buhači i drugi). Učinkovit i na gubara, kao i na štetnike u tlu. Ne smije se koristiti u: peršinu, celeru, rotkvici, mladoj mrkvi, radiću, salati, mladom krumpiru i mladom luku.

LD₅₀ - 135. S.O. - II (više od 50% djelatne tvari) ili III (od 2-50% djelatne tvari). Može biti fitotoksičan za vinovu lozu, krastavce, salatu, ruže, azaleje i kamelije.

3.2.2.a) Za tretiranje tla

Dozvoljen je i za suzbijanje kukuruzne zlatice. Obavezno se mora unijeti u tlo!

3.2.3. Pirimifos-metil

Nesistemik. Kontaktni, želučani i volatilni insekticid, izraženog brzog i fumigantnog djelovanja. Koristi se protiv štitastih i lisnih ušiju, tripsa, lisnih buha, voćne mušice i nekih drugih štetnika. Djeluje i na grinje. Učinkovit je i na štetnike u skladištima.

LD₅₀ oko 2000. S.O. - III.

3.2.3. a) Za dezinsekciju žitarica

Koristi se za tretiranje uskladištenih proizvoda u silosima i podnim skladištima za vrijeme transportiranja na transporteru. K - 63 dana pšenica, kukuruz. Ne djeluje na Rizopertu. T- 4 žitarice, 2 proizvodi.

3.2.4. Fosmet

Nesistemik, djeluje kontaktno, ali i gutanjem i udisanjem, omota prijenos živčanih impulsa inhibicijom kolinesteraze. Namijenjen je za suzbijanje lisnih ušiju, grinje, voćnih muha na voću, ukrasnom bilju i vinovoj lozi.

3.3. Antranilni diamidi

Nova su grupa insekticida iz koje su poznate tri djelatne tvari: klorantraniliprol, ciantraniliprol i flubendiamid. Prema IRAC klasifikaciji zajednički specifični mehanizam djelovanja je modifikacija receptora ryanodina u mišićnim stanicama i razvrstane su u skupinu 28. Ne radi se o nervnim otrovima nego o insekticidima koji djeluju u mišićnom tkivu tako što potiču gubitak iona kalcija iz stanica mišićnog tkiva što dovodi do paralize mišića i smrti.

3.3.1. Klorantraniliprol

Pripada novoj kemijskoj skupini selektivnih antranilnih diamidnih insekticida s novim načinom djelovanja. Djeluje tako da aktivira receptore ryanodina u mišićnim stanicama. Spremljeni ioni kalcija oslobođaju se iz sarkoendoplazmatskog retikulumu organele koja u mišićnim stanicama služi čuvanju kalcija. Posljedica je gubitak kalcija koji dovodi do paralize i smrti kukca. Kontaktno je želučani insekticid koji se odlikuje i translaminarnim te sistemičnim djelovanjem. Na kukce djeluje ovicidno i larvicidno. U tlu je srednje mobilan, a razgrađuje se aerobnom razgradnjom. Poluraspad je 204 dana. Pokazuje slab potencijal za biokoncentraciju. Za ptice je malo toksičan, za ribe srednje, a za vodene beskralježnjake je visoko toksičan. Zbog selektivnosti koju pokazuje na korisne člankonošce, smatra se pogodan za primjenu u integriranoj zaštiti bilja. Malo je opasan za pčele, oralni LD₅₀ je 104 µg/pčeli, kontaktni LD₅₀ je 4 µg/pčeli.

LD₅₀ oralni I dermalni Iznad 5000 mg/kg, LC₅₀ iznad 5.1 mg/L O= III.

Karenca- 7 dana za kukuruz i kukuruz šećerac; 14 dana za jabuku, krušku, breskvu, nektarinu, šljivu I krumpir; 30 dana za vinovu lozu.

3.4. Sintetski piretroidi

(engl. Pyrethroids)

Insekticidi iz ove grupe djeluju na živčani sustav insekata inhibirajući protok natrijevih iona kroz membrane živčanih stanica što dovodi do poremećaja u protoku živčanih impulsa kroz natrijeve kanale, zbog čega nastaje uginuće tretiranih insekata. Na osnovu navedenog mehanizma djelovanja ovi insekticidi su razvrstani u **IRAC grupu 3A**.

Sintetski piretroidi su nesistemični insekticidi vrlo širokog spektra djelovanja, s brzim kontaktним i želučanim djelovanjem. Glavno pozitivno svojstvo je njihova visoka insekticidnost koja omogućava korištenje u vrlo niskim dozama, odnosno koncentracijama. Zbog ove osobine njihova upotreba smanjuje opasnost od onečišćenja okoliša, a dobro djeluju i pri nižim temperaturama. Neki od njih suzbijaju i voćnog crvenog pauka i koprivinu grinju. Njihova izvjesna repellentnost smanjuje opasnost za pčele. Svi pripadaju opasnim sredstvima.

Kao negativna svojstva sintetskih piretroida ističe se mogućnost brze pojave rezistentnosti, kao i vrlo širok spektar djelovanja zbog čega često izazivaju i uništenje korisnih insekata. Ne preporuča se njihova česta upotreba te ih treba koristiti naizmjениčno s drugim grupama insekticida kako bi se usporila pojava rezistentnosti. Smiju se koristiti najviše dva puta tijekom vegetacije. Vrlo su otrovni za ribe i pčele.

3.4.1. Alfa-cipermetrin

Kontaktni i želučani insekticid širokog spektra. Suzbija ličinke i odrasle oblike štetnika. Dobrog početnog i dugotrajnog djelovanja. Djelotvoran u vrlo malim koncentracijama. U zaštiti kupusnjača dodati okvašivač.

LD₅₀ - 64. S.O. - III. Manje opasan za pčele.

3.4.2. Cipermetrin

Cipermetrin je smjesa svih izomera. Koristi se za suzbijanje jabučnog i breskvinog savijača, kruškine buhe, lisnih ušiju, lisnih i sovica pozemljuša, repičinog sjajnika, štitastog moljca i drugih.

LD₅₀ - 82-250. S.O. iznad 20% djelatne tvari - II, inače III.

Pripravak: Chromorel-D, Kalinorel D EC, Nurelle D, Direkt, Fastac 10 EC, Storanet.

3.4.3. Deltametrin

Kontaktni i želučani insekticid širokog spektra djelovanja, učinkovit u vrlo niskim dozama. Ima dugo rezidualno djelovanje. Koristi se za suzbijanje jabučnog, breskvinog i šljivinog savijača, kruškine buhe, grozdovih moljaca, lisnih ušiju, lisnih sovica, tripsa duhana, repičinog sjajnika, štitastog moljca i drugih. Manje opasan za pčele.

LD₅₀ - 33-130. S.O. - II, ispod 2,5% III. K - 7 dana rajčica, krastavci u polju i zaštićenom prostoru, krumpir, jabuke, kruške; 14 dana ostale voćke, ostalo povrće, šećerna repa, hmelj; 21 dan vinova loza; 28 dana masline, duhan, šećerna repa (kojoj se lišće koristi za ishranu); 35 dana ostali ratarski usjevi.

3.4.3. a) Za dezinsekciju

Za preventivno suzbijanje štetnika uskladištenih proizvoda. Količina 0,25 g d.t./t osigurava zaštitu 6 mjeseci, a 0,5 g d.t./t 12 mjeseci.

3.4.4. Esfenvalerat

Insekticid brzog i dugotrajnog djelovanja. Djeluje protiv jabučnog savijača, lisnih minera i ušiju, lisnih sovica, repičine ose listarice i drugih.

LD₅₀ - 75-400. S.O. - II, ispod 5% - III.

3.4.5. Gama i lambda cihalotrin

Piretroid četvrte generacije, širokog spektra sa CF3 -klor vinilnom grupom. Suzbija štetnike u voćarstvu, na vinovoj lozi, šećernoj repi i uljanoj repici, kao i krumpirovu zlaticu, žitnog balca i druge. U šumama suzbija hrastovog savijača, suzničke i mrazovce.

LD₅₀ - 923. S.O. - II, ispod 5% - III. K - 7 dana krastavci, rajčica (i u staklenicima), krumpir; 14 dana ostalo povrće, osim lisnatog, voćke, šećerna repa; 21 dan lisnato povrće, duhan, hmelj, agrumi, vinova loza; 35 dana žitarice; 42 dana uljana repica.

3.4.6. Tau-fluvalinat

Namijenjen je za suzbijanje raznih vrsta biljnih ušiju na jabuci, ruži i šećernoj repi. Bezopasan je za pčele.

LD₅₀ - 260-3000. S.O. - III.

3.4.7 . Teflutrin

Najtopljiviji i najhlapljiviji piretroid III generacije, prikladan za suzbijanje štetnika u tlu na pšenici, šećernoj repi, kukuruzu i suncokretu.

LD₅₀ - 25. S.O. - II, do 20% - III. K - OVP.

3.4.7. a) Za tretiranje tla i/ili sjemena

3.5. Neonikotinoidi

(engl. Neonicotinoids)

Insekticidi iz ove grupe djeluju na živčani sustav insekata uzrokujući ireverzibilnu blokadu postsinaptičkih nikotinergičnih acetilholin receptora (nAChR), što dovodi do održavanja stalno otvorenih Na-kanala i stimulacije električnih impulsa, čime se ometa prijenos podražaja u živčanom sustavu štetnih insekata i uzrokuje blokiranje njihovih osnovnih funkcija. Na osnovu navedenog mehanizma djelovanja, koji se razlikuje od načina djelovanja insekticida iz skupine karbamata, organofosfata i piretroida, insekticidi iz ove grupe su razvrstani u **IRAC grupu 4A**. Odlikuju se izrazitim sistemičnim, kao i kontaktnim i digestivnim djelovanjem.

Koriste se za suzbijanje velikog broja insekata (lisnihi, tripsy, krumpirove zlatice, bijele mušice i dr.). Koriste se i protiv zemljjišnih insekata, no nemaju efikasnost na nematode i grinje. Pripadaju opasnim sredstvima te su svrstani u III. skupinu otrova. Da bi se umanjila mogućnost pojave unakrsne rezistentnosti treba izbjegavati alternativno korištenje insekticida iz grupe neonikotinoida koji imaju isti mehanizam djelovanja, odnosno preparata na bazi acetamiprida, imidakloprida, tialkoprida i tiacetoksama.

3.5.1. Acetamiprid

Kontaktnog, želučanog i sistemičnog djelovanja. Učinkovit protiv velikog broja različitih insekata s usnim ustrojem za grizenje i sisanje, kao i raznih gusjenica iz reda Lepidoptera. U nas dopušten za uporabu u šećernoj repi, krumpiru, duhanu, breskvama, jabukama, krastavcima, paprici, rajčici i ukrasnem bilju. Djelatna tvar u sredstvu ometa prijenos podražaja u živčanom sustavu štetnih organizama na način koji se razlikuje od insekticida iz skupine organofosfornih spojeva, karbamata i piretroida. Izrazite sistemičnosti, brzog i snažnog, ali umjerenog rezidualnog djelovanja.

LD₅₀ - 146-217. S.O. - III.

3.5.2. Imidakloprid

Izrazito sistemični insekticid, dopušten za suzbijanje mnogih kukaca koji sišu i nekih koji grizu, uključujući mnoge vektore viroza. Djeluje kontaktno i želučano. U spektru obuhvaća: lisne uši, duhanovog resičara, štitaste moljce, lisne minere agruma, krumpirovu zlaticu te štetnike u tlu. Može se primijeniti i sustavom za navodnjavanje. Perzistentan je u tlu pa se iste godine ne smije uzgajati lisnato povrće na tretiranoj površini.

LD₅₀ - 450. S.O. - III.

3.5.2.a) Za tretiranje sjemena, gomolja i lučica

Služi za tretiranje sjemena šećerne repe, suncokreta, uljane repice i kukuruza protiv štetnika u tlu i nekih nadzemnih štetnika. Ima dozvolu i za tretiranje gomolja za sadnju krumpira protiv krumpirove zlatice i lisnih ušiju uz djelotvornost kod ranog napada žičnjaka.

U godini primjene ne smije se na tretiranoj površini uzgajati lisnato povrće. Nakon tretiranja gomolja nije dopuštena folijarna primjena pripravaka na istoj osnovi.

3.5.3. Klotianidin

Najperzistentniji sistemični neonikotionid. Za suzbijanje podzemnih i nadzemnih štetnika kukuruza, šećerne repe i suncokreta.

LD₅₀ - 500. S.O. - III . K - OVP.

3.5.4. Tiakloprid

Ometa prijenos podražaja u živčanom sustavu. Djeluje kontaktno i želučano. Suzbija lisne uši na voćkama, rajčici, paprici, krastavcima, lubenicama, ružama, jabučnu osicu, neke minere, krumpirovu zlaticu itd. Visoko učinkovit na niskim i visokim temperaturama. Vrlo brzo ulazi u tkivo biljke. Nije opasan za oprasivače te se može primijeniti i u cvatnji.

LD₅₀ - 444. S.O. - III.

3.5.5. Tiametoksam

Izraziti sistemik, umjerene perzistentnosti, dopušten za suzbijanje mnogih kukaca koji sišu i nekih koji grizu, uključujući mnoge vektore viroza.

LD₅₀ - 1563. S.O. - III.

3.5.5.a) Za tretiranje sjemena

Primjenjuje se protiv štetnika u tlu i nekih nadzemnih štetnika tretiranjem sjemena.

3.6. Avermektini

(engl. Avermectins)

Insekticidi iz ove grupe djeluju na živčani i mišićni sustav insekata aktiviranjem kloridnih kanala, uzrokujući antagonističko djelovanje na γ -amino maslačnu kiselinu (GABA), čime se ometa prijenos podražaja u živčanom sustavu štetnih insekata i uzrokuje blokiranje njihovih

mišićnih funkcija, na temelju čega su oni razvrstani u **IRAC grupu 6. Avermektini su grupa makrocikličnih laktona koji su dobiveni u procesu fermentacije iz zemljišne aktinomicete *Streptomyces avermitilis***, koja je prvi put izolirana iz uzorka tla sa jednog japanskog golf terena.

3.6.1. Abamektin

Insekticid i akaricid kontaktnog i želučanog djelovanja. U biljci se kreće translaminarno. Prirodni proizvod aktinomicete *Streptomyces avermitilis*. Visoko toksičan za akvatične organizme i pčele. Odlično djeluje na običnu kruškinu buhu i crvenog voćnog pauka. Štetnici koji dođu u kontakt s ovom djelatnom tvari ili je unesu hranom u organizam postaju nepokretni i za 2-4 dana uginu. Za to vrijeme se ne hrane i ne uzrokuju štete. Prikladan u integriranoj proizvodnji voća jer vrlo slabo utječe na populaciju korisnih insekata u nasadima voća. Pod utjecajem svjetlosti djelatna tvar se na listu vrlo brzo razgradi tako da ima samo kratkotrajno kontaktno djelovanje na korisne vrste. Najbolji rezultati u primjeni ovog pripravka dobiju se ranjom primjenom, početkom vegetacije i razvoja populacije štetnika.

LD₅₀ - 891 mg/kg. S.O. - III.

3.6.2. Emamektin benzoat

Insekticid sa kontaktnim i želučanim djelovanjem koji pokazuje odlično translaminarno kretanje u listovima. Djeluje larvicidno što znači da suzbija sve stadije gusjenica, a poglavito prve stadije neposredno poslije izlaska iz jajašaca (to je i najbolje vrijeme primjene). Kada insekt dođe u kontakt s emamektin benzoatom, dolazi do paralize i trenutnog prestanka ishrane, nakon čega ugine u roku od 2 do 4 dana. Preparat se brzo razlaže na svjetlosti, posebno pri jačem UV zračenju, pa je njegova rezidualna kontaktna aktivnost zanemarljiva. Da bi se povećalo kontaktno djelovanje preporučuje se primjena preparata u večernjim satima. Stupanj efikasnosti preparata se povećava dodavanjem mineralnog ulja, u koncentraciji 0,25%.

LD₅₀ - >2000 mg/kg. S.O. - III.

3.7. Spinosini

(engl. Spinosyns)

Insekticidi iz ove grupe djeluju na živčani sustav insekata uzrokujući blokadu nikotinergičnih acetilkolin receptor (nAChR) alosteričnih aktivatora, čime se ometa prijenos podražaja u živčanom sustavu štetnih insekata i uzrokuje blokiranje njihovih osnovnih funkcija, na temelju čega su oni razvrstani u **IRAC grupu 5**. Koriste se za suzbijanje velikog broja insekata u krumpiru, vinovoj lozi, jabukama, paprici, krastavcima, rajčici i gerberima, a prikladni su i za primjenu u zatvorenim prostorima.

3.7.1. Spinosad

Insekticid sa sistemičnim, kontaktnim i želučanim djelovanjem. Mješavina tvorevina bakterije Saccharopolyspora spinosa u omjeru spinosad A (65-95%) i spinosad D (5-15%). Primjenjuje se za suzbijanje većeg broja različitih insekata u krumpiru, vinovoj lozi, jabukama, paprici, krastavcima, rajčici i gerberima. Prikladan je i za primjenu u zatvorenim prostorima kod proizvodnje krastavaca, paprike, rajčice i gerbera.

LD₅₀ - 3783-5000. S.O. - III.

3.8. Pimetrozin (Pirimidini)

(engl. Pyrimetazine)

Insekticidi iz ove grupe se odlikuju selektivnim djelovanjem na prekid (blokiranje) procesa ishrane insekata iz reda Homoptera, što dovodi do njihovog uginuća koje nastupa u roku od nekoliko dana. Za to vrijeme, insekt se normalno kreće, ali se ne hrani, čime se sprječava njegova uloga kao vektora pojedinih virusnih oboljenja. Na osnovu navedenog mehanizma djelovanja ova grupa insekticida je razvrstana u **IRAC grupu 9B**.

Za sada iz ove grupe dozvolu ima samo jedna djelatna tvar - pimetrozin.

3.8.1. Pimetrozin

Insekticid sa sistemičnim, kontaktnim i želučanim selektivnim djelovanjem namijenjen za suzbijanje lisnih uši (Aphididae) i štitastih moljaca (Aleyrodidae) na povrću, ukrasnom bilju i hmelju. Jedan sat poslije tretiranja dolazi do prekida ishrane kod svih vrsta lisnih ušiju i štitastih moljaca, nakon čega se oni nastavljaju kretati, ali se više ne hrane. Uginuće štetnika nastaje od gladi nekoliko dana poslije primjene pripravka u zavisnosti od vrste uši koja se suzbija. Prestanak ishrane štetnog insekta na uzgojenoj biljci, odmah po primjeni preparata, sprječava prenošenje opasnih virusnih bolesti čiji su ovi štetnici vektori (virus mozaika krastavca, špinata i salate, virus pjegavosti kupusa, virus žute patuljavosti crnog luka, itd.).

Aktivna tvar pimetrozin prodire u biljno tkivo i sistemično se, kolanjem sokova u biljci, raspodjeljuje čak i u novi rast biljke. Translaminarno djelovanje pripravka CHESS 50 WG osigurava suzbijanje i skrivenih štetnika na biljci.

LD₅₀ - 2000-5000. S.O. - III.

3.9. Derivati benzoiluree (Regulatori razvoja insekata)

(engl. Benzoylureas)

Insekticidi iz ove grupe inhibiraju biosintezu hitina, tipa 0, blokiranjem aktivnosti enzima hitinaze kod osjetljivih insekata, zbog čega kod njih dolazi do sprječavanja presvlačenja ličinki ili pak djeluju poput juvenilnog hormona, ometajući tako razvoj odraslih insekata. Na osnovu navedenog mehanizma djelovanja ova grupa insekticida je razvrstana u **IRAC grupu 15**. Dakle, insekticidi iz ove grupe kukce ne ubijaju izravno već kod njih ometaju i onemogućavaju razvoj određenih stadija, zbog čega se nazivaju i regulatori rasta insekata. Većina djeluje samo na ličinke, a neki donekle i na jaja. Neznatno su opasni do opasni. Selektivni su, pa djeluju na manje

skupine štetnika i samo na mali broj korisnih kukaca, zbog čega se smatraju ekološki prihvatljivim i prikladnim za sustav integrirane zaštite bilja.

3.9.1. Diflubenzuron

Inhibitor enzima hitinaze i stvaranja hitina neophodnog za presvlačenje ličinki. Perzistentan u okolini.

LD₅₀ - 2100. S.O. - III (iznad 5%).

3.9.2. Lufenuron

Inhibitor enzima hitinaze. Koristi se za suzbijanje ličinki krumpirove zlatice, jabučnog savijača, savijača kožice ploda i grozdovih moljaca. Preparati koji ometaju razvoj insekata imaju vrlo dugo djelovanje. Budući da djeluje na razvoj ličinki, važna je pravodobna primjena. Bolje je primjeniti ga malo ranije nego prekasno.

LD₅₀ - 3000. S.O. - II.

3.9.3. Teflubenzuron

Inhibitor enzima hitinaze, rezidualnog i kontaktnog djelovanja. Neznatno opasan.

LD₅₀ - 5000. S.O. - III.

3.10. Diacilhidrazini

(engl.Diacetylhydrazines)

Insekticidi iz ove grupe ometaju parenje i metamorfozu kod osjetljivih insekata, na temelju čega su razvrstani u **IRAC grupu 18**. Djeluju kao agonisti ekdisona kod leptira jer se vežu na njihov receptorski protein čime ubrzavaju (induciraju) prerano presvlačenje ličinki uz hipertrofiju njihovih epidermalnih stanica. Imaju potpuno drugačiji način djelovanja na insekte u odnosu na inhibitore sinteze hitina i regulatore razvoja insekata.

Selektivni su, pa djeluju na manje skupine štetnika i samo na mali broj korisnih kukaca, zbog čega se smatraju ekološki prihvatljivim i prikladnim za sustav integrirane zaštite bilja.

3.10.1. Metoksifenozi

Agonist ekdisona leptira jer se veže na njihov receptorski protein. Ubrzava presvlačenje uz hipertrofiju epidermalnih stanica. Pogodan je za integriranu zaštitu.

LD₅₀ - 5000. S.O. - III.

3.10.2. Tebufenozi

Ova djelatna tvar kao i metoksifenozi ima potpuno drugačiji način djelovanja na insekte u odnosu na inhibitore sinteze hitina i regulatore razvoja insekata. Ubrzava (inducira) prerano presvlačenje uz hipertrofiju epidermalnih stanica. Dozvoljen za suzbijanje jabučnog savijača, grozdovih moljaca, zlatokraja, kukavičnjeg suzničkog i štetnih gusjenica u šumama. Djeluje na sve razvojne stadije ličinke. Pogodan za integriranu zaštitu bilja.

LD₅₀ - 5000. S.O. - III. K - 21 dan jabuke i kruške; 28 dana vinova loza.

3.11. Keto-enoli

Keto-enoli su inhibitori acetil-CoA karboksilaze. U ovu skupinu ubrajamo tri djelatne tvari: spirodiklofen, spromesifen i spirotetramat. U Hrvatskoj dozvolu imaju dva pripravka na bazi spirodiklofena i spirotetramata.

3.11.1. Spirodiklofen

Pripravak: Envior SC 240

3.11.2. Spirotetramat

Insekticid dugotrajnog djelovanja i širokog spektra. Sistemični je insekticid (dvosmjerna sistemičnost) te se koristi za suzbijanje kukaca koji sišu biljne sokove. Siguran je za korisne organizme te ekološki prihvativ.

LD₅₀ - >2000. S.O. - III.

3.12. Insekticidi različitog kemijskog podrijetla

3.12.1. Fenoksikarb

Fenoksikarb djeluje kao analog juvenilnog hormona, na temelju čega je razvrstan u **IRAC grupu 7B**. Ima ovicidno i larvicidno djelovanje. Zbog selektivnosti je prikladan u integriranoj zaštiti.

LD₅₀ - 5000. S.O. - III.

3.12.2. Flonikamid

Flonikamid djeluje selektivnim blokiranjem ishrane kod insekata iz reda Homoptera, na temelju čega je razvrstan u **IRAC grupu 9C**. Koristi se kao selektivni kontaktnosistemični aficid u nasadima jabuka, šljiva i breskve. Opasan. Nema unakrsne rezistencije s neonikotinoidima i piretroidima.

LD₅₀ - 884. S.O. - III.

3.12.3. Fostiazat

Rezidualni sistemični insekto-nematocid. U krumpiru se koristi uz obaveznu inkorporaciju u tlo (10-15 cm).

LD₅₀ - 57.

3.12.4. Indoksakarb

Indoksakarb je selektivni insekticid koji djeluje na živčani sustav insekata blokiranjem Na-kanala što dovodi do poremećaja u protoku živčanih impulsa, zbog čega nastaje uginuće tretiranih insekata, na temelju čega je razvrstan u **IRAC grupu 22A**. Indoksakarb je naziv za (S)-stereoizomer jer je samo on insekticidan.

LD₅₀ - 751. S.O. - III.

3.12.5. Metaflumizon

Metaflumizon djeluje na živčani sustav insekata blokiranjem Na-kanala što dovodi do poremećaja u protoku živčanih impulsa, zbog čega nastaje uginuće tretiranih insekata, na temelju čega je razvrstan u **IRAC grupu 22B**. Pripada posve novoj grupi insekticida. Zbog specifičnog načina djelovanja dosada se nije pojavila unakrsna rezistentnost s ostalim grupama insekticida. Koristi se za suzbijanje štetnika u krumpiru (Lepidoptera, Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera). Ima povoljan toksikološki i ekotoksikološki profil.

LD₅₀>5 000. S.O. - III.

3.13. Pripravci za zimsko prskanje

Koriste se za prskanje voćaka, agruma, maslina, vinove loze i ukrasnog bilja u vrijeme mirovanja vegetacije. Njima se suzbijaju: kalifornijska i šljivina štitasta uš, štitaste uši agruma, smokvin medić, ostale štitaste uši, jaja lisnih uši, jabučnog moljca i drugih insekata.

3.13.1. Mineralna ulja

Djeluju na štitaste uši, zimska jaja crvenih pauka, jaja lisnih uši i mrazovca, a primjenjeni tijekom vegetacije djeluju i na štitaste i lisne uši. Rabi se u nasadima: jabuke, kruške, šljiva, maslina, agruma, vinove loze, smokava i oleandra. Smanjuje zarazu virusima na sjemenskom krumpiru.

K - 42.

3.13.2. Kombinirani pripravci bakra i mineralnog ulja

Upotrebljavaju se kao insekto-akaro-fungicidi za prskanje voćaka i vinove loze u vrijeme mirovanja vegetacije. Suzbijaju uzročnike bolesti voćaka koji se suzbijaju "plavim" prskanjem; štitaste uši, jaja lisnih uši i crvenog pauka, te neke druge štetnike koji prezimljuju na voćkama i vinovoj lozi.

S.O. - III.

3.14. Pripravci za fumigaciju

Djeluju u plinovitom stanju iako se kao pripravci nalaze u tekućem ili čvrstom obliku. Koriste se za suzbijanje skladišnih štetnika na žitaricama i drugim plodovima te nekim drugim namirnicama, kao i za suzbijanje karantenskih i drugih štetnika na voćnim sadnicama, voću i drugim poljoprivrednim proizvodima. Neki se koriste i za suzbijanje štetnih glodavaca u polju, štetnika u staklenicima i nekih nametnika u tlu. Glede njihove velike otrovnosti i specifičnog načina primjene potrebno je da s njima radi, za taj posao, osposobljeno i ovlašteno stručno osoblje. Ekspozicija propisana. **Zbog zaštite ozonskog omotača primjena metilbromida s klorpirinom dopuštena je samo za suzbijanje borove nematode i strizibuba na drvenoj ambalaži.** Metilbromid, aluminijev fosfid i magnezijev fosfid su uvršteni u I skupinu otrova. Standardna masa peleta je 0,6 g, a tableta i kuglica 3 g. Primjena metilbromida bila je dopuštena do kraja 2005. godine.

T - za metilbromid: ukupni anorganski bromidi (računano na brom) 400 začini; 50 žitarice i proizvodi, povrće, orasi, uljarice, sirova kava, čajevi, osušeno voće i čips; 30 agrumi; 20 svježe voće i mlijeko; 5 ostale namirnice biljnog podrijetla.

ZABRANJENA JE FUMIGACIJA TIJEKOM KOPNENOG I ZRAČNOG TRANSPORTA!

3.14.1. Aluminijev fosfid

3.14.2. Magnezijev fosfid

3.15. Mikrobiološki insekticidi

3.15.1. *Bacillus thuringiensis*

Djeluje na gusjenice mladih stadija (I-III) kukuruznog moljca, gubara, dudovca, metlice, jabučnog moljca, kupusnog bijelca, grozdovih moljaca, maslinovog moljca, topolovog prelca, topolovog gubara i borovog četnjaka. Djeluju sporo te se trebaju primijeniti dovoljno rano da ne dođe do šteta. Ne uništavaju korisne insekte. Bezopasni su za pčele i dopušteni u ekološkoj i integriranoj proizvodnji.

LD₅₀> 5000.

3.15.2. *Cydia pomonella* granulovirus

Biološki insekticid namijenjen za suzbijanje jabučnog savijača (*Cydia pomonella*). Aktivna materija je *Cydia pomonella* granulovirus u količini 1,5 x 10¹³ granula po litri. Nakon tretmana gusenice jabučnog savijača uginjavaju za 3-5 dana. Madex se koristi posebno za suzbijanje prve generacije jabučnog savijača.

3.16. Dijatomejska zemlja

Kod insekata uzrokuje oštećenja kutikule, zbog čega dolazi do gubitka vode iz organizma te ugušiće. Djeluje samo na štetnike izvan zrna.

4. AKARICIDI

4.1. Abamektin

Akaricid i insekticid kontaktnog i želučanog djelovanja. U biljci se kreće translaminarno. Prirodni proizvod zemljjišne aktinomicete *Streptomyces avermitilis*. Visoko toksičan za akvatične organizme i pčele. Odlično djeluje na crvenog voćnog pauka i običnu kruškinu buhu. Štetnici koji dođu u kontakt s ovom djelatnom tvari ili je unesu hranom u organizam postaju nepokretni i za 2-4 dana uguši. Za to vrijeme se ne hrane i ne uzrokuju štete. Prikidan u integriranoj proizvodnji voća jer vrlo slabo utječe na populaciju korisnih insekata u nasadima voća. Pod utjecajem svjetlosti djelatna tvar se na listu vrlo brzo razgradi tako da ima samo kratkotrajno kontaktno djelovanje na korisne vrste. Najbolji rezultati u primjeni ovog pripravka dobiju se ranijom primjenom, početkom vegetacije i razvoja populacije štetnika. Prskanje treba obaviti

kada se izlegne od 30-50% jajašaca crvenog voćnog pauka.

Pripravak: Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC.

4.2. Etoksazol

Etoksazol je akaricid koji je visoko toksičan za jaja i juvenilne stadije grinja (fam. Tetranychidae). Za odrasle jedinke nije toksičan, ali značajno reducira fertilitet tretiranih ženki. Na osnovu simptoma koje izaziva etoksazol se svrstava u akaricide inhibitore razvoja, zajedno sa klofentezinom i heksitiazoksom.

4.3. Fenazakin

Kontaktnog, snažnog početnog i dugotrajnog djelovanja protiv crvenog voćnog pauka, lozine i koprivine grinje. Djelatna tvar ometa disanje svih pokretnih oblika grinja. Ovicidno djeluje i na ljetna jaja. Uporaba: u voćnjacima jabuka i krušaka te vinogradima.

LD₅₀ - 134. S.O. - III (do 20% djelatne tvari), inače - II.

4.4. Klofentezin

Suzbijala zimska i ljetna jajašca crvenog pauka. Ima kontaktno i dugo rezidualno djelovanje.

LD₅₀ - 3200. S.O. - III.

4.5. Spirodiklofen

Kontaktni akaricid. Ima dozvolu za suzbijanje pokretnih razvojnih oblika štetnih grinja s popratnim ovicidnim djelovanjem. Primjenjuje se rano u proljeće u vrijeme masovnog izlaska ličinki iz jaja i njihovog naseljavanja na listove. Moguće ga je upotrebljavati u punoj cvatnji jer je potpuno neškodljiv za pčele. Ne iskazuje unakrsnu rezistentnost s drugim akaricidima.

S.O. - III. LD₅₀ - 2500. T-1 jabuka, grožđe.

4.6. Tebufenpirad

Suzbijala zimska i ljetna jajašca crvenog pauka. Ima kontaktno i dugo rezidualno djelovanje.

LD₅₀ - 3200. S.O. - III.

4.7. Piriproksifen

Aktivna tvar piriproksifen pripada grupi inhibitora presvlačenja koji inhibira rast insekata, sprječava embriogenezu odnosno inhibira procese, metamorfoze i reprodukcije. Posjeduje kontaktno i digestivno djelovanje i ovicidno djelovanje.

5. NEMATOCIDI

Koriste se injektiranjem u tlo, zalijevanjem tla, inkorporacijom u tlo ili fumigacijom tla, no bez obzira na njihovu formulaciju, kada dospiju u tlo, svi djeluju kao fumiganti. Kod većine je određen rok koji mora proći između primjene i sjetve, odnosno sadnje. K - za dazomet za povrće je 42 dana, a za ukrasno bilje se određuje biološkim testom fitotoksičnosti.

Dazomet se u tlu pretvara u metilizotiocijanat (metifum). Dazomet je nematocid, insekticid, fungicid i herbicid.

LD₅₀ - 520. S. O. - III. T - 0,05 voće i povrće; 0,2 kupusnjače.

5.1. Dazomet

Ne raditi na previsokim temperaturama jer je tada oslobađanje aktivnog plina prebrzo, a dezinfekcija nepotpuna. Optimalna temperatura tla za primjenu je 10-15°C. Tlo treba dobro usitniti nekoliko dana prije dezinfekcije. Nakon rasipanja sredstvo odmah unijeti u tlo na dubinu od 5-25 cm. Održavati vlažnost tla u narednih pet dana. Nakon dezinfekcije obavezno prozračiti tlo prije sjetve ili sadnje.

S.O. - III.

5.2. Fostiazat

Rezidualni sistemični insekto-nematocid. U krumpiru se koristi uz obaveznu inkorporaciju u tlo (10-15 cm).

LD₅₀ - 57.

5.3. Oksamil

Oksamil je nematocid i insekticid sa kontaktnim i sistemičnim djelovanjem, efikasan u suzbijanju nematoda i bijele leptiraste uši na usjevu paprike i krastavca u zaštićenom prostoru. Aktivna tvar oksamil je inhibitor kolinesteraze iz grupe karbamata. Kada se primjenjuje kroz sustav za navodnjavanje kap po kap, usvaja se korijenom i translocira kroz biljku.

LD₅₀ - 37. S.O. = II. Uzgoj salate dozvoljen tek nakon 42 dana.

5.4. Fluopiram

Koristi se prvenstveno kao nematocid, a ima i fungicidni učinak na uzročnika pepelnice.

6. LIMACIDI

Limaci su pripravci namijenjeni suzbijanju puževa. Koriste se u obliku zatrovanih mamaca koji se rasipaju po tlu uz biljke.

6.1. Metaldehid

LD₅₀ - 380. S.O - III. Karenca - 21 dan za lisnato, mahunasto i korijenasto povrće i 14 dana za plodovito povrće, na tretiranu površinu ne puštati perad 7 dana, OVP ratarski usjevi.

6.2. Metiokarb

Koristi se u obliku zatrovanih mamaca koji se rasipaju po tlu uz biljke.

LD₅₀ - 100. S.O. - II, odnosno III (do 40% djelatne tvari). K - 21 dan.

6.3. Željezo (III) pirofosfat

Željezo (III) pirofosfat pelete koriste se u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji za suzbijanje štetnih vrsta puževa. Proizvod je neutrovan, te nije razvrstan u grupe otrova. Nakon hranidbe s peletama željeznog (III) pirofosfata puževi se prestaje hraniti i postupno dehidriraju. Pelete je uputno postaviti u posude kao mamce. Sadržaj u posudama nije u direktnom kontaktu s biljkom niti sa tlom, te nema negativnog djelovanja niti opasnosti za ptice i kućne ljubimce.

Uporaba pripravka prije početka razvoja kultura je moguća pomoću raspršivača gnojiva. Pripravak ne treba raspršivati direktno po biljkama. Pripravak ne šteti kišnim glistama, ježevima, domaćim životnjama te ostalim životnjama i kukcima.

7. KORVIFUGI

Korvifugi su pripravci namijenjeni za odbijanje napada ptica (vrane, golubovi, fazani). Koriste se nanošenjem na sjeme koga štite svojim, za ptice, odbijajućim karakterističnim neprijatnim mirisom i okusom.

7.1. Metiokarb

Za sada je jedini registrirani pripravak namijenjen za odbijanje napada ptica (vrane, golubovi, fazani). Sjeme štiti svojim karakterističnim mirisom i okusom. Prednost mu je istovremena zaštita sjemena od zemljišnih štetnika.

8. RODENTICIDI

Rodenticidi su kemijska sredstva namijenjena za suzbijanje štetnih glodavaca.

U Republici Hrvatskoj hrčak je proglašen zaštićenom životinjom. Za rodenticide nisu propisane tolerance jer se ne smiju nalaziti u namirnicama niti u stočnoj hrani. Sve vrste zatrovanih mamaca treba stavljati točno prema uputama i ne rasipavati ih. Rodenticidi ne smiju biti dostupni: djeci, domaćim životnjama i divljači! Treba spriječiti onečišćenje uskladištenih proizvoda i bunara.

Rodenticidi koji nemaju dozvolu Ministarstva kao sredstva za zaštitu bilja ne smiju se koristiti u skladištima poljoprivrednih proizvoda i za suzbijanje poljskih glodavaca!

8.1. Bromadiolon

Bromadiolon pripada skupini antikoagulanata koji na štetne glodavce djeluju već nakon jednokratnog uzimanja. Djeluju brže, ali su znatno opasniji za ljude i toplokrvne životinje. Neke formulacije imaju dozvolu i za primjenu protiv poljskih glodavaca stavljanjem u njihove (aktivne) rupe.

S.O. - I; 0,008-0,25% d.t.- II; ispod 0,008% d.t. - III.

9. REGULATORI RASTA I FIZIOTROPI

9.1. Etefon

Pod utjecajem biljnog soka oslobođa etilen. Sistemični fiziotrop/regulator rasta, kratke perzistentnosti. Koristi se za ubrzavanje zriobe i lakšu berbu plodova višnje i za ujednačavanje zriobe plodova rajčice.

LD₅₀ - 4229. S.O. - III.

9.2. Klormekvat

Djeluje kao inhibitor sinteze giberelina. Spriječava polijeganje žitarica i stimulira rast korijena. U ozimoj pšenici se primjenjuje od početka busanja do prije pojave drugog koljenca (fenofaza 21-31 po ZCK). Tijekom ovog perioda može se primijeniti i u dvije odvojene doze: 1,6 + 0,6 l/ha. U ozimom ječmu se može primijeniti prije pojave 4 izdanka u proljeće ili u dozi 0,6 l/ha u jesen i 1,6 l/ha u proljeće prije pojave prvog koljenca. U jaroj pšenici se primjenjuje u fenofazama 21-29 ili od početka do kraja busanja. U ozimoj raži se primjenjuje od početka vlatanja do formiranja zastavice.

U ozimoj i jaroj zobi primjenjuje se od početka vlatanja do pojave trećeg koljenca. U tritikali se primjenjuje u fazi od punog busanja do prije pojave prvog koljenca. U cvjećarstvu se rabi radi boljeg razvoja cvjetnih grančica.

LD₅₀ 807-966. K - 42 dana zob, 63 pšenica, ječam, raž i tritikale. S.O - III.

9.3. Klorprofam

Spriječava klijanje konzumnog krumpira u tijeku skladištenja. Djelatna tvar smanjuje intenzitet disanja gomolja te ih tako štiti od gubitka vlaže i hranjivih tvari. Tek nakon provjetravanja može se u isto skladište pohraniti sjemenski krumpir i druga sjemenska roba.

LD₅₀ - 5000. S.O. - III..

9.4. Maleinski hidrazid

Upotrebljava se za spriječavanje rasta zaperaka duhana. Tretira se kada je većina biljaka u fenofazi pune cvatnje, dan nakon zakidanja zaperaka.

LD₅₀ - 2340. S.O. - III. K - OVP za duhan.

9. 5. Proheksadion

Rabi se za skraćivanje mladica jabuke kada iste dosegnu duljinu od 5-10 cm.
 $LD_{50} > 5000$. S.O. - III. K - 55 dana. Karenca - OVP.

9. 6. Trineksapak

Skraćuje vlati i spriječava polijeganje. Povećava masu korijena. Djeluje kao inhibitor sinteze giberelina. U pšenici od faze 31-37 po ZCK, jarom ječmu 33-37 po ZCK, ozimom ječmu i raži 31-37 po ZCK, ozimoj tritikali 32-37 po ZCK i zobi od 31-34 po ZCK.

LD_{50} 4460. S.O. - III. K - OVP.

10. OSTALA SREDSTVA

10.1. Benzojeva kiselina

Dezinficijens širokog spektra. Spriječava prijenos gljivica, virusa, bakterija i viroida.
 LD_{50} - 2000. S.O. - III.

10.4. Vapno

Dezinficijens širokog spektra. Spriječava prijenos gljivica, virusa, bakterija i viroida.
 LD_{50} - 2000. S.O. - III.

11. OKVAŠIVAČI

Okvašivači su sredstva koja se dodaju kod prskanja ili raspršivanja različitih pesticidnih pripravaka kontaktnog djelovanja u cilju smanjenja površinske napetosti, čime se postiže bolje vlaženje biljnih dijelova, kao i za povećanje sposobnosti prijanjanja pripravka za tretiranu biljku ili insekta. Koriste se prilikom suzbijanja pepelnice na jabuci, plamenjače luka, kod tretiranja kultura i insekata s naglašenom voštanom prevlakom (repe, kupusnjače i druge) i folijarnih herbicida. Uporabom ovih tvari može se smanjiti doza pripravku uz kojeg se koristi za 15-20%.

12. ATRAKTANTI