

# Formula za površinu tetivnog četverokuta

ŠEFKET ARSLANAGIĆ<sup>1</sup>

U literaturi iz geometrije nalazi se formula za površinu tetivnog četverokuta koja glasi:

$$P = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}, \quad (1)$$

gdje su  $a, b, c$  i  $d$  duljine stranica tog četverokuta, a  $s = \frac{a+b+c+d}{2}$  njegov poluopseg. Ova formula pripisuje se indijskom matematičaru i astronomu **Brahmagupti** (598. – 665.). O njoj je autor ovog rada detaljno pisao u [1], str. 385 – 393. Prvo je izvedena formula koristeći trigonometriju za površinu bilo kojeg konveksnog četverokuta  $ABCD$ :

$$P = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d) - abcd \cos^2 \frac{\beta + \delta}{2}}. \quad (2)$$

Ova se formula ponekada u literaturi naziva **poopćena Brahmaguptina formula** za površinu četverokuta. Kod tetivnog četverokuta  $ABCD$  vrijedi  $\beta + \delta = \alpha + \gamma = 180^\circ$ , tj.  $\frac{\beta + \delta}{2} = 90^\circ$ . No, onda je  $\cos \frac{\beta + \delta}{2} = 0$  i konačno  $abcd \cos^2 \frac{\beta + \delta}{2} = 0$ . Dakle, formula (1) slijedi iz (2).


U ovom radu dat ćemo još jedan način izvođenja formule (1) za površinu tetivnog četverokuta, pri čemu nećemo koristiti trigonometriju, nego samo planimetriju.

Neka je četverokut  $ABCD$  tetivni (sl. 1), pri čemu je  $a = |AB|$ ,  $b = |BC|$ ,  $c = |CD|$ ,  $d = |DA|$ ,  $|\angle DAB| = \alpha$ ,  $|\angle ABC| = \beta$ ,  $|\angle BCD| = \gamma$ ,  $|\angle CDA| = \delta$  i vrijedi  $\alpha + \gamma = \beta + \delta = 180^\circ$ . Ne umanjujući općenitost, možemo uzeti da je  $a > c$ .

Produljimo stranice  $\overline{AD}$  i  $\overline{BC}$  do sjecišta S. Očito su trokuti  $\Delta ABS$  i  $\Delta CDS$  slični jer im je kut u vrhu S zajednički, a zbog  $\beta + \delta = 180^\circ$  slijedi da je

$$|\angle CDS| = 180^\circ - \delta = \beta = |\angle ABC| = |\angle ABS|.$$

<sup>1</sup>Šefket Arslanagić, Odsjek za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, BiH



Slika 1.

Površine ovih sličnih trokuta odnose se kao kvadrati duljina odgovarajućih stranica. Neka je  $P_1$  površina trokuta  $\Delta ABS$ , a  $P_2$  površina trokuta  $\Delta CDS$ . Tada slijedi:

$$\begin{aligned}\frac{P_2}{P_1} &= \frac{c^2}{a^2} \\ \Rightarrow \frac{P_2}{P_1} - 1 &= \frac{c^2}{a^2} - 1 \\ \Rightarrow \frac{P_2 - P_1}{P_1} &= \frac{c^2 - a^2}{a^2} \\ \frac{P_1 - P_2}{P_1} &= \frac{a^2 - c^2}{a^2}.\end{aligned}$$

Budući da  $P_1 - P_2$  predstavlja površinu  $P$  tetivnog četverokuta  $ABCD$ , sada slijedi da je:

$$P = \frac{a^2 - c^2}{a^2} P_1. \quad (3)$$

Neka su  $u$  i  $v$  duljine stranica  $\overline{AS}$  i  $\overline{BS}$  trokuta  $\Delta ABS$ . Površinu tog trokuta izražavamo pomoću Heronove formule (**Heron**, starogrčki matematičar iz 1. stoljeća, živio i radio u Aleksandriji):

$$P_1 = \frac{1}{4} \sqrt{(a+u+v)(u+v-a)(a+u-v)(a+v-u)}. \quad (4)$$

Iz sličnosti trokuta  $\Delta SAB$  i  $\Delta SCD$  dobivamo razmjere:

$$|SA| : |AB| = |SC| : |CD| \text{ i } |SB| : |AB| = |SD| : |CD|$$

Ili, s obzirom da je  $|SA| = u$ ,  $|AB| = a$ ,  $|SC| = v - b$ ,  $|CD| = c$ ,  $|SB| = v$  i  $|SD| = u - d$ , imamo:

$$u : a = (v - b) : c \text{ i } v : a = (u - d) : c,$$

odnosno

$$\frac{u}{a} = \frac{v-b}{c} \text{ i } \frac{v}{a} = \frac{u-d}{c},$$

a odavde

$$\frac{u+v}{a} = \frac{v-b+u-d}{c} \text{ i } \frac{u-v}{a} = \frac{v-b-u+d}{c}, \text{ tj.}$$

$$(u+v)\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{c}\right)=\frac{-b-d}{c} \quad i \quad (u-v)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{c}\right)=\frac{-b+d}{c}$$

te

$$u+v=\frac{a(b+d)}{a-c} \quad i \quad u-v=\frac{a(d-b)}{a+c}. \quad (5)$$

Sada zbog (5) imamo:

$$a+u+v=a+\frac{a(b+d)}{a-c}=\frac{a^2-ac+ab+ad}{a-c}=\frac{a(a+b+d-c)}{a-c}=\frac{2a}{a-c}\cdot(s-c),$$

$$\text{gdje je } s=\frac{a+b+c+d}{2}.$$

Analogno dobivamo:

$$u+v-a=\frac{a(b+d)}{a-c}-a=\frac{a(b+d+c-a)}{a-c}=\frac{2a}{a-c}\cdot(s-a),$$

$$a+u-v=a+\frac{a(d-b)}{a+c}=\frac{a(a+c+d-b)}{a+c}=\frac{2a}{a+c}\cdot(s-b),$$

$$a+v-u=a-\frac{a(d-b)}{a+c}=\frac{a(a+c+b-d)}{a+c}=\frac{2a}{a+c}\cdot(s-d).$$

Uvrštavanjem ovih izraza u formulu (4), dobivamo:

$$P_1=\frac{a^2}{a^2-c^2}\sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}. \quad (6)$$

Sada iz (3) i (6) konačno nalazimo da je:

$$P=\sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)},$$

a ovo je (1).

**Napomena 1.** Ako je  $A \equiv D$ , tj. četverokut  $ABCD$  je trokut  $\Delta ABC$ , tada je  $d=0$  pa iz (1) dobivamo:

$$P=\sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)},$$

što predstavlja dobro nam poznatu Heronovu formulu za površinu trokuta  $\Delta ABC$ .

**Napomena 2.** Ako je četverokut  $ABCD$  tangencijalni, tj. ako je  $a+c=b+d$ , tada je:

$$s-a = \frac{b+c+d-a}{2} = \frac{a+c+c-a}{2} = \frac{2c}{2} = c$$

i analogno  $s-c=a$ ,  $s-b=d$ ,  $s-d=b$ . Tada iz (2) dobivamo:

$$\begin{aligned} P &= \sqrt{abcd - abcd \cos^2 \frac{\beta+\delta}{2}} = \sqrt{abcd \left(1 - \cos^2 \frac{\beta+\delta}{2}\right)} = \sqrt{abcd} \sin \frac{\beta+\delta}{2}, \text{ tj.} \\ P &= \sqrt{abcd} \sin \frac{\beta+\delta}{2}, \end{aligned} \quad (7)$$

što predstavlja formulu za površinu tangencijalnog četverokuta.

**Napomena 3.** Ako je tetivni četverokut  $ABCD$  i tangencijalni, tj. ako vrijedi i  $a+c=b+d$  i  $\alpha+\gamma=\beta+\delta=180^\circ$ , tada iz (7) dobivamo:

$$P = \sqrt{abcd} .$$

### Literatura:

1. Arslanagić, Š., *Matematika za nadarene*, Bosanska riječ, Sarajevo, 2005.
2. Blagojević, V., *Teoreme i zadaci iz planimetrije*, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo, 2002.
3. Grinberg, D., *Einige Formeln für das konvexe Viereck*, Wurzel (Jena), Vol.35, Nr. 6(2001.), S.127-133.
4. Modenov, P.S., *Zadaci iz geometrije*, Nauka, Moskva, 1979.
5. Pavković, B., Veljan, D., *Elementarna matematika 2*, Školska knjiga, Zagreb, 1995.