

Uloga suportivne terapije u kvaliteti života bolesnika s malignim bolestima-kvaliteta života bolesnika s malignim bolestima-ulaog medicinske sestre

The role of supportive therapy in quality of patient life with malignant disease-quality of patient life malignant disease diabetes-the role of nurse

Ana Tečić Vuger, dr. med.¹;

Andrea Jurić, bacc. med. techn.²;

Ksenija Romić, bacc. med. techn³;

Branka Svetec, bacc. med. techn.⁴;

Vesna Kralj-Škoc, dipl. med. sestra⁵

^{1,2}Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice-Zagreb, Klinika za tumore, Ilica 197, 10000 Zagreb, Hrvatska

³Klinički bolnički centar Split, Klinika za onkologiju i radioterapiju, Put Iza Nove Bolnice 4, 21000 Split, Hrvatska

⁴Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Klinika za onkologiju i radioterapiju, Vinogradarska 29, 10 000 Zagreb, Hrvatska

⁵Klinički bolnički centar Zagreb, Klinika za onkologiju, Kišpatičeva ul. 12, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Maligna bolest uvelike utječe na stupanj kvalitete bolesnikova života. Svijest o važnosti kvalitete života u populaciji onkoloških bolesnika sve je veća, te tijek onkološkog liječenja i metoda zdravstvene njegе ima povećani stupanj važnosti. U onkologiji stupanj kvaliteta sadrži sljedeće čimbenike: subjektivni doživljaj pozitivnih i negativnih simptoma bolesti; tjelesne, emocionalne, socijalne i kognitivne funkcije; učestalost simptoma i nuspojava liječenja.

Mučnina i povraćanje uzrokovani uporabom antitumorskih lijekova i metodama zdravstvene njegе, najčešće su i za bolesnike najznačajnije neželjene posljedice onkološkog liječenja. Mučnina i povraćanje, pored nedvojbenog smanjenja stupnja kvalitete života bolesnika može dovesti i do pojave neželjenih komplikacija kao što su dehidracija, elektrolitski disbalans, aspiracijska pneumonija, ruptura ezofagusa, anoreksija, malnutricija i disfunkcija svih organskih sustava. Sve navedeno uvelike utječe i na suradljivost bolesnika na indicirane metode liječenja onkološke terapije dovodeći do smanjenja učinkovitosti primjenjenih terapeutskih postupaka. Prema rezultatima provedenih studija proizlazi da od 60 do 80% bolesnika liječenih kemoterapijom navodi postojanje mučnine i povraćanja u različitom obimu, dok u bolesnika liječenih visokim dozama cisplatina taj postotak iznosi i do 90%.

Ključne riječi: kvaliteta života • antiemetici • suportivna terapija • netupitant • palonosetron

Keywords: quality of life • antiemetics • supportive therapy • netupitant • palonosetron