
Međunarodna klasifikacija funkcionisanja, onesposobljena i zdravlja (ICF) kao mogući prediktor procjene programa i ishoda liječenja u rehabilitaciji kod pacijenata sa lumbalnim bolnim sindromom

ICF Classification as a Possible Predictor
of Programme Evaluation and Outcome of
Treatment in Rehabilitation of Patients
with Lumbar pain Syndrome

Aldijana Kadić, Narcisa Vavra- Hadžiahmetović, Amra Ibrulj- Mahmutagić

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Uvod

Međunarodna klasifikacija funkcionisanja, onesposobljena i zdravlja (ICF okvir je za mjerjenje zdravlja i onesposobljenja koji je razvijen kako bi se osigurala međunarodno prihvaćena i empirijski utemeljena lista faktora povezanih sa zdravljem

Cilj

Cilj ovog rada je usporediti sve četiri komponente sadržane u Međunarodnoj klasifikaciji funkcionisanja, onesposobljenja i zdravlja ("Tjelesne funkcije", "Tjelesne strukture", "Aktivnosti i učestvovanje", "Faktori okoline") s područjima procjene i specifičnim elementima koji se pojavljuju u odabranim standariziranim procjenama u rehabilitaciji (Barhel index, Vizuelna analogna skala bola, Oswestry Low Back Disability Questionnaire, Back- ova skala).

Metode i ispitanici

Metodologija istraživanja: Ovo istraživanje je klinička, prospektivna studija. Uzorak istraživanja je formiran od 60 ispitanika sa lumbalnim bolnim sindromom, hospitaliziranih na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KCUS

Rezultati

Rezultati: Od ukupnog broja ispitanika, 28 je bilo muškog a 32 ženskog spola. Prosječna starosna dob ispitanika je bila $48,91 \pm 10,98$ godina (28-70), pri-mjenom ANOVA testa, nije ustanovljena statistički značajna razlika, $F=0,002$; $p=0,986$. Primjenom uparenog T-testa ustanovljena je statistički značajna razlika u vrijednostima BI. Razlika u prosječnim vrijednostima na prijemu i otpustu je $1,616 \pm 1,32$ ($t=9,424$; $df=59$; $p=0,001$). Hi kvadrat test je pokazao statistički značajnu razliku u odnosu na indeks ocjena po BI na prijemu i otpustu. Pro-sječna vrijednost Oswestry Low Back Disability Questionnaire na prijemu je iznosila $29,16 \pm 11$, dok je prosječna vrijednost na otpustu bila statistički zna-čajno manja $14,20 \pm 8,72$ ($t=17,424$; $p=0,001$). Iako postoji statistički značajna razlika u prosječnim vrijednostima Backove skale na prijemu i otpustu ($t=5,085$; $p=0,001$), ispitanici su se nalazili u grupi blagi poremećaj raspoloženja. Na pri-jemu prosječna vrijednost Vizuelne analogne skale bola je bila $6,96 \pm 1,74$, dok je na otpustu prosječna vrijednost bila značajno manja i iznosila je $3,10 \pm 1,80$.

Rasprava/zaključak

Zaključak: Međunarodna klasifikacija funkcionisanja, onosposobljenja i zdravlja implicitno podržava program procjene i ishoda liječenja u rehabilitaciji.

Ključne riječi: ICF, aktivnost, učestvovanje, rehabilitacija