

---

# Integracija u zajednicu osoba nakon moždanog udara

---

## Community Integration of Persons after Stroke

**Žarko Bakran, Martina Bakran, Dubravko Tršinski**

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice. Medicinski fakultet Osijek.  
Sveučilište Libertas Zagreb., Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

### **Uvod**

Od moždanog udara u Hrvatskoj oboli prosječno 18 000-21 000 osoba godišnje, od kojih umru 7 433 osobe (2015.godina). Nakon završenog liječenja i rehabilitacije preživjeli se vraćaju ili u obitelji ili u domove za njegu starijih i nemoćnih.

### **Cilj**

Procjena integracije u zajednicu osoba s moždanim udarom 6 mjeseci nakon završene bolničke medicinske rehabilitacije.

### **Metode i ispitanici**

Integracija u zajednicu je procijenjena prvi puta Upitnikom integracije u zajednicu (Community Integration Questionnaire-CIQ) tijekom provođenja bolničke medicinske rehabilitacije kada je procijenjeno stanje integracije pacijenta u zajednicu CIQ-m prije moždanog udara. Drugi put je procjena integracije pacijenta CIQ-m provedena telefonom 6 mjeseci nakon završetka bolničke medicinske rehabilitacije. U obradi podataka korištene su metode deskriptivne statistike, analiza varijance, studentov T-test, a korišten je program Statistica. U istraživanje je bilo uključeno 55 bolesnika s akutnim moždanim udarom koji su nakon akutnog liječenja direktno premješteni na bolničku medicinsku rehabilitaciju.

### **Rezultati**

Ispitano je bilo 55 bolesnika (14 žena i 41 muškarac), prosječne dobi 65 godina (30-86 godina). U trenutku moždanog udara većina bolesnika (46) su bili umirovljenici (84%), sedmero bolesnika (12%) je bilo zaposleno, a dvoje (4%) su bili nezaposleni. Wilcoxon Matched Pairs Test je pokazao statistički značajno

pogoršanje integracije u kućne aktivnosti, integracije u zajednicu i integracije u radne aktivnosti šest mjeseci nakon završetka bolničke medicinske rehabilitacije u odnosu na stanje prije moždanog udara ( $p<0,0001$ ).

### Rasprava/zaključak

Zaključak: Statistički značajno pogoršanje integracije u kućne aktivnosti, zajednicu i u radne aktivnosti, registrirano je 6 mjeseci nakon bolničke medicinske rehabilitacija u odnosu na njihovo stanje prije moždanog udara.

**Ključne riječi:** moždani udar, upitnik integracije u zajednicu. Community Integration Questionnaire, stroke