

Jedna zanimljiva nejednakost za konveksni četverokut


Šefket Arslanagić¹

U knjizi *Matematika za nadarene* iz 2005. g. naveo sam neke jednakosti za trapez. Jedna od njih je

$$2ac = e^2 + f^2 - b^2 - d^2, \quad (1)$$

gdje su a i c duljine osnovica, b i d duljine krakova, a e i f duljine dijagonala trapeza. Tamo je dana i jedna posljedica nejednakosti (1) u slučaju kada je četverokut paralelogram, tj. $a = c$, $b = d$ i ona glasi

$$e^2 + f^2 = 2(a^2 + b^2). \quad (2)$$



Slika 1.

Isto tako, u paralelogramu ABCD, stavljajući $e = 2t_a$, $f = a$, $|AB| = c$, $|AD| = b$ iz (2) dobivamo formulu za duljine težišnice trokuta koja glasi

$$t_a^2 = \frac{1}{4}(2b^2 + 2c^2 - a^2), \quad (3)$$

i analogno

$$t_b^2 = \frac{1}{4}(2a^2 + 2c^2 - b^2), \quad t_c^2 = \frac{1}{4}(2a^2 + 2b^2 - c^2).$$

Sada ćemo dokazati jednu zanimljivu nejednakost za konveksni četverokut, koja glasi

$$2ac \geq e^2 + f^2 - b^2 - c^2, \quad (4)$$

gdje su a, b, c, d duljine stranica, a e i f duljine dijagonala tog četverokuta. Jednakost u (4) vrijedi ako i samo ako je četverokut trapez.

Dokaz. Najprije ćemo dokazati sljedeću tvrdnju:
Ako su točke M i N polovišta stranica \overline{AD} i \overline{BC} četverokuta ABCD, tada vrijedi nejednakost

$$||AB| - |CD|| \leq 2|MN| \leq |AB| + |CD|. \quad (5)$$


Neka je točka P polovište dijagoale \overline{AC} četverokuta ABCD (slika 2). Tada su dužine \overline{MP} i \overline{NP} srednjice trokuta ACD , odnosno ABC , pa imamo $|CD| = 2|MP|$ i $|AB| = 2|NP|$.

Zbrajanjem ovih jednakosti, dobivamo

$$|AB| + |CD| = 2(|MP| + |NP|) \geq 2|MN|, \quad \text{tj.}$$

$$2|MN| \leq |AB| + |CD|,$$

gdje smo koristili nejednakost trokuta.



Slika 2.

¹ Autor je izvanredni profesor u miru na Prirodnno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, e-pošta: asefket@pmf.unsa.ba

Oduzimanjem istih jednakosti imamo

$$||AB| - |CD|| = 2||NP| - |MP|| \geq 2|MN|, \quad \text{tj.} \quad ||AB| - |CD|| \leq 2|MN|,$$

gdje smo opet koristili nejednakost trokuta. Ovime je nejednakost (5) dokazana. U (5) vrijedi jednakost ako i samo ako je $AB \parallel CD$, tj. ako i samo ako je šetverokut $ABCD$ trapez. Prikažimo nejednakost (5) u obliku

$$|a - c| \leq 2|MN| \leq a + c. \quad (6)$$

Sada ćemo dokazati da za četverokut $ABCD$ vrijedi jednakost

$$4|MN|^2 = a^2 + c^2 - b^2 - d^2 + e^2 + f^2 \quad (7)$$

gdje su točke M i N polovišta stranica \overline{AD} i \overline{BC} četverokuta $ABCD$. Iz (3) za trokut ADC (slika 3) imamo


$$|MC|^2 = \frac{1}{4}(2c^2 + 2e^2 - d^2), \quad (8)$$

za trokut ABD je

$$|MB|^2 = \frac{1}{4}(2a^2 + 2f^2 - d^2), \quad (9)$$

te za trokut MBC

$$|MN|^2 = \frac{1}{4}(2|MB|^2 + 2|MC|^2 - b^2). \quad (10)$$



Slika 3.

Uvrštavajući (8) i (9) u (10), dobivamo

$$4|MN|^2 = \left[\frac{1}{2}(2a^2 + 2f^2 - d^2) + \frac{1}{2}(2c^2 + 2e^2 - d^2) - b^2 \right],$$

odnosno

$$4|MN|^2 = a^2 + c^2 - b^2 - d^2 + e^2 + f^2,$$

a ovo je (7).

Iz desne strane nejednakosti (6), nakon kvadririranja imamo

$$4|MN|^2 \leq a^2 + c^2 + 2ac. \quad (11)$$

Najzad iz (7) i (11) slijedi

$$a^2 + c^2 - b^2 - d^2 + e^2 + f^2 \leq a^2 + c^2 + 2ac,$$

odnosno

$$2ac \geq e^2 + f^2 - b^2 - d^2,$$

a ovo je nejednakost (4), koju je trebalo dokazati. Jednakost u (4) vrijedi ako i samo ako je četverokut trapez.