

Perforacija nazofarinksa zbog tupe traume vrata uzrokovane padom uslijed epileptičkog napadaja

N. Golec, I. Paladin, M. Krnić Martinić

Klinički bolnički centar Split, Klinika za bolesti uha, nosa i grla s kirurgijom glave i vrata

Perforacija ždrijela uzrokovana tupom traumom vrata je rijetkost. Prikazujemo slučaj perforacije nazofarinksa uslijed tupe traume vrata kod 29-godišnje bolesnice. Bolesnica se javila s tegobama pojačane osjetljivosti, bolnosti i disfagije u području prednje strane vrata, koje su nastale nakon pada uslijed epileptičkog napadaja. Klinički pregled glave i vrata, te fiberendoskopski pregled ždrijela i grkljana nisu ukazivali ni na kakvu ozljedu. Po učinjenom MSCT-a verificiran je parafaringealni emfizem nastao radi perforacije nazofarinksa. Bolesnica je uspješno liječena antibioticima širokoga spektra, analgeticima i jednodnevnom restrikcijom peroralnog unosa hrane i tekućine, te je oporavak bio uspješan. Pristup bolesniku s tupom traumom vrata trebao bi uključivati adekvatnu slikovnu dijagnostiku (radiografski nalaz ili nalaz CT-a). Način liječenja ovisi o mjestu i veličini perforacije ždrijela, te je individualan za svakog bolesnika.

Ključne riječi: perforacija ždrijela, tupa trauma vrata, parafaringealni emfizem