

Primarni limfom kože centra folikula u području lica – prikaz slučaja

Ivan Vučković, Ivana Pajić Matić, Damir Sauerborn

Odjel za otorinolaringologiju, Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod

Primarni limfom kože centra folikula – Primary Cutaneous Follicle Center Lymphoma (PCFCL) je kožni limfom B stanica koji primarno zahvaća kožu, bez znakova sustavne proširenosti bolesti. Godišnja incidencija je 0,3 slučaja na 100.000 ljudi i čini otprilike 10-20% svih kožnih limfoma, te je uglavnom indolentnog tipa. Najčešće je lokaliziran na glavi i u vlasištu, a klinički se očituje pojavom eritematoznih nodula ili plakova. Dijagnoza PCFCL potvrđuje se patohistološki i imunohistokemijski, te ih je ključno razlikovati od histološki sličnih sistemskih limfoma, a po postavljanju dijagnoze izrazito je bitno isključiti sistemsko širenje bolesti. Postoji više modaliteta liječenja koji uključuju lokalnu radioterapiju, kiruršku eksciziju i kemoterapiju. Najčešće ima odličnu prognozu s 5-godišnjim preživljenjem od 95%. Autori predstavljaju slučaj 74-godišnje bolesnice koja se u ORL ambulantu javila zbog eritema na koži obraza. Biopsijom je potvrđena dijagnoza primarnog limfoma kože centra folikula, te smo za metodu izbora liječenja izabrali kiruršku eksciziju.

Ključne riječi: kožni limfom, primarni limfom kože centra folikula, limfom B stanica