
Zdravstvo širom svijeta



E B O L A HEMORAGIČNA GROZNICA

Klinička slika: Teško virusno oboljenje, obično karakterizirano iznenadnom slabošću, groznicom, bolovima u mišićima, glavoboljom, povraćanjem, proljevom, osipom na koži, unutarnjim i vanjskim krvarenjem. Smrtnost kod ebole je između 50 i 90% oboljelih s kliničkom manifestacijom.

Inkubacija: od 2 - 21 dan

Dijagnoza: specijalni laboratorijski testovi s detekcijom antiga ili antitijela ili izolacija virusa.

Terapija: ne postoji specifična terapija ili vakcine. Bolesnici zahtijevaju intenzivnu skrb.

Učestalost bolesti: Ebola je prvi puta otkrivena u zapadnom dijelu Sudana i Zairu 1976. godine. Drugi se puta pojavila u istom području 1979. godine. Virusi, slični eboli virusu, izolirani su kod majmuna (MACACA FASCIKULARIS) uveženih u SAD sa Filipina. 1989. godine mnogi od tih majmuna su uginuli, najmanje četvoro ljudi je inficirano, ali bez kliničke manifestacije bolesti.

Način prenošenja zaraze: Izravni kontakt s inficiranom krvljom, sekretima, s organima ili spermom. Bolničke infekcije su česte. U Zairskoj epidemiji 1976. godine došlo je do bolničkih infekcija preko zagadenih injekcijskih igala, štrcaljki, gdje su svi zagađeni umrli.

Postupak s oboljelim: Zaraženi pacijent se strogo mora izolirati. Stroge mjere zaštite bolničkog osoblja valja najozbiljnije primjenjivati. Umrli se ne smiju zadržavati u mrtvačnicama, već se moraju odmah pokopati ili kremirati. Sve osobe koje su, eventualno, došle u kontakt s oboljelom osobom moraju se staviti pod strogu liječničku kontrolu i izolaciju.

Dragica Šimunec