


Bolesti i stanja te najčešće propisivani lijekovi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Požeško-slavonskoj županiji


Županijski tim za zdravlje Požeško slavonske županije

Prema dostupnim podacima za Požeško-slavonsku županiju najveći broj ljudi posjećuje liječnika opće obiteljske medicine zbog bolesti dišnog sustava, nakon toga slijede cirkulacijske bolesti i bolesti mišićno-koštanog sustava sa po 11% posjeta. Slijede duševni poremećaji sa 6%, bolesti urogenitalnog i endokrinog sustava sa 5%, bolesti oka, probavnog sustava i kože sa po 4% posjeta, te zarazne i parazitarne bolesti sa 3%, dok na sve ostale bolesti otpada 32% posjeta liječniku u ordinaciji opće medicine.



Bolesti cirkulacijskog sustava

Najčešće bolesti cirkulacijskog sustava zbog kojih su bolesnici posjećivali obiteljskog liječnika su povišeni arterijski tlak sa 63%, druge srčane bolesti sa 13%, bolesti vena 7% i druge ishemične bolesti sa 4%, te još niz drugih kardiovaskularnih bolesti u manjim postocima.



Najčešće propisivani lijekovi

Najviše lijekova u našoj županiji propisuje se za kardiovaskularne bolesti (34%), slijede psihofarmatuci (16%), zatim lijekovi za probavne bolesti (13%), antibiotici (12%), lijekovi za respiratorne bolesti (7%), te za ostale bolesti (18%).



Što se tiče najčešće propisivanih pojedinačnih ili skupina lijekova u promatranom razdoblju primjećuju se određene promjene. U razdoblju 2000.-2001. godine najzastupljeniji su redom: lijek za neuroze, povišeni arterijski tlak, antibiotici i lijek za šećernu bolest. U razdoblju 2002.-2004. situacija se mijenja i najučestaliji postaje lijek za povišeni arterijski tlak, potom za neuroze, šećernu bolest, analgetik i lijek za probavne tegobe, a antibiotika više nema na toj listi.


NAJČEŠCE PROPISIVANI LIJEKOVI

	2000.	2001.	2002.	2003.	2004.
1	PRAXITEN	PRAXITEN	IRUZID	IRUZID	IRUZID
2	AMOXYL	IRUZID	PRAXITEN	PRAXITEN	PRAXITEN
3	IRUMED	EUGLUKON	EUGLUKON	EUGLUKON	EUGLUKON
4	CEPOREX	AMOXYL	AMLOPIN	VOLTAREN RET.	PEPTORAN
5	IRUZID	IRUMED	IRUMED	PEPTORAN	VOLTAREN RET.

Bolovanja

Po podacima iz 2005. godine najčešći razlog nesposobnosti za rad bile su mišićno-koštane bolesti s učestalošću od 31%. Slijede ozljede sa 16%, pa duševne bolesti i cirkulacijske bolesti sa po 13%, tumori sa 7%, a na sve ostale bolesti otpada 20%.

BOLOVANJA PREMA SKUPINAMA BOLESTI 2005.



Podaci iz 2005. godine pokazuju da i među muškarcima i ženama najviše bolovanje koriste osobe iznad četrdesete godine, s tim da je vrhunac kod muškog spola period između 45. i 50. godine, dok je kod žena to period od 40. do 45. godine.

BOLOVANJA PREMA STAROSTI PACIJENATA 2005.

