

## Odgodena epistaksa nakon izolirane traumatske frakture nosnog septuma-prikaz slučaja

**Filip Hergešić<sup>1</sup>, Tena Sučić Radovanović<sup>1</sup>, Iva Franković<sup>1</sup>, Marica Žižić<sup>1,2</sup>, Boris Šimunjak<sup>1,2</sup>**

<sup>1</sup>KB Sveti Duh, Zagreb, Hrvatska, <sup>2</sup>Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Osijek, Hrvatska

[filiip.hergesic@gmail.com](mailto:filiip.hergesic@gmail.com)

**Uvod:** Epistaksa je jedan od najčešćih razloga dolaska u hitnu otorinolaringološku ambulantu. Većina slučajeva epistakse može se kontrolirati primjenom jednostavnih mjera, no određeni slučajevi zahtijevaju hospitalizaciju radi neuspjeha primarne intervencije i perzistiranja krvarenja. **Prikaz slučaja:** Predstavljamo slučaj bolesnika 55 godina s izoliranom traumatskom frakturom etmoidnog dijela nosnog septuma, uz anamnezu kranioplastike koja je rezultirala odgodenim epistaksom. **Zaključak:** U ovom slučaju, cilj nam je prikazati izazove u dijagnostici i upravljanju bolesnika s odgodenom i dugotrajnom epistaksom kao posljedice izolirane frakture nosnog septuma. Analizirati ćemo utjecaj promjene koje su dovele do izolirane frakture nosnog septuma, te moguće komplikacije frakture nosnog septuma. Ističemo potrebu za ranim prepoznavanjem traume nosa kao uzroka produljenog krvarenja iz nosa radi pravilnog pristupa u liječenju, te praćenjem.

**Ključne riječi:** epistaksa, prijelom nosnog septuma, trauma nosa