

## **Tuberkuloza srednjeg uha**

**Antonija Brlić Košutić, Iva Kelava, Mihael Ries**

KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, Hrvatska

[brlic.antonija@gmail.com](mailto:brlic.antonija@gmail.com)

Uvod: Upala srednjega uha kao jedina manifestacija tuberkuloze, izrazito je rijetka. Simptomi su uglavnom tipični za upalu srednjega uha: sekrecija iz uha, bolovi, gubitak sluha, a u literaturi su opisani i slučajevi pareze ličnog živca. S obzirom na to da simptomi nisu specifični, te da se zbog niske incidencije bolesti specifični testovi na tuberkulozu ne rade rutinski, dijagnostika je otežana. U dijagnostici se koristi Quantiferonski test i bris uha. Prikaz slučajeva: Prikazati ćemo dvije bolesnice mlađe dobi kod kojih je dijagnosticirana tuberkuloza temporalne kosti kao jedina manifestacija tuberkuloze. Prva bolesnica inicijalno je imala upalu oba uha, uz parezu facijalisa desno, nakon čega se ubrzo javila i pareza facijalisa lijevo. Quantiferonski test kod nje je bio negativan, no s obzirom na to da nije reagirala na antibiotsku terapiju, niti je bilo poboljšanja nakon miringotomije, učinjen je bris uha na tuberkulozu, čime je ista dokazana. Druga bolesnica došla je u našu kliniku nakon što je unazad godinu dana imala upalu oba uha uz perforacije bubnjića i bez poboljšanja na dugotrajnu antibiotsku terapiju i redovite toalete uha. Kod ove bolesnice Quantiferonski test je bio pozitivan, a tuberkuloza je također dokazana iz brisa uha. Zaključak: Upala srednjega uha uzrokovana tuberkulozom je rijetka, no tuberkulozu treba uzeti u obzir u diferencijalnoj dijagnostici ukoliko kod bolesnika ne dolazi do poboljšanja na antibiotsko liječenje.

Ključne riječi: tuberkuloza, upala uha, lični živac