

Epistaksa kao prvi simptom osteomijelitisa temporalne kosti – prikaz slučaja

Matija Miškec¹, Iva Kelava², Marko Velimir Grgić², Željko Odobašić¹

¹Odjel za otorinolaringologiju, OB “Dr. Tomislav Bardek”, Koprivnica, Hrvatska, ²Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, Hrvatska

matija.miskec@gmail.com

Osteomijelitis temporalne kosti (maligni otitis externa) rijetka je i po život opasna infekcija. Najčešće se javlja u oboljelih od šećerne bolesti, a najčešći uzročnik je *Pseudomonas aeruginosa*. Tipična klinička slika uključuje simptome upale zvukovoda, kao što su bol u uhu i iscjadak, koji ne prolaze na uobičajenu terapiju. U kasnjem tijeku bolesti mogu se pojavit pareze kranijalnih živaca. Međutim, klinička slika nije uvijek tipična. Šezdesetvogodišnji muškarac, bez ranije poznatih komorbiditeta, dolazi u Odjel za otorinolaringologiju zbog obostrane epistakse, te blagog krvarenja iz desnog uha. Zbog nejasne kliničke slike i sumnje na tumor epifarinka, bolesniku je učinjena kompjuterizirana tomografija (CT) glave i vrata koja je pokazala ekspanzivnu tvorbu u epifarinksu. Učinjena je biopsija tvorbe kojom se nije dokazalo maligniteta. Dva tjedna poslije ponovljen je CT, te je učinjena magnetska rezonancija (MR) kojima je postavljena sumnja na osteomijelitis temporalne kosti. Ponovljenom biopsijom također nije nađeno maligniteta, a mikrobiološkom analizom brisa epifarinka pronađen je *Aspergillus flavus* i *Streptococcus viridans*. Prema našim saznanjima, ovo je drugi opisani slučaj epistakse kao prvog simptoma osteomijelitisa temporalne kosti. Ovim prikazom raspravljamo o mogućim simptomima, te naglašavamo kako epistaksa može biti vodeći simptom spomenute dijagnoze.

Ključne riječi: epistaksa, osteomijelitis, temporalna kost