

SISTEMSKI ERITEMSKI LUPUS – PRIKAZ BOLESNIKA

Ivana Došen

Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Sistemski eritemski lupus se češće javlja u žena, posebno generativne dobi, a učestaliji je u ljudi crne puti. Omjer oboljelih žena prema muškarcima je 5:1. Smatra se da u nastanku i razvoju bolesti sudjeluju nasljedni i vanjski čimbenici. Budući da simptomi mogu biti raznoliki, lupus može nalikovati mnogim drugim bolestima. Primjerice, ponekad je obuhvaćeno vezivno tkivo zglobova pa uslijed toga nastaje artritis koji može sličiti reumatoidnom artritisu. Opća slabost i febrilitet prisutni su kod gotovo svih oboljelih i prethode drugim simptomima. Budući da je tijek lupusa nepredvidljiv, prognoza je vrlo promjenljiva. Sistemski eritemski lupus ne utječe na fertilitet: bolesnice nemaju teškoća sa začećem, ali je trudnoća rizična, a učestalost spontanih pobačaja, preuranijenih poroda i intrauterinih smrti čeda mnogo viša. Liječenje SLE-a u trudnoći predstavlja izazov i zahtijeva adekvatnu suradnju reumatologa i ginekologa na održanju trudnoće i rađanju zdravog djeteta. Pažljivo planiranje trudnoće, redovno praćenje trudnica i tijeka trudnoće uz blisku suradnju reumatologa i ginekologa, kao i pravilno liječenje bolesti i komplikacija povezanih s trudnoćom, daju veliku šansu za uspješan ishod graviditeta. U prikazu slučaja prikazana je bolesnica koja boluje od lupusa te je uspješno začela, tokom trudnoće bila bez terapije, i uspješno porodila dijete.

Ključne riječi: sistemski eritemski lupus, trudnoća, komplikacije

Izjava o sukobu interesa: nema sukoba interesa