# Analiza kliničkih simptoma i nalaza audiovestibulometrije u bolesnika s Ménièreovom bolešću

**Marisa Klančnik[1], Petar Ivanišević[1], Marta Knežević[1], Marina Radoš[2]**

[1]Klinika za bolesti uha, nosa i grla s kirurgijom glave i vrata, KBC Split,
Spinčićeva 1, 21000 Split, Hrvatska
[2]Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Kavanjinova 2, 21000 Split, Hrvatska
marisa.klancnik@gmail.com

Ciljevi istraživanja: Ispitati koji su najčešći simptomi Ménièreove bolesti te utvrditi postoje li razlike u karakteristikama simptoma u odnosu na dob i spol, utvrditi prosječni gubitak sluha u svih ispitanika, kao i prosječan gubitak sluha i najzastupljeniji tip krivulje tonske audiometrije u odnosu na stadije bolesti te ispitati vestibularnu funkciju svih ispitanika.
Materijali i metode: Materijali su specijalistički ORL nalazi te nalazi tonske audiometrije i vestibulometrije iz registra Zavoda za audiologiju. Uključeni su samo bolesnici s definitivnom Ménièreovom bolešću. Ispitanici su podijeljeni u dvije skupine, ovisno o spolu i dobi te u četiri skupine, ovisno o stadiju bolesti utvrđenom prema nalazu tonske audiometrije.
Rezultati: Utvrđena je značajna povezanost svih simptoma sa stadijem bolesti, osim punoće u uhu. U prvom i drugom stadiju najčešći su simptomi vrtoglavica, fluktuacija sluha i šum u uhu, a u trećem stadiju vrtoglavica, šum u uhu i punoća u uhu. U četvrtom stadiju najčešći simptom je šum u uhu. Prosječan gubitak sluha svih ispitanika iznosi 50,38 ± 23,64 dB. U prvom i drugom stadiju najčešće je prisutan uzlazni tip krivulje, a u trećem i četvrtom stadiju najčešće je prisutan ravni tip. Mlađa skupina ima značajno veću učestalost napadaja vrtoglavice i fluktuaciju sluha, a starija ima češće prisutnu vestibularnu hipofunkciju i veći prosječni gubitak sluha. Bilježe se razlike u tipu krivulje u odnosu na spol. Ne bilježe se značajne razlike u učestalosti simptoma u odnosu na spol. Zaključci: S progresijom bolesti i starenjem uočava se smanjenje učestalosti fluktuacija sluha i vrtoglavica te povećanje prosječnog gubitka sluha i učestalosti vestibularne hipofunkcije. Uzlazni tip krivulje češći je u ranijim stadijima te u mlađih ispitanika, a ravni je tip češći u kasnijim stadijima i u starijih ispitanika.

Ključne riječi: Ménièreova bolest, vrtoglavica, gubitak sluha