Procjena potrebe za psihološkom pomoći u bolesnika s jednostranim perifernim oštećenjem centra za ravnotežu

Zlatko Kljajić[1], Tihana Mendeš[2]

[1]Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, R. Boškovića 37, 21000 Split, Hrvatska
[2]KBC Osijek, Klinika za ORL i kirurgiju glave i vrata, J. Huttlera 4, 31000 Osijek, Hrvatska
kljajiczlatko1@gmail.com

Danas su vestibularne bolesti prilično česte u populaciji i značajno narušavaju kvalitetu života. Osim toga, značajan problem je što određeni broj bolesnika doživljava psihološke posljedice. Stoga je važno istražiti vezu između oštećenja vestibularnog sustava i potencijalne potrebe za psihološkom intervencijom. Cilj ovoga istraživanja je ispitati korelaciju između anksioznosti kod osoba s jednostranim perifernim vestibularnim poremećajem u odnosu na spol, dob te postojanje akutnog i kroničnog, kompenziranog i nekompenziranog, djelomičnog i potpunog jednostranog perifernog vestibularnog poremećaja. Osim toga, bilo je važno utvrditi stupanj slobodno plutajuće anksioznosti, anksioznosti povezane s fobijama, opsesivnosti, somatskih manifestacija, depresije i histerije kod ovih bolesnika, koristeći se upitnikom Crown-Crisp Experience Index. Gotovo svim sudionicima (94%) dijagnosticirana je kronična hipofunkcija zbog dolaska na pregled i dijagnostičku obradu nakon završetka akutne faze bolesti. Zaključno, nisu uočene značajne razlike u uobičajenim simptomima ili osobinama ličnosti unutar konvencionalnih kategorija psihoneurotske i neurotske simptomatologije s obzirom na spol ili prisutnost vestibularne hipofunkcije.

Ključne riječi: anksioznost, depresija, vrtoglavica, vestibularna bolest