Cikatricijalni mukozni pemfigoid i subpraglotična stenoza

Tomislav Ognjenčić[1], Željko Zubčić[1], Anamarija Šestak[1], Vjeran Bogović[1], Hrvoje Mihalj[1], Antonio Kovačević[1], Ivan Kristić[3], Tin Prpić[1], Mirjana Grebenar Čerkez[1], Fran Babić[2], Marija Imširović[3], Ana Tataj Korman[3], Ana Oklobdžija[4]

[1]KBC Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek, Hrvatska
[2]Medicinski fakultet Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek, Hrvatska
[3]NMB „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar, Županijska ul. 35, 32000 Vukovar, Hrvatska
[4]OŽB Našice, Ul. bana Jelačića 10, 31500 Našice, Hrvatska
ogiiii07@gmail.com

Uvod: Supraglotična stenoza je rijetko stanje gornjih dišnih putova koje čini oko 3% svih slučajeva laringealnih stenoza. Često nastaje zbog traume, dugotrajne intubacije, zračenja ili autoimunih bolesti, uključujući i cikatricijalni mukozni pemfigoid. Cikatricijalni mukozni pemfigoid je kronična autoimuna bolest koja prije svega zahvaća sluznice, moguće i kožu, a rezultira stvaranjem ožiljaka, te također može uzrokovati stenozu gornjih dišnih putova. Prikaz bolesnica: Prezentiramo dva slučaja bolesnica (68 i 72 godine) s cikatricijalnim mukoznim pemfigoidom koje su se primarno žalile na otežano disanje. U kliničkom statusu u obiju bolesnica bilo je prisutno izolirano ožiljkasto supraglotično suženje. Ni jedna od bolesnica nije imala prethodni operativni zahvat na larinksu, povijest traume larinksa, niti težih bolesti u anamnezi. Obje bolesnice podvrgnute su CO_2 laserskom uklanjanju supraglotične stenoze, uz privremenu formaciju traheostome. Biopsijom i opsežnom imunološkom obradom objema bolesnicama postavljena je dijagnoza cikatricijalnog mukoznog pemfigoida i Behçetove bolesti. Zbog restenoze u obiju bolesnica ponovljen je tretman CO_2 laserom, uz lokalnu primjenu Kenaloga i sistemsku upotrebu metilprednizolona. Naknadno je jedna od bolesnica također primila biološku terapiju rituksimabom te tri mjeseca nakon zadnjeg zahvata nije bilo restenoze, a bolesnica koja nije primila biološku terapiju tri mjeseca nakon zahvata ima znakova restenoze. Zaključak: Biološka terapija, uz kirurško liječenje supraglotične stenoze u sklopu cikatricijalnog mukoznog pemfigoida, može biti odličan izbor terapije u sprječavanju povratka stenoze. U slučaju izolirane supraglotične stenoze potreban je individualizirani pristup bolesniku, pravodobno prepoznavanje uzroka te odabir optimalne terapije.

Ključne riječi: cikatricijalni mukozni pemfigoid, supraglotična stenoza, biološka terapija, kenalog