

Riječ urednice | Editor's Note

Dragi čitatelji, poštovane kolegice i kolege,

Drago mi je predstaviti novi broj *Infektološkog glasnika* u kojem donosimo četiri nova rada. Prvi je izvorni rad Papića i suradnika o sustavnom određivanju EBV DNA u likvoru pacijenata s encefalitisom i različitim razinama imunosupresije.

Zatim donosimo izvorni rad Ljubin Sternak i suradnika o učestalosti detekcije uzročnika spolno prenosivih infekcija *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae* i genitalnih mikoplazmi u uzorcima uretre i vrata maternice u izvanbolničkih pacijenata zagrebačke regije, gdje na velikom broju uzoraka možemo zaključiti o prevalenciji uvijek aktualnih uzročnika u našoj regiji.

Sljedeći pregledni rad Puškarić i suradnika nadovezuje se na temu dijagnostike uzročnika spolno prenosivih infekcija te govori o ulozi serologije u dijagnostici urogenitalnih klamidijskih infekcija.

I na kraju, svjedoci smo, nažalost, trajne cirkulacije SARS-CoV-2 u ljudi svih dobnih skupina. Stoga je vrlo aktualan izvorni rad japanskih autora koji ponovno ukazuje na važnost nošenja maske kao učinkovite metode prevencije.

Nadam se da će vam nove spoznaje iz radova biti zanimljive i korisne u svakodnevnom radu.

U sljedećem broju donosimo nove upute za autore u kojima će biti detaljno objašnjeno kako napraviti vlastiti prijelom rada koji šaljete u naš časopis.

Čekamo vaše radove te vas pozivamo da podijelite svoje znanje i iskustvo s medicinskom zajednicom.

Srdačno,

Adriana Vince
glavna urednica

Dear readers, esteemed colleagues,

I am pleased to present the new issue of *Infektološki glasnik*, featuring four original contributions. The first is an original article by Papić and colleagues, addressing systematic determination of EBV DNA in cerebrospinal fluid of patients with encephalitis across different levels of immunosuppression.

Ljubin Sternak and colleagues present an extensive original study on the detection rates of *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae* and genital mycoplasma in urethral and cervical samples collected from outpatients in the Zagreb region. The large sample size provides valuable insight into the local prevalence of these ever-relevant sexually transmitted pathogens.

The review paper by Puškarić and colleagues, further expands on the topic of diagnostics of sexually transmitted infections, focusing on the role of serology in diagnosing urogenital *Chlamydia trachomatis* infections.

Finally, we continue to witness the persistent circulation of SARS-CoV-2 among individuals of all age groups. Accordingly, an original paper by Japanese authors highlights once again the importance of mask use as an effective preventive measure.

I trust that the insights provided by these studies will be both interesting and useful in your daily clinical and research practice.

Starting with our next issue, we will introduce updated author guidelines, including detailed instructions on preparing and formatting manuscripts for submission.

We look forward to receiving your contributions and encourage you to share your knowledge and experience with the medical community.

Warm regards,

Adriana Vince
Editor-in-Chief