

LUMBOSAKRALNI PLEKSITIS I CRPS KAO ATIPIČNE MANIFESTACIJE MPO-ANCA POZITIVNOG VASKULITISA

LUMBOSACRAL PLEXITIS AND CRPS AS ATYPICAL MANIFESTATIONS OF MPO-ANCA POSITIVE VASCULITIS

Stipe Ćavar¹, Miroslav Mayer², Branimir Ivan Šepić³

¹Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb

²Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju, Klinika za unutarnje bolesti, KBC Zagreb

³Odjel za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromiografiju, Klinika za neurologiju, KBC Zagreb

Uvod: ANCA-povezani vaskulitisi (AAV) su rijetki nekrotizirajući vaskulitisi malih do srednje velikih krvnih žila, među kojima se najčešće javljaju granulomatoza s poliangiitisom (GPA) i mikroskopski poliangiitis (MPA). Bolest je povezana s prisutnošću antineutrofilnih citoplazmatskih protutijela (ANCA), cANCA/PR3 u GPA i pANCA/MPO u MPA, no obrasci se mogu preklapati. Klinička obilježja oba entita se međusobno preklapaju i uključuju zahvaćanje dišnog sustava i bubrega, no patognomična karakteristika GPA je granulomatoza upala. Neurološke manifestacije javljaju se u oko trećine bolesnika, najčešće kao mononeuritis multiplex.

Prikaz slučaja: Prikazujemo 51-godišnju bolesnicu s MPO-ANCA pozitivnim vaskulitisom koji je u remisiji oko 10 godina. Od proljeća 2024. pojavili su se febriliteti, mučnina, mialgije, povraćanje, bolobvi i ispadi osjeta u lijevoj nozi te recidivirajuće pneumonije. Hospitalizirana je u KBC-u Zagreb, gdje je potvrđen aktivni ANCA vaskulitis bez zahvaćanja bubrega i pluća, s nastankom „sedlastog nosa“ i lijevostranim lumbosakralnim pleksitisom te posljedičnim CRPS-om distalne potkoljenice i stopala. Terapija glukokortikoidima, intravenskim imunoglobulinima i rituksimabom dovela je do poboljšanja i remisije uz održavanje terapije.

Zaključak: Ovaj slučaj je atipičan zbog MPO-pozitivnog serološkog profila u sklopu potencijalne dijagnoze GPA i zbog iznimno rijetke neurološke komplikacije pleksitisa s CRPS-om. Klinički važan doprinos ovog slučaja je spoznaja da da AAV može zahvatiti LS pleksus i komplicirati se razvojem CRPS-a, što proširuje spektar poznatih manifestacija bolesti. Pravovremeno prepoznavanje i primjena imunosupresivne terapije ključni su za smanjenje morbiditeta i očuvanje funkcije.

Ključne riječi: ANCA-povezani vaskulitisi, pleksitis, CRPS

E-pošta glavnog autora: stipe.cavar07@gmail.com

Izjava o sukobu interesa: nema sukoba interesa