

FITOPLANKTON ŠARANSKIH RIBNJAKA-RASTILIŠTA

Lj. Debeljak, M. Dražić

Sažetak

Ovaj je rad rezultat istraživanja provedena od 31. svibnja do 8. kolovoza 1997. u ribnjacima-rastilištima, pojedinačne veličine 1 ha i dubine 1,3–1,5 metara. U trima varijantama rastilišta istraženo je djelovanje jednokratne primjene 120 kg ha⁻¹ NPK (15:15:15) i 45 l ha⁻¹ UAN-a + 45 kg ha⁻¹ MAP-a (12:52) na kvalitativno–kvantitativnu strukturu fitoplanktona.

Komparativnom analizom između gnojenih i kontrolne negnojene varijante utvrđena je slična cenotička struktura fitoplanktona. Od ukupno 100 determiniranih vrsta fitoplanktera, 58 vrsta bilo je u kontrolnoj, negnojenoj varijanti, 52 vrste u varijanti tretiranoj s NPK (15:15:15) i 76 vrsta u varijanti obradenoj UAN-om i MAP-om. Kvocijent florne sličnosti između sviju triju varijanata bio je 60%–65%.

Količina fitoplanktona bila je u kontrolnoj varijanti $2,2 \times 10^6$ ind l⁻¹, u varijanti tretiranoj s NPK $2,6 \times 10^6$ ind l⁻¹, a u varijanti obradenoj s UAN-om i MAP-om $1,7 \times 10^6$ ind l⁻¹. Analizom varijance potvrđeno je da razlike između pojedinih varijanata u količini fitoplanktona nisu signifikantne ($P < 0,05$).

Ključne riječi: šaranska rastilišta, mineralna gnojiva, fitoplankton

UVOD

Istraživanja fitoplanktona različitim kategorija šaranskih ribnjaka provode se radi utvrđivanja promjena koje nastaju kao rezultat primjene određenih tehnoloških mjera. Transformacije u abundaciji fitoplanktona mogu se očekivati poglavito kao posljedica primjene mineralnih gnojiva, koja obogaćenjem vode hranjivim solima dušika i fosfora izravno djeluju na fitoplakton. Fitoplankton je osnovna karika u prirodnom prehrambenom lancu, a preko razvoja zooplanktona reflektira se na ribe. U tome kontekstu, sastav i biomasa fitoplanktona u nas istražuju se niz godina, usporedo s intenzifikacijom uzgoja

Dr. sc. Ljubica Debeljak, znanstvena savjetnica, Agronomski fakultet, Zagreb; Maja Dražić, dipl. ing., Stočarski selekcijski centar, Zagreb

riba (Debeljak, 1968, 1969, 1970, 1980, 1982, 1986, 1994, 1997; Tomec, 1984; Tomec i sur., 1989, 1992). Rezultati tih istraživanja dobro ilustriraju stupanj trofičnog stanja, a daju uvid i u stupanj onečišćenosti vode, te omogućuju valorizaciju kvalitete vode u ribarstvu. Takva istraživanja prate tehnološki proces i određuju primjenu potrebnih ihtiohigijenskih mjera.

METODIKA RADA

Istraživanja su provedena na ribnjačarstvu »Jelas« kod Slavonskog Broda, u trima varijantama (I, II i III) ribnjaka-rastilišta. Pojedinačna veličina rastilišta bila je 1 ha, a dubina 1,3 do 1,5 metara. Tijekom zime rastilišta su bila suha. Prije upuštanja vode očišćena su od vegetacije i povapnjena s $1\ 000\ \text{kg ha}^{-1}$ hidratiziranog vapna. Nakon upuštanja vode rastilišta su jednokratno tretirana mineralnim gnojivima, prema sljedećoj shemi:

I. varijanta — kontrola bez gnojidbe

I. varijanta — tretirana mineralnim gnojivom NPK (15:15:15), $120\ \text{kg ha}^{-1}$. Odnos tvari $\text{N:P}_2\text{O}_5:\text{K}_2\text{O} = 1:1:1$

III. varijanta — tretirana mineralnim gnojivom UAN-om $45\ \text{l ha}^{-1}$. Količina N u UAN-u 30%, forma dušika $\text{N-NH}_2=50\%$, $\text{N-NH}_4=25\%$, $\text{N-NO}_3=25\%$. MAP (12:52), odnos tvari $\text{N:P}_2\text{O}_5=1:4,3$.

Svako je rastilište bilo nasadeno s 1 milijun trodnevnih šaranskih ličinki.

Pokus je trajao od 31. 5. do 8. 8. 1997. (68 dana). Fitoplankton je skupljan triput (lipanj, srpanj, kolovoz) u svakom rastilištu na jednoj postaji, potegom planktonske kvantitativne mreže otvora oko 45μ iz čitavoga vodenog stupca. Kvantitativni uzroci skupljeni su višestrukim potegom planktonske mreže. Uzorci su fiksirani formalinom. Za kvantitativno određivanje korišten je kondenzirani materijal uz upotrebu Reichertova mikroskopa. Analizirano je ukupno 45 snimaka (2,25 ml), odnosno iz svakog rastilišta 15 snimaka ukupnog volumena 0,75 ml. Za determinaciju vrsta rabljeni su priručnici: Hindak i sur. (1978), Zabelina i sur. (1951), Gollerbach i sur. (1953), Sládeček i Sládečková (1996), Pascher (1914).

Hidrokemijske analize izvršene su standardnim metodama (APHA, 1975).

REZULTATI I RASPRAVA

Kemizam vode u vrijeme istraživanja ilustrira tablica 1.

Posebnu pozornost izaziva količina i dinamika hranjivih soli dušika i fosfora. Količina mineralnih frakcija fosfora bila je veća u objema varijantama gnojenih ribnjaka u usporedbi s kontrolom. Količina ortofosfata (PO_4^{3-}) povećan je 34% i 27%, a količina P_2O_5 35% i 25%, dok je količina mineralnih frakcija dušika u pojedinim varijantama rastilišta bila različita. Količina NO_2^- povećana je 13% i 19%, a količina NH_4^+ 77% i 99%. Smanjenje prosječne

Tablica 1. Prosječne vrijednosti nekih hidrokemijskih parametara u pojedinim varijantama

Table 1 Mean values of some hydrochemical indicators in particular variants

Varijanta	I.	II.	III.
temperatura zraka C	28,89±0,48	20,86±0,45	20,83±0,48
alkalnost CaCO ₃ mg l ⁻¹	168±3,75	170±2,50	165±5,00
otopljenost O ₂ mg l ⁻¹	11,20±1,76	9,44±1,76	10,56±1,92
saturacija O ₂ %	127±18	107±18,50	120±20,25
utrošak KMnO ₄ mg l ⁻¹	34,62±5,14	46,24±11,02	46,77±13,44
NH ₄ ⁺ mg l ⁻¹	0,102±0,029	0,215±0,028	0,197±0,067
NO ₂ ⁻ mg l ⁻¹	0,054±0,010	0,051±0,010	0,056±0,010
NO ₃ ⁻ mg l ⁻¹	0,116±0,042	0,051±0,010	0,086±0,032
PO ₄ ³⁻ mg l ⁻¹	0,045±0,018	0,685±0,173	0,560±0,010
P ₂ O ₅ mg l ⁻¹	0,335±0,013	0,510±0,130	0,415±0,010

količine NO₃⁻ u objema gnojenim varijantama u usporedbi s kontrolom od 3% i 13% može se tumačiti malim stupnjem mineralizacije amonijskog iona dodanog u gnojivu, što potvrđuje povećana količina iona NH₄⁺ i povećana količina organske tvari (potrošak KMnO₄) u objema gnojenim varijantama. Detaljna analiza kemizma vode u rastilištima dana je u radu F a š a i č i sur. (1999).

Abundanciju fitoplanktona u pojedinim varijantama ilustrira tablica 2. Sastav vrsta bio je sličan u svim trima varijantama i nije korespondirao s primjenom gnojiva. Od ukupno 100 determiniranih vrsta, 58 vrsta bilo je u kontrolnoj varijanti (I), 52 vrste u II. varijanti tretiranoj gnojivom NPK, a 76 vrsta u III. varijanti tretiranoj UAN-om i MAP-om. Kvocijent florne sličnosti prema S ö r e n s e n u (1948) između svih triju varijanata kretao se od 60% do 65%. Najveći broj vrsta pripada odjelu *Chlorophyta* (21–34 vrste), zatim *Chrysophyta* (14–20 vrsta), *Cyanophyta* (8–12 vrsta), *Euglenophyta* (4–8 vrste) i *Pyrrophyta* (2–4 vrste). Floristički sastav fitoplanktona u ovim istraživanjima bio je sličan prije dobivenim podacima u istim rastilištima (Debeljak, 1997), dok je mala sličnost utvrđena u usporedbi s istraživanjima u konzumnim ribnjacima i mladićnjacima (Tomec, 1984; Debeljak i Adámek, 1994 i dr.), jer se nisu razvile vrste koje se javljaju kasnije tijekom ljeta i jeseni.

Količina fitoplanktona bila je 2,2x10⁶ind l⁻¹ (var. I), 2,6x10⁶ind l⁻¹ (var. II) i 1,7x10⁶ind l⁻¹ (var. III). Najbrojnije su se razvile alge iz odjela *Cyanophyta* uz dominantnu zastupljenost vrsta *Anabaena scheremetiewii* Elenk. i *Aphanizomenon flos-aque* Ralfs. Abundacija vrste *Anabaena scheremetiewii* Elenk. bila je najveća u varijanti tretiranoj gnojivom NPK, gdje je dosegla oko 1,7x10⁶ind l⁻¹. Subdominantni su bili pripadnici *Chrysophyta* s ukupnom količinom oko 8,5x10³ind l⁻¹ (var. II) do oko 1,7x10⁶ind l⁻¹ (var. I). Dominirale su vrste *Dinobryon sertularia* Ehr. u varijanti tretiranoj UAN-om i MAP-om i *Melosira varians* Ag. u kontrolnoj varijanti. Brojčano su se slabo razvili u svim rastilištima pripadnici odjela *Euglenophyta*, *Pyrrophyta* i *Chlorophyta*.

Tablica 2. Kvalitativni sastav i prosječna količina fitoplanktona u pojedinim rastilištima (br. ind. l^{-1} , + prisutni; – odsutni)

Table 2 List of phytoplankton species and average quantity of groups and species of phytoplankton (numb. ind. l^{-1} ; + present; – absent)

	Var. I 1	Var. II 2	Var. III 3	Var. III 4
CYANOPHYTA				
<i>Aphanizomenon flos-aque</i> Ralfs.	+	868 000	67 500	
<i>Anabaena scheremetiewii</i> Elenk.	486 000	1 680 000	597 300	
<i>Anabaena spiroides</i> Kelbs	2 025	6 750	4 050	
<i>Dactylococcopsis acicularis</i> Lemm.	–	+	10	
<i>Merismopedia glauca</i> (Ehr.) Naeg.	+	124	648	
<i>Merismopedia tenuissima</i> Lemm.	264	–	+	
<i>Microcystis</i> sp.	–	+	+	
<i>Oscillatoria chalybea</i> (Mer.) Gom.	–	–	+	
<i>Oscillatoria</i> sp.	34	434	+	
<i>Oscillatoria</i> sp. 1	–	–	+	
<i>Oscillatoria</i> sp. 2	+	+	+	
<i>Nostoc</i> sp.	+	+	+	
Ukupno sp.	488 323	2 555 308	669 508	
EUGLENOPHYTA				
<i>Euglena haematodes</i> (Ehr.) Lemm.	10	–	–	
<i>Euglena oxytis</i> Schm.	+	–	–	
<i>Euglena oblonga</i> Schm.	+	10	10	
<i>Euglena variabilis</i> Kleks.	+	–	+	
<i>Euglena viridis</i> Ehr.	–	–	+	
<i>Euglena proxima</i> Dang.	+	–	–	
<i>Euglena</i> sp.	23	–	15	
<i>Lepocinclus texta</i> (Duj) Lemm.	–	16	–	
<i>Phacus pleuromectes</i> (O. F. M.) Duj.	–	–	+	
<i>Phacus</i> sp.	–	16	+	
<i>Trachelomonas volvocina</i> Ehr.	13	46	–	
<i>Trachelomonas</i> sp.	13	–	–	
Ukupno	59	88	25	
PYRROPHYTA				
<i>Ceratium hirundinella</i> O. F. M.	133	760	+	
<i>Gymnodinium</i> sp.	–	–	+	
<i>Peridinium cinctum</i> (Müll.) Ehr.	429	20	36	
<i>Peridinium bipes</i> Stein	–	–	+	
Ukupno	562	780	36	

	1	2	3	4
CHRYSTOPHYTA CHRYSTOPHYCEAE				
<i>Dinobryon divergens</i> Ivanof		+	270	+
<i>Dinobryon sertularia</i> Ehr.	405 000		2 176	1 020 800
<i>Ophyocytium</i> sp.		-	-	+
<u>Ukupno</u>	405 00		2 430	1 020 800
BACILLARIOPHYCEAE				
<i>Achnanthes</i> sp.		+	+	+
<i>Cymatopleura solea</i> (Bréb) Sm.		+	-	+
<i>Diatoma vulgare</i> Bory		-	-	+
<i>Epithemia</i> sp.	10		-	+
<i>Fragilaria crotonensis</i> Ehr.		-	-	+
<i>Gomphonema constrictum</i> Ehr.		+	-	-
<i>Melosira varians</i> Ag.	1 316 990		4 890	1 350
<i>Melosira</i> sp.		-	400	143
<i>Navicula minuscula</i> Grün.		+	+	-
<i>Navicula mutica</i> Kütz.		+	+	-
<i>Navicula pupula</i> Kütz.		-	89	-
<i>Navicula rhynchocephala</i> Kütz.	380		155	340
<i>Navicula</i> sp.	190		20	+
<i>Navicula</i> sp. 1		+	-	+
<i>Navicula</i> sp. 2		+	-	-
<i>Nitzschia acicularis</i> W. Sm.	55		+	160
<i>Nitzschia quetzingiana</i> Hilse		-	-	+
<i>Stauroneis anceps</i> Ehr.		+	-	-
<i>Stephanodiscus</i> sp.		-	-	+
<i>Synedra acus</i> Kütz.	40		360	55
<i>Synedra actinastroides</i> Lemm.	110		-	60
<i>Synedra ulna</i> (Nitz.) Ehr.	258		180	352
<i>Synedra vaucheriae</i> Kütz.		+	16	+
<u>Ukupno</u>	1 318 033		6 110	2 460
<u>Ukupno Chrysophyta</u>	1 723 033		8 540	1 023 260
CHLOROPHYTA CHLOROPHYCEAE				
<i>Actinastrum gracillimum</i> G. M. Smith		-	-	+
<i>Actinastrum hantzschii</i> Lagerh.	88		160	40
<i>Ankistrodesmus falkatus</i> (Corda) Ralfs	13		31	102
<i>Anhistrodesmus falkatus v. duplex</i> (Kg.) G. S. West		-	-	+
<i>Ankistrodesmus longissimus</i> (Lemm.) Wille		-	-	11
<i>Ankistrodesmus setigerus</i> (Schr.) G. S. West		-	+	-
<i>Chlamidomonas</i> sp.		-	-	+
<i>Chlorella</i> sp.		-	-	+
<i>Coelastrum microporum</i> Naeg.		-	124	+

1	2	3	4
<i>Crucigenia tetrapedia</i> (Kirch.) W. et G. S. West	—	65	+
<i>Crucigenia quadrata</i> Morren	+	—	—
<i>Dictyosphaerium pulchellum</i> (Wood) Hansg.	1 630	+	724
<i>Dictyosphaerium</i> sp.	130	—	—
<i>Eudorina elegans</i> Ehr.	4 304	12 028	+
<i>Gonium pectorale</i> Müller	213	496	—
<i>Kirchneriella contorta</i> (Sch.) Bohlin	—	—	+
<i>Pandorina morum</i> (Müll.) Bory	776	904	—
<i>Oocystis</i> sp.	+	65	—
<i>Pediastrum duplex</i> Meyen	770	10 872	2 758
<i>Pediastrum clathratum</i> (Sch.) Lemm.	213	1 736	+
<i>Pediastrum boryanum</i> (Turp.) Menegh.	106	248	+
<i>Pediastrum simplex</i> (Meyen) Lemm.	—	372	530
<i>Pediastrum simplex v. sphaericum</i> Lemm.	—	868	+
<i>Pediastrum tetras</i> (Ehr.) Ralfs	107	+	—
<i>Scenedesmus acutus</i> Meyen	—	—	+
<i>Scenedesmus bicaudatus</i> (Haus.) Chod.	71	80	+
<i>Scenedesmus bijugatus</i> (Turp.) Kütz.	+	+	+
<i>Scenedesmus disciformis</i> Chod.	27	—	—
<i>Scenedesmus falkatus i</i> Chod.	1 013	—	88
<i>Scenedesmus semperflorens</i> Chod.	—	—	+
<i>Scenedesmus opoliensis</i> Richt.	—	248	+
<i>Scenedesmus</i> sp.	—	93	—
<i>Schroederia setigera</i> Lemm.	—	+	—
<i>Tetraedron caudatum</i> (Corda) Hausg.	—	+	—
<i>Tetraedron caudatum v. incisum</i> Lagw.	7	—	+
<i>Tetraedron regulare</i> Kütz.	—	+	—
<i>Volvox</i> sp.	—	—	+
Ukupno	9 468	28 390	4 253

CONJUGATAE

<i>Closterium acerosum</i> (Sch.) Ehr.	+	—	12
<i>Closterium aciculare</i> T. West	8	—	+
<i>Closterium moniliferum</i> (Bory) Ehr.	—	—	10
<i>Closterium</i> sp. 1	—	—	10
<i>Closterium</i> sp. 2	—	—	+
<i>Cosmarium botrytis</i> Meneg	11	—	10
<i>Cosmarium regnelli</i> Wille	—	—	+
<i>Staurastrum gracile</i> Ralfs.	—	—	+
<i>Staurastrum paradoxum</i> Meyen.	—	—	+
Ukupno	19	0	42
Chlorophyta ukupno	9 487	28 390	4 295
SVEUKUPNO	2 221 464	2 593 106	1 697 124

Razlika u količini fitoplanktona u svim trima varijantama rastilišta bila je mala i nije statistički signifikantna ($P<0,05$). Proizlazi da djelovanje gnojidbe na razvoj fitoplanktona u ovom pokusu nije bilo pozitivno. Kritička procjena toga efekta usko je povezana uz samo jednokratnu gnojidbu na početku uzgoja šaranskih ličinki. Smatra se da je to bilo premalo za razdoblje od 10 tjedana, koliko je pokus trajao. Ukupni broj mrežnih fitoplanktera nije korenspondirao s upotrijebljениm gnojivima, ili, kao u slučaju modrozelenih alga, ta povezanost nije bila sasvim adekvatna. Razlika u količini nutrijenata dušika i fosfora među varijantama bila je premala i u svima je zadovoljavala potrebe za sličan razvoj fitoplanktona. To, osim na premalu količinu uz samo jednu aplikaciju gnojiva upućuje i na to da omjer dušika i fosfora nije zadovoljavao. Naime, u svim trima varijantama utvrđena je veća količina mineralnih frakcija fosfora u odnosu na količinu mineralnog dušika. Smatra se da je bila potrebna veća količina mineralnog dušika u prisutnosti utvrđene količine PO_4^{3-} i P_2O_5 , te da je taj nepovoljan odnos, prema Goltermangu (1975), limitirao razvoj fitoplanktona. Jači razvoj odjela *Cyanophyta* tumačimo pojavom vrste *Anabaena* koja fiksira dušik (Spodniewska, 1979).

Usporedbom strukture fitoplanktona između triju različito tretiranih varijanata rastilišta utvrđeno je u svima umjereni eutrofno stanje (prema kvalitativnom i kvantitativnom sastavu), što se je odrazilo i na razvoj zooplanktona, te, konačno, na priraste šaranskoga mlada. To potvrđuju rezultati izneseni u radu Fašaić i sur. (1999).

ZAKLJUČAK

Jednokratna gnojidba sa 120 kg ha^{-1} NPK (15:15:15) uz odnos tvari $\text{N:P}_2\text{O}_5: \text{K}_2\text{O}=1:1:1$ i 45 l ha^{-1} UAN-a s 30% N u formi $\text{N-NH}_2=50\%$, $\text{N-NH}_4=25\%$, $\text{N-NO}_3=25\%$ + 45 kg ha^{-1} MAP-a (12:52) uz odnos tvari $\text{N:P}_2\text{O}_5=1:4,3$, nije djelovala na promjenu kvalitativno-kvantitativne strukture mrežnog fitoplanktona u istraženim šaranskim rastilištima. Kvocijent florne sličnosti fitoplanktonske zajednice bio je na razini 60% i 65%. Razlike u količini pojedinih sistematskih odjela i ukupnog fitoplanktona u rastilištima ($2,2 \times 10^6 \text{ ind l}^{-1}$; $2,6 \times 10^6 \text{ ind l}^{-1}$ i $1,7 \times 10^6 \text{ ind l}^{-1}$) nisu bile signifikantne ($p<0,05$).

Summary

PHYTOPLANKTON OF CARP GROWING-PONDS

Lj. Debeljak, M. Dražić*

This work presents the result of a research carried out from May 31st till August 8th 1997 in ponds, size 1 ha (hectare), depth 1.3–1.5 m respectively.

The effects of single application of 120 kg/ha^{-1} NPK (15:15:15) and 45 l/ha^{-1} of UAN+ 45 kg/ha^{-1} of MAP (12:52) on the qualitative-quantitative structure of the phytoplankton* had been researched.

By the means of a comparative analysis between the fertilised and controlled non-fertilised variants a similar cenotic* phytoplankton structure had been found. Of a total of 100 determined phytoplankton types, there were 58 types in the controlled, non-fertilised variant, 52 types in the variant treated with NPK (15:15:15) and 76 types in the variant treated with UAN and MAP. The quotient of the flora similarity between all the three variants was 60 to 65 per cent.

The quantity of the phytoplankton in the controlled variant was 2.2×10^6 ind 1^{-1} , in the variant treated with NPK 2.6×10^6 ind 1^{-1} and in the variant treated with UAN and MAP 1.7×10^6 ind 1^{-1} . The analysis of the variance confirmed that the difference between the respective variants regarding the quantity was insignificant (P).

Key words: carp growing-ponds, mineral fertilisers, phytoplankton

*Dr. sc. Ljubica Debeljak, znanstvena savjetnica, Agronomski fakultet, Zagreb; Maja Dražić, dipl. ing., Stočarski selekcijski centar, Zagreb

LITERATURA

- APHA (1975): Standard methods for examination of water and wastewater. Am. Publ. Health Association, M, New York.
- Debeljak, Lj. (1968): Utjecaj različitih doza kombiniranih mineralnih gnojiva na primarnu organsku produkciju u pokusnim ribnjacima »Draganići«. Ribar. Jugosl., XXIII (3): 57–60.
- Debeljak, Lj. (1969): Kvalitativni sastav fitoplanktona u ribnjacima i njegova ekološka uvjetovanost. Ribar. Jugosl. XXIV (4): 78–83.
- Debeljak, Lj. (1970): Djelovanje mineralnih gnojiva na sezonske promjene fitoplanktona u pokusnim ribnjacima »Draganići«. Ribar. Jugosl. XXV (6), 122–125.
- Debeljak, Lj. (1980): Sastav i dinamika fitoplanktona u ribnjaku Draganići. Ribar. Jugosl. XXXV, (3): 50–54.
- Debeljak, Lj. (1982): Prilog poznavanju fitoplanktona ciprinidnih ribnjaka. Ekologija, 17 (2): 139–148.
- Debeljak, Lj. (1986): Kvalitativno-kvantitativni sastav fitoplanktona u ribnjaku Draganići. Ribar. Jugosl., 41 (6), 105–111.
- Debeljak, Lj. Adámek, Z. (1994): Utjecaj gnojidbe na razvoj fitoplanktona u šaranskim mladičnjacima. Ribarstvo, 52 (49), 1, 3–17.
- Debeljak, Lj. (1994): Kvantitativni sastav zelenih planktonskih algi (*Chlorophyta*) u šaranskom ribnjaku. Ribarstvo, 52 (49), 3, 99–107.

- Debeljak, Lj.* (1997): Kvalitativni sastav filoplanktona različito gnojenih šaranskih ribnjaka. Ribarstvo, 55 (1), 11–18.
- Fašaić, K., Jirásek, J., Debeljak, Lj., Dražić, M.* (1999): Učinek minerálního hnojení na ekologické faktory a produkci kapřího plůdku. »50 let výuky rybářské specializace na MZLU u Brně«. Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí. Ustav rybářství a hydrobiologie MZLU v Brně. 52–57.
- Gollerbah, M. M., Kosinskaja, E. K., Poljanskij, V. J.* (1953): Sinezelenie vodorosli. Gosud. Izdat. »Sovet. Nauka«. Moskva.
- Golterman, H. Z.* (1975): Physiological limnology — Elsevier Scientific Publishing Company, Amst., Oxford, New York.
- Hindák, F., Cyrus, Z., Marvan, P., Javornicky, P., Komárek, J., Ettl, H., Rosa, K., Sládečková, E., Popovksy, J., Pinčocháčová, M., Lhotsky, O.* (1978): Sladkovodné riasy. Slov. Pedag. Naklad, Bratislava.
- Pascher, A.* (1914): Die Süßwasser-Flora Deutschlandss, Österreichs und der Schweiz. Heft 1, Flagellatae 2.
- Sládeček, V., Sládečková, A.* (1996): Atlas vodních organismů se zůctelem na vodárenství, povrckovéody a čistírny odpadních vod. 1. dil: Destruenti a producenti. Česká vTdeckot. vodokosp. Spol., Praha.
- Sörensen, T.* (1948): A method of establishing groups of equal amplitude in plant sociology based on similarity of species content and its application to analyses of the vegetation on Danish Commons. kon. Da. Vid. Selsk. Biol. skr., Kobenhaven, 5, (4), 1–34.
- Spodniewska, I.* (1979): Phytoplankton as the indicator of lake eutrophication. II Summer situation in 25 Masurian lakes in 1976. Ekologia Polska, 27, (3), 481–496.
- Tomec, M.* (1984): Saprobiološka procjena kvalitete vode šaranskih ribnjaka u SR Hrvatskoj. Ribar. Jugosl. 39, (2), 36–42.
- Tomec, M., Teskeredžić, E., Teskeredžić, Z., Hacmanjek, M., Malnar, Z., Štancl, Ž.* (1989): Prilog poznavanju primarne planktonske produkcije u ciprinidnim ribnjacima. Ichthyologia, 21, (1), 17–25.
- Tomec, M., Teskeredžić, E., Teskeredžić, Z., Hacmanjek* (1992): Dinamika fitoplanktona ciprinidnih ribnjaka. Ribarstvo 47 (3–4), 79–88.
- Zabelina, M. M., Kiselew, I. A., Groškina — Lavrenka, A. N., Šešukova, V. S.* (1951): Diatomovie vodorosli. Sov. nauka, Moskva.

Primljeno 5. 6. 2000.
Prihvaćeno 7. 6. 2000.