

EVALUATION OF MILK PRODUCTION OF DAIRY COWS OF THE SLOVAK SPOTTED BREED ACCORDING TO SELECTION FOR LONGEVITY AND GENETIC VARIANTS OF POLYMORPHIC PROTEINS IN MILK

HODNOTENIE MLIEKOVEJ ÚŽITKOVOSTI DOJNÍC SLOVENSKÉHO STRAKATÉHO PLEMENA POD A SELEKCIE NA DLHOVEKOS A GENETICKÉ VARIANTY POLYMORFNÝCH BIELKOVÍN MLIEKA

ŽITNÝ* J., BUJKO J., TRAKOVICKÁ A., STRAPÁKOVÁ E., TÓTHOVÁ K.

SÚHRN

Elektroforetickej rozborom polymorfných bielkovín mlieka (metóda elektroforézy na škrobovom géli) 681 kráv slovenského strakatého plemena sme stanovili genetické varianty polymorfných bielkovín mlieka. Sledovali sme vplyv genetických variantov bielkovín mlieka na vybrané úžitkové vlastnosti (produkcia mlieka v kg, bielkovín v % a kg), kde rozdiely medzi testovanými skupinami boli vyhodnotené pomocou Studentovho t-testu. Pri sumárnom zhodnotení príslušných ukazovateľov úžitkovosti za produkčné obdobie medzi 25 - 162 mesiacom bol vypočítaný medzi skupinou homozygotných (AA + BB + CC genotypov) a heterozygotných genotypov (AB+AC+BC genotypov) β – kazeínu štatisticky vysoko preukazný rozdiel ($^{+++}P \leq 0,001$, Tab. 1, 2) v produkcií mlieka o 183,7 kg a produkcií bielkovín o 7,6 kg. V polymorfizme alfa_{s1} – kazeín, β – laktoglobulin a κ – kazeín medzi testovanými skupinami homozygotných a heterozygotných genotypov neboli zistené preukazný rozdiel ($P \geq 0,05$).

KLÚČOVÉ SLOVÁ: slovenské strakaté plemeno, dlhovekost', polymorfné bielkoviny mlieka, mlieková úžitkovos

ABSTRACT

Milk performance of 681 cows of Slovak spotted breed was evaluated according to the genetic variants of the polymorphic proteins determined by starch gel electrophoresis. In the work the effect of genetic variants of the proteins was analysed on selected performance (production milk in kg, proteins in % and kg). Differences between the productive characters in testing groups were evaluated according to statistic method of Student t-test. Evaluation of performance was done during productive period between 25 - 162 months. The calculation between groups of homozygotes (=AA+ BB + CC genotypes) and heterozygotes (=AB+AC+BC genotypes) in the system of β – casein showed a statistically significant difference ($^{+++}P \leq 0,001$), (table 1, 2) in milk production (183,7 kg) and proteins production (7,6 kg). In the systems of alpha_{s1} – casein, β – lactoglobulin and κ – casein polymorphisms, the differences between the testing groups of homozygotes and heterozygotes were not statistically significant ($P \geq 0,05$).

KEY WORDS: Slovak spotted breed, longevity, polymorphic proteins, milk performance

EVALUATION OF MILK PRODUCTION OF DAIRY COWS ACCORDING TO SELECTION FOR LONGEVITY AND POLYMORPHIC PROTEINS

DETAILED ABSTRACT

In the work we evaluated milk production of dairy cows of Slovak spotted breed ($n=681$) according to selection for longevity and for polymorphic proteins in milk. By means of the electrophoresis on starch gel (figure 1) the genetic variants of polymorphic proteins in milk of dairy cows were analysed. To calculate milk production (kg) and proteins (kg, %) the groups of homozygote and heterozygote genotypes of α_{s1} – casein, β – lactoglobulin, β – casein and κ – casein were used in the systems. The characteristic of milk production was evaluated on the base of evidence from 1885. Standardised lactation (240-305 days) and the cows were designed into the five groups according to productive age (in the productive age between 25 - 162 months). The differences between the productive characters in testing groups were evaluated according to Student t-test statistical method.

The most significant average milk (kg) and proteins (kg) production was found in the group of heterozygotes AB+AC+BC according to the system of β – casein (4049 kg milk production, 138 kg proteins) during the whole tested period of production. Average production in the proteins (%) was in range of 3,34 - 3,35 % (table 3).

Statistically significant differences (+++ $P \leq 0,001$) were defined between the groups of homozygotes (=AA + BB + CC) and heterozygotes (=AB+AC+BC) in β – casein and the milk production by 183,7 kg and production of proteins by 7,6 kg (table 1, 2). In the systems of alpha s1 – casein, β – lactoglobulin and κ – casein polymorphism, the differences between the testing groups of homozygotes and heterozygotes were not statistically significant (- $P \geq 0,05$).

In the figures 2, 3 and 4 the differences in milk production were found between the groups of homozygotes and heterozygotes according to combination of polymorphic systems with statistically significant differences at the level of + $P \leq 0,05$, ++ $P \leq 0,01$, +++ $P \leq 0,001$.

ÚVOD

Krvné skupiny a genetické polymorfné znaky sú predmetom dlhodobého skúmania a využívania v selekcii pri potvrdení niektorých vzťahov k úžitkovým vlastnostiam danej populácie hospodárskych zvierat. Teoretický predpoklad medzi týmito znakmi je založený na heteróznom účinku úžitkovej vlastnosti odvodenom od heterozygotného usporiadania alel polymorfného znaku [10].

Na základe publikovaných prác väčšina domáčich a zahraničných autorov [1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16] zastáva názor, že medzi heterozygotnými alelami polymorfných znakov a úžitkovými vlastnosťami existuje selektívny pozitívny efekt. Pre tieto metódy plemenitby je charakteristické šľachtenie s cieľom získať úžitkové zvieratá, pri ktorých sa prejaví heterózny efekt [2]. Tento efekt sa prejavuje vyššou produkčnou schopnosťou, zvýšenou vitalitou (životnosťou) krížencov, plodnosťou, rastovou schopnosťou (luxurizácia), väčšou odolnosťou a schopnosťou prispôsobiť sa vonkajším podmienkam prostredia.

Najväčší heterózny efekt je pri vlastnosťach s nízkou variabilitou. Maximálny heterózny efekt sa prejavuje v F_1 generácii a pri vlastnosťach, ktoré sa inbrednou depresiou najviac znížili. V ďalších generáciách sa heterózny efekt znižuje [11].

Skutočnosť, že existujú rôzne väzby jednotlivých parametrov mliekovej úžitkovosti (množstvo mlieka v kg a jeho percentuálny obsah zložiek), nás vedie pri významných zmenách úžitkovosti tieto väzby znova analyzovať a kvantifikovať. Pri šľachtení na mliekovú úžitkovosť je kladený v súčasnej dobe hlavný dôraz na množstvo bielkovín [3, 8, 9, 17].

Cieľom práce bolo analyzovať homozygotné a heterozygotné genotypové kombinácie polymorfných bielkovín mlieka pre hodnotenie vybraných ukazovateľov mliekovej úžitkovosti (produkcia mlieka a bielkovín) kráv slovenského strakatého plemena.

MATERIÁL A METÓDA

Do hodnotenia bolo zahrnutých celkovo 1885 normovaných laktácií (240-305 dní) v populácii 681 dojnic slovenského strakatého plemena s minimálnym genetickým podielom krvi 75 %.

Na rozdelenie a stanovenie frakcií genetických variant polymorfných bielkovín mlieka sme použili horizontálnu elektroforézu. Multidrive XL na škrobovom géli s použitím močoviny a merkaptoetanolu. V alkalickej prostredí pri pH boratového tlmivého roztoku 8,7 boli separované príslušné bielkovinové frakcie, ktoré sme zvýraznili vo farbiacom roztoku amidočerň 10 B s nigrozínom. Na záver bol škrobový gél vypieraný v odfarbovacom roztoku (methanol: destilovaná voda: kyselina octová), pokým sa zvýraznili modro sfarbené frakcie polymorfných bielkovín mlieka, ktoré sme vyhodnotili a zapísali do tabuľiek.

Vzájomné vzťahy boli posudzované na základe homozygotných a heterozygotných genotypových kombinácií alfa_{s1}-kazeínu, beta-laktoglobulínu, beta-kazeínu, kapa-kazeínu medzi ukazovateľmi produkcie mlieka (kg) a bielkovín (%), (kg).


Signifikantnosť rozdielov testovaných skupín sme vyhodnocovali na počítači PC Pentium (r) II Processor s použitím softveru STAT-EXE a matematicko-štatistickej metódy Studentov t-test na hladinách preukaznosti $P \geq 0,05$ (označené \wedge), $P \leq 0,05$ (označené $\wedge\wedge$), $P \leq 0,01$ (označené $\wedge\wedge\wedge$) a $P \leq 0,001$ (označené $\wedge\wedge\wedge\wedge$).

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Vybrané ukazovatele produkcie mlieka sú vyhodnotené podľa 5 - tich vekových kategórií kráv slovenského strakatého plemena a genotypových kombinácií polymorfných bielkovín mlieka analyzovaných metódou elektroforézy na škrobovom géli.

Genetické varianty mliečnych bielkovín sú kategorizované do dvoch skupín t. j. na heterozygotné a homozygotné genotypy. Uvedené členenie sme použili pre výpočet variačno-štatistickej charakteristiky produkcie mlieka a bielkovín. V polymorfizme α_{s1} – kazeín boli na škrobových géloch vizualizované homozygotné BB a heterozygotné BC genotypy. Ďalším polymorfným systémom je β – laktoglobulin s frakciami homozygotných AA + BB a heterozygotných genotypov, ktorými sú AB + AC + BC genotypy.

Obrázok 1: Škrobový gél s rozdelenými polymorfínnymi bielkovinami kravského mlieka
 Figure 1: Starch gel with separated polymorphic proteins in milk of cows



Pri hodnotení β – kazeínu boli zistené tri homozygotné (AA + BB + CC) a tri heterozygotné (AB+AC+BC) genotypy. Genetický polymorfizmus κ – kazeínu (obrázok 1) pozostáva z AA + BB homozygotných a AB heterozygotných genotypov.

V polymorfizme alfa s_1 – kazeín (obrázok 2) s BC genotypom sme zistili štatisticky preukazné rozdiely v produkcií mlieka kráv slovenského strakatého plemena vo veku 73-96 mesiacov ($277,1^+$ kg mlieka) a 97-120 mesiacov ($978,8^{+++}$ kg mlieka).

Obrázok 2: Rozdiely v produkcií mlieka (kg) medzi homozygotnými a heterozygotnými genotypovými kombináciami polymorfínnych bielkovín mlieka.
 Figure 2: Difference in milk production (kg) between homozygotes and heterozygotes genotypes combination of polymorphism proteins in milk.




Table 1: Statistical characteristic of milk production (kg) in cows of Slovak spotted breed according to genotypic combination of polymorphism protein in milk

Tabuľka 1: Variačno-štatistické ukazovatele produkcie mlieka (kg) kráv slovenského strakatého plemena podľa genotypových kombinácií polymorfín bielkovín mlieka

Vek dojníc v mesiacoch (1)	1. skupina				2. skupina				Rozdiely t-test (5) 1 : 2	
	Homozygotné genotypy (2)		Heterozygotné genotypy (3)							
Laktácie (4)	x	s _x	v	Laktácie (4)	x	s _x	v			
α_{s1} – kazeín (7)										
25 – 48	100	831,3	25,6	21	3293,3	931,5	28,2	-49,7	-	
49 – 72	481	3763,7	1018,3	63	3718,6	954,1	25,6	45,1	-	
73 – 96	627	3982,6	1075,6	69	3705,9	869,1	23,4	277,1	+	
97 – 120	327	4125,6	1070,0	18	5104,4	861,1	16,8	-978,8	+++	
121 – 162	165	4432,5	1451,2	14	4330,6	853,4	19,7	101,9	-	
Hodnotené spolu (6)	1700	3948,4	1118,3	28,3	3846,6	1010,3	26,2	101,8	-	
β – laktoglobulin (8)										
25 – 48	55	3410,9	843,3	24,7	66	3120,1	830,9	26,6	290,8	-
49 – 72	279	3756,8	975,2	25,9	265	3760,2	1047,9	27,8	-3,4	-
73 – 96	351	3940,1	1134,1	28,7	345	3970,4	979,5	24,6	-30,3	-
97 – 120	145	4056,7	1038,4	25,6	200	4263,7	1105,7	25,9	-207,0	-
121 – 162	89	4363,2	1355,9	31,0	90	4485,1	1470,8	32,7	-121,9	-
Hodnotené spolu (6)	919	3912,2	1100,6	28,1	966	3963,3	1115,6	28,1	-51,1	-
β – kazeín (9)										
25 – 48	82	3302,7	794,7	24,0	39	3146,2	946,1	30,0	156,5	-
49 – 72	347	3708,9	1013,2	27,3	197	3845,8	1001,9	26,0	-136,9	-
73 – 96	374	3914,9	1068,8	27,3	322	4002,0	1048,6	26,2	-87,1	-
97 – 120	241	4121,4	1073,9	26,0	104	4304,9	1092,6	25,3	-183,5	-
121 – 162	92	4085,6	1086,8	26,6	87	4783,0	1620,2	33,8	-697,4	+++
Hodnotené spolu (6)	1136	3865,4	1058,8	27,3	749	4049,1	1171,6	28,9	-183,7	+++
κ – kazeín (10)										
25 – 48	31	3052,4	771,8	25,2	90	3321,1	862,9	25,9	-268,7	-
49 – 72	173	3834,4	1025,3	26,7	371	3723,2	1002,7	26,9	111,2	-
73 – 96	230	3896,0	1104,1	28,3	466	3984,4	1037,0	26,0	-88,4	-
97 – 120	89	4184,6	1119,4	26,7	256	4174,0	1069,9	25,6	10,6	-
121 – 162	35	4249,0	1200,5	28,2	144	4467,1	1459,6	32,6	-218,1	-
Hodnotené spolu (6)	558	3898,2	1098,1	28,1	1327	3955,3	1112,6	28,1	-57,1	-

P \geq 0,05 * P \leq 0,05 ** P \leq 0,01 *** P \leq 0,001

1 - age of dairy cows in month; 2 - homozygotes genotypes; 3 - heterozygotes genotypes; 4 – lactacion; 5 – differences Student t-test; 6 – evaluation together; 7 - α_{s1} – casein; 8 - β – lactoglobulin; 9 - β – casein; 10 - κ – casein

Pri celkovom hodnotení produkcie mlieka prvá skupina dojníc s homozygotným BB genotypom alfa_{s1} – kazeínu vyprodukovala v priemere o 101,8 kg mlieka viac (P \geq 0,05), než druhá skupina s BC genotypom. Výsledky produkcie mlieka v ďalších troch hodnotiacich systémoch polymorfín bielkovín potvrdzujú zistenia Rendla (1977), cit. [12] o vplyve heterozygotného založenia monogénnych znakov na produkčné vlastnosti zvierat. Rozdiely medzi homozygotnými a heterozygotnými skupinami však neboli zistené na hraniciach významnosti (P \geq 0,05) v polymorfizme β – laktoglobulín (51,1 kg mlieka) a κ – kazeín (57,1 kg mlieka). Úroveň produkcie mlieka dosiahla za

celkové hodnotiace obdobie výrazne stúpajúcu tendenciu iba v heterozygotných genotypových kombináciách β – kazeínu so štatisticky preukazným rozdielom 183,7 kg mlieka (***P \leq 0,001). V súbore kráv slovenského strakatého plemena bola dosiahnutá vyššia priemerná produkcia bielkovín s BB genotypom alfa_{s1} – kazeínu. Vypočítaný rozdiel bielkovín 3,1 kg bol medzi oboma testovanými skupinami štatisticky nevýznamný (tabuľka 2, * P \geq 0,05). Tendencia zvyšovania produkcie bielkovín (kg) bola opäť zistená pri kombinovaných genotypoch v polymorfizme β – laktoglobulín a κ – kazeín (obrázok 3).

Table 2: Statistical characteristic in production of proteins (kg) in cows of Slovak spotted breed according to genotypic combination of polymorphism protein in milk

Tabuľka 2: Variačno-štatistické ukazovatele produkcie bielkovín (kg) kráv slovenského strakatého plemena podľa genotypových kombinácií polymorfných bielkovín mlieka

Vek dojnic v mesia-coch (1)	1. skupina				2. skupina				Rozdiely t-test (5) 1 : 2
	Laktácie (4)	x	s _x	v	Laktácie(4)	x	s _x	v	
α_{s1} – kazeín (7)									
25 – 48	96		27,3	25,6	20	113,5	26,0	22,8	-6,8 -
49 - 72	448	125,3	33,9	27,1	61	125,6	33,4	26,5	-0,3 -
73 - 96	536	136,0	36,5	26,8	56	124,5	26,8	21,5	11,5 ++
97 - 120	251	141,7	35,6	25,1	18	170,1	26,2	15,4	-28,3 ***
121 - 162	95	170,3	48,8	28,6	9	167,0	23,2	13,9	3,3 -
Hodnotené spolu (6)	1426	134,0	38,3	28,5	164	130,9	33,6	25,7	3,1 -
β – laktoglobulin (8)									
25 – 48	51	113,7	24,6	21,6	65	103,3	28,3	27,3	10,4 +
49 - 72	260	126,0	32,8	26,0	249	124,8	34,9	28,0	1,2 -
73 - 96	308	133,6	38,1	28,5	284	136,3	33,2	24,4	-2,7 -
97 - 120	107	137,9	33,9	24,6	162	147,4	36,6	24,8	-9,5 -
121 - 162	47	163,9	47,6	29,0	57	175,1	46,4	26,5	-11,2 -
Hodnotené spolu (6)	773	132,2	37,0	28,0	817	135,1	38,5	28,5	-2,9 -
β – kazeín (9)									
25 – 48	79	109,1	26,2	24,0	37	105,5	29,0	27,5	3,6 -
49 - 72	326	123,4	33,9	27,5	183	128,9	33,4	25,9	-5,5 -
73 - 96	305	132,5	35,6	26,8	287	137,4	36,0	26,1	-4,9 -
97 - 120	189	142,5	35,4	24,8	80	146,3	36,8	25,1	-3,8 -
121 - 162	56	152,2	37,4	24,6	48	190,8	48,9	25,6	-38,6 ***
Hodnotené spolu (6)	955	130,6	35,9	27,5	635	138,2	40,1	28,9	-7,6 ***
κ – kazeín (10)									
25 – 48	30	102,9	23,2	22,5	86	109,5	28,2	25,7	-6,6 -
49 - 72	160	127,1	35,0	27,5	349	124,7	33,3	26,7	2,4 -
73 - 96	184	134,2	37,7	28,1	408	135,2	35,0	25,8	-1,0 -
97 - 120	74	145,1	35,7	24,6	195	143,1	35,8	25,0	2,0 -
121 - 162	18	144,0	35,3	24,5	86	175,4	47,6	27,1	-31,4 ++
Hodnotené spolu (6)	466	131,9	36,8	27,9	1124	134,4	38,2	28,4	-2,5 -

P \geq 0,05 - P \leq 0,05 + P \leq 0,01 ++ P \leq 0,001


1 - age of dairy cows in month; 2 - homozygotes genotypes; 3 - heterozygotes genotypes; 4 – lactacion; 5 – differences Student t-test; 6 – evaluation together; 7 - α_{s1} – casein; 8 - β – lactoglobulin; 9 - β – casein; 10 - κ – casein

Preukazne vyšia úžitkovosť bola zistená u heterozygotných genotypových kombinácií v polymorfizme β – kazeín. V tejto súvislosti môžeme konštatovať, že medzi hodnotenými genetickými markérmi polymorfných bielkovín mlieka β – kazeínu sme podobne ako [9, 17] potvrdili dôležitú koreláciu, ktorá je založená na princípe kladnej korelácie (korelačný koeficient= 0,967) medzi produkciou mlieka a obsahom bielkovín. Pri selekcii len na obsah bielkovín v mlieku, dôjde k najvyššiemu zvýšeniu práve pri obsahu bielkovín (o 7,6 kg), avšak súčasne sa zvýší i množstvo mlieka (o 183,7 kg). Tieto vzťahy boli

pri našich pozorovaniach potvrdené v kategórii heterozygotných AB+AC+BC genotypov β – kazeínu so štatisticky vysoko preukaznými rozdielmi (+++P \leq 0,001) (tabuľka 1, 2). Tabuľka 3 obsahuje súhrn informácií o údajoch týkajúcich sa produkcie bielkovín (v %), ktoré sú kategorizované v závislosti od dĺžky produkčného života kráv a polymorfných bielkovín mlieka. Zo sumárnej analýzy vyplýva, že v polymorfizme alfa s_1 – kazeín, β – laktoglobulin, β – kazeín a κ – kazeín porovnávané rozdiely medzi testovanými skupinami (homozygotné genotypy : heterozygotné genotypy) neboli štatisticky významné (P \geq 0,05).


Obrázok 3: Rozdiely v produkcií bielkovín (kg) medzi homozygotnými a heterozygotnými genotypovými kombináciami polymorfíných bielkovín mlieka.

Figure 3: Difference in production of proteins (kg) between homozygotes and heterozygotes genotypes combination of polymorphism proteins in milk.



Obrázok 4: Rozdiely v produkcií bielkovín (%) medzi homozygotnými a heterozygotnými genotypovými kombináciami polymorfíných bielkovín mlieka.

Figure 4: Difference in production of proteins (%) between homozygotes and heterozygotes genotypes combination of polymorphism proteins in milk.



ZÁVER

Z výsledkov vyplýva, že medzi hodnotenými skupinami β – kazeínu boli zistené vysoko signifikantné rozdiely ($^{+++}P \leq 0,001$) v produkcií mlieka (183,7 kg) a bielkovín (7,6 kg) v prospech heterozygotnej genetickej štruktúry AB+AC+BC. Pri

potvrdení vzťahov úžitkových vlastností a genetických polymorfných znakov na ďalšej populácii odporúčame metódu využívať v selekcii ako pomocné selekčné kritérium.

Príspevok bol pripravený v rámci projektu MŠ SR VEGA č. 1/ 8175/ 01

Table 3: Statistical characteristic in production of proteins (%) in cows of Slovak spotted breed according to genotypic combination of polymorphism protein in milk

Tabuľka 3: Variačno-štatistické ukazovatele produkcie bielkovín (%) kráv slovenského strakatého plemena podľa genotypových kombinácií polymorfných bielkovín mlieka

Vek dojnic v mesiacoch (1)	Laktacie (4)	1. skupina			2. skupina			Rozdiely t-test (5) 1 : 2	
		Homozygotné genotypy (2)	x	s _x	v	Lak-tacie	x	s _x	v
α_{s1} – kazeín (7)									
25 - 48	96		0,17	5,3	20	3,32	0,23	6,9	-0,03 -
49 - 72	448	3,35	0,18	5,4	61	3,38	0,16	4,8	-0,03 -
73 - 96	536	3,34	0,21	6,2	56	3,30	0,16	4,9	0,04 -
97 - 120	251	3,35	0,19	5,6	18	3,34	0,16	4,8	0,01 -
121 - 162	95	3,41	0,19	5,4	9	3,47	0,17	4,7	-0,06 -
Hodnotené spolu (6)	1426	3,35	0,19	5,8	164	3,35	0,18	5,3	0,00 -
β – laktoglobulin (8)									
25 - 48	51	3,27	0,20	5,9	65	3,31	0,18	5,3	-0,04 -
49 - 72	260	3,36	0,19	5,6	249	3,35	0,17	5,0	0,01 -
73 - 96	308	3,33	0,21	6,2	284	3,35	0,20	6,0	-0,02 -
97 - 120	107	3,33	0,19	5,66	162	3,36	0,19	5,5	-0,03 -
121 - 162	47	3,37	0,19	5,71	57	3,45	0,17	5,0	-0,08 +
Hodnotené spolu (6)	773	3,34	0,20	5,9	817	3,35	0,19	5,5	-0,01 -
β – kazeín (9)									
25 - 48	79	3,30	0,19	5,8	37	3,28	0,17	5,0	0,02 -
49 - 72	326	3,34	0,18	5,3	183	3,37	0,18	5,3	-0,03 -
73 - 96	305	3,33	0,21	6,2	287	3,35	0,20	5,9	-0,02 -
97 - 120	189	3,36	0,19	5,7	80	3,31	0,17	5,2	0,05 +
121 - 162	56	3,44	0,19	5,5	48	3,38	0,17	5,1	0,06 -
Hodnotené spolu (6)	955	3,34	0,20	5,8	635	3,35	0,19	5,6	-0,01 -
κ – kazeín (10)									
25 - 48	30	3,30	0,18	5,4	86	3,29	0,19	5,6	0,01 -
49 - 72	160	3,34	0,18	5,2	349	3,36	0,18	5,3	-0,02 -
73 - 96	184	3,36	0,23	6,7	408	3,33	0,19	5,8	0,03 -
97 - 120	74	3,35	0,19	5,7	195	3,36	0,19	5,5	0,01 -
121 - 162	18	3,29	0,17	5,1	86	3,44	0,18	5,1	-0,15 ++
Hodnotené spolu (6)	466	3,34	0,20	5,9	1124	3,35	0,19	5,65	-0,01 -

P \geq 0,05 - +P \leq 0,05 ++P \leq 0,01 +++P \leq 0,001

1 - age of dairy cows in month; 2 - homozygotes genotypes; 3 - heterozygotes genotypes; 4 – lactacion; 5 – differences Student t-test; 6 – evaluation together; 7 - α_{s1} – casein; 8 - β – lactoglobulin; 9 - β – casein; 10 - κ – casein

LITERATÚRA

- [1] Fitzhugh H. A., Long C. R., Cartwright T. C. (1975): Systems analysis of sources of genetic and environmental variation in efficiency of beef production. Heterosis and complementarity. In: J. Anim. Sci., 1975, 40, s. 421-433
- [2] Gavalier M. (1983): Heterózne a materiálne efekty v chove hospodárskych zvierat, Poľnohospodárska veda, Súria A, s.77
- [3] Chládek G. (1999): Složení mléka dojnic českého strakatého plemene na různých laktacích. Náš chov, ročník LIX, č. 1, s. 18-19
- [4] Kadlecík O., Bulla J., Cadrák J., Kasarda O., Kúbek A., Rybanská M., Strapáková E.,
- [5] Kúbek A., Trakovická A., Gajdošík, M., Gogora, J. (1994): A drift of polymorphic marker genes in the process of sheep of improvement. In: 24-th Int. Conf. Animal Genet. Praha, s. 41
- [6] Kúbek A., Trakovická A., Žitný J., Michaličková E., Gavalier M. (1997): Stupeň homozygotnosti polymorfných markérov a produkcia mlieka dojnic. In: Aktuální problémy šlechtění, zdraví, růstu a produkce skotu. České Budějovice, s. 53-55
- Trakovická E. (2001): Zefektívnenie geneticko-šľachtiteľských postupov pri zlepšovaní vlastností hovädzieho dobytka na Slovensku, monografia, SPU v Nitre, 72 s

- [7] Long C. R., Cartwright T. C., Fitzhugh H. A. (1975): System analysis of sources of genetic and environmental variation in efficiency of beef production. Cow size and herd management. In: J. Anim. Sci., 40, s. 409-419
- [8] Mácha J. (1996): Jak zvýšit podíl a množství bílkovin v mléce, Náš chov, ročník. LVI, č. 2, s. 18-19
- [9] Novotný V. (1995): Procenta bílkovín, či kilogramy mléka ; Náš Chov, č. 2, s. 26 – 28.
- [10] Nový J. (1981): Genetické aspekty intenzifikácie živočisnej výroby, Príroda Bratislava, 251 s.
- [11] Rozman J., Duša Z., Jirák, J., Šiler, R., Miškovský, Z. (1982): Všeobecné základy živočisnej výroby, Príroda, Bratislava, 533 s.
- [12] Trakovická A., Kúbek A. (1996): Možnosti využitia genetických markérov krvi na hodnotenie úžitkových vlastností oviec. Acta zootechnica, č. 51, Nitra, VES VŠP, s. 77-81.
- [13] Trakovická A., Kúbek A., Žitný J., Smatanová S. (1997): Genetický polymorfizmus krvi a vlnová úžitkovosť oviec. Acta zootechnica, č. 53, Nitra, VES VŠP, s. 59-66
- [14] Vašíček, D., Uhrín, P., Chrenek, P., Bauerová, M., Oberfranc, M., Bulla,J.: Genotyping of κ – casein in different cattle breeds in Slovakia. Živočisna výroba, 40, 1995(6), s. 241-244.
- [15] Žitný J., Trakovická A., Kúbek A., Michaličková, E., Ostertág, I. (1996): Rozdiely v mliekovej úžitkovosti rôzneho kappa – kazeínového genotypu dojnic SS plemena. In: Živočisna výroba, 41, 12, s. 533–538
- [16] Žitný J., Ostertág I., Michaličková E., Kúbek A., Trakovická A., Gavalier, M. (1997): Rozdiely v mliekovej úžitkovosti rôzneho α_{s1} – kazeínového genotypu dojnic slovenského strakatého plemena. In: Živočisna výroba, 42, 11, s. 481-486
- [17] Žitný J., Kúbek, A., Trakovická, A., Bujko, J. (2001): Hodnotenie mliekovej úžitkovosti kráv slovenského strakatého plemena podľa selekcie na špeciálnu kombinačnú schopnosť. Poľnohospodárstvo, 47, č. 10, s. 754-766.

Július Žitný*, julius.zitny@uniag.sk, *correspondence author

Jozef Bujko

Anna Trakovická

Eva Strapáková

Karin Tothová

Department of animal genetics and breeding biology, Faculty of Agronomy,
The Slovak Agricultural University in Nitra, A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovak republic
Tel: 00421 37 6508 336
Fax: 00421 37 6511 591